





11  
1  
Int 87 (234)  
v 5



# MATERIA MEDICA

SEU

COGNITIONIS MEDICAMENTORUM

SIMPLICIORUM

## EPICRISIS ANALITICA.



MATERIA MEDICA

322

COGNITIONIS MEDICAMENTORUM

SIMPLICIORUM

EPICRISIS ANALYTICA





# MATERIA MEDICA

SEU

COGNITIONIS MEDICAMENTORUM  
SIMPLICIORUM

## EPICRISIS ANALITICA,

AUCTORE

F. SWEDIAUR, M. D.

EDITIO PRIMA HISPANA.

Recudi Curavit


DR. ANTONIUS A VALLEJO,  
*Medicinæ ac Chirurgiæ Profesor.*

SECTIO I.

MATRITI.,

Typis Michaelis à Burgos.

1825.



MATERIA MEDICA

REV

COGNITIONIS MEDICAMENTORUM  
SIMPLICIORUM

EPICRISIS ANALITICA

AUCTORE

F. SWEDIAUR, M.D.

EDITIO PRIMA HISPANA.

Recendi Curavit

DR. ANTONIUS A VALLEJO

Medicus ac Chirurgus Professor.

SECTIO I

MATRITIS

Typis Michaelis & Burges

1823

# DON MIGUEL MODET,

Ministro del Consejo Real, de  
la Junta Apostólica, y Juez  
privativo de imprentas y librerías del Reino, &c.

Concedo licencia á D. Miguel de Burgos, impresor en esta Corte, para que pueda reimprimir la obra titulada *Materia Medica*, su autor F. Swediaur, la que de mi órden ha sido censurada, y parece no contiene cosa que sea contraria á los dogmas de nuestra sacrosanta religion, buenas costumbres y regalías del Rey nuestro señor (Dios le guarde) con tal que la reimpresion se haga en buen papel, y sin quitar ni poner cosa alguna á lo contenido en el original que se halla presentado, el que antes de publicarse se me presentará con un ejemplar impreso para su cotejo. E igualmente entregará los siete ejemplares prevenidos para darles el

destino que está mandado. Debiendo contribuir con treinta reales vellon para la caja de Consolidacion conforme á la tarifa aneja del real decreto de cinco de agosto de mil ochocientos diez y ocho Y esta licencia se colocará en la portada de la obra con arreglo á lo prevenido en el capítulo 6.º de la real órden de diez y ocho de octubre último. Madrid diez de noviembre de mil ochocientos veinte y cuatro.

*Miguel Modet.*

Por mandado de S. S.

*José Ferrer,*

Srio.



## EDITORIS NOTA.

*Cum omnem curam et operam nava-  
remus ad hanc cognitionis medicamen-  
torum simpliciorum epicrisin analiti-  
cam typis mandandam, et hoc pro  
Hispanis et in Hispanorum utilitatem,  
nomina anglica et germanica tanquam  
inutilia expungenda credidimus; no-  
mina vero hispana, tanquam inexacta  
et manca, exactioribus suplenda et quæ  
deerant addenda.*

*Cum itaque manus ad opus admove-  
remus, eundem ac in hispanis nomini-  
bus defectum, in officinalibus seu fur-  
maceuticis et in Gallicis reperuimus.*

*Nullam ergo fiduciam in anglica et  
germanica nomenclatura habere debe-  
bamus, et cum non possemus per nos-  
metipsos illam correctiorem reddere, in  
prima nostra idea permansimus.*

*His igitur de causis nomina anglica  
et germanica expunximus, aliqua offi-*

*cialia correximus, gallica ubi erronea  
emendavimus et ubi manca addidimus,  
hispana vero omnibus fere substantiis  
vegetalibus et animalibus apposuimus*

*In parte minerali, post nomen offi-  
cinale et nomen gallicum quibus utitur  
autor, recentiori filosofica nomenclatu-  
ra quimica pro nomine hispano usi su-  
mus.*

*Tabulas anglicam et germanicam  
omisimus, gallicam et hispanam locuple-  
ciores fecimus. ¡Utinam, ut desidera-  
mus, in medicorum et Ægrotantium  
utilitatem!*

# CONSPECTUS.

SÆCULUM fere dimidium elapsum est, quo prima *Materiae Medicæ LINNÆANÆ* editio prodiit, in qua auctor lingua elegantī et concisa qualitates et virtutes Vegetabilium medicas exposuit. Multæ plantæ, tunc temporis obscuræ, hodie bene cognitæ, exacte dēscriptæ sunt: Multa simplicia æque ac præparata, tunc penitus ignota, hodie analysi chemica exactiori stabilita; et non pauca demum quoad usum et præparationem medicamentorum à Botanicis, Chemicis, et Medicis practicis aut nova inventa aut antiqua correctâ fuerunt. Hæc pluribus abhinc annis sedulo et attente in diversis Europæ regionibus notare cœpi, sicque gradatim opusculum natum fuit, in quo fixa à vagis, vera à falsis, dubia à certis acutius distinguerentur; verbo, quod *EPICRISIN ANALYTICAM* cognitionis omnium quæ ab antiquis ad hodierna usque tempora circa qualitates, vires, et usum Medicamentorum simpli-

ciorum, vegetabilium non solum et animalium, sed et mineralium vere cognita essent, fideliter lingua concisa et magis severe exacta quam quidem hactenus factum fuit, sub uno intuitu exhiberet. Parvulum hunc librum, ultima quantum licuit lima politum, hic publico juri trado.

Quod nomenclaturam spectat, Medicorum Europæ hodie vix ullum Botanices aut Chemiæ adeo ignarum credo, ut non mecum ardentem desideret, nomina plantarum æque ac præparatorum chemicorum pharmaceutica, vaga et sæpe absurda, ex Medicina et scriptis medicis expungere, eorumque loco magis propria et fixa substituere. Idcirco pro vegetabilibus et animalibus nomina Linnæi systematica, pro mineralibus præparatisque chemico-pharmaceuticis nomenclaturam elegantem et omnino philosophicam, ab eximiis Galliæ chemicis nuper confectam, lubens adoptavi; nullusque pronunciare hæsito, essentialem versus perfectionem scientiæ medicæ gradum poni ab epocha, qua



practici ac scriptores medici terminos in arte usitatos vagos relinquere, et linguam magis fixam et rationalem in medicinam introducere cœperint.

Medici qui hodierna, in Historia naturali Physica et Chémia inventa spernunt et progressus in scientiis hisce, medicinæ vere auxiliatricibus, recenter factos, ad Medicinam adplicare recusant, limites artiponere, ejusque perfectionem minime curare videntur.

Ordinem in vegetabilibus et animalibus alphabeticum, utpote practico commodissimum; in mineralibus, systematicum cum alphabetico junctum, secutus sum.

Methodo usus sum conformi eaque compendiosissima, plantam unamquamque sub sequentibus titulis complectens, ordine eodem semper positis, scilicet:

1. Nomen Linnæi systematicum. = 2. Pars plantæ usitata. = 3. Classis et Ordo sub quibus in systemate Linnæano occurrit. = 4. Duratio plantæ et locus ubi naturaliter crescit. = 5. Nomen pharmaceuticum s. officinale vulgo usitatum, subjuncto ubique no-

mine Gallico, et ubi illud à latino Linnæano differt, Hispanico. = 6. Qualitates physicæ, nec non principium ACTIVUM in quo præcipua plantæ virtus residet, ubicumque illud analysi chemica exacta determinatum novi. = 7. Virtus medica. = 8. Usus internus et externus; nec non Forma sub qua communiter propinatur. = 9. Dosis. = 10. Præparata.

Qualitates physicæ sunt attributa sensibus obvia, ut odor, sapor &c.; Chemia vero analysi principia constitutiva corporum revelat. Ubi qualitates hæ incertæ aut mihi saltem incognitæ erant, nihil potius quam vaga asserere malui.

Quod virtutes seu vires simplicium spectat, in iis admittendis circumspectionem multo et difficiliorem me esse decuit, quam quidem hætenus generaliter à plurimis materiæ medicæ scriptoribus factum fuit: in hisce designandis quoque vocabula vaga, impropria, aut absurda omnia rejeci; fixis solum et propriis memet adstringens.

Erunt tamen fortassis quidam qui me

in admittendo et numero et viribus plantarum non satis severum fuisse objicient; sed hos meminisse quæso, me non pro solis Medicis magnarum Europæ urbium, ubi optima quæque et efficacissima facile comparantur, sed pro practicis variorum climatum et regionum et qui sæpe in locis à Metropoli longe dissitis, praxin exercent, librum conscripsisse. Hos non raro, præcipue dum optima ad manus non sunt, aut cum pauperibus consulendum est, plantas adhibere juvat quæ aut facilius aut meliori pretio comparantur, etsi virtute paulo inferiori gaudentes: Præterea pro varietate climatum et regionum latitudinem quandam suppellectilis medicæ commodam non solum sed et necessariam esse nemo qui peregrinatus est, inficias ibit.

Cæterum, quod virtutes plantarum in genere spectat, hic pauca quædam observare placet:

Plures in Europa, præprimis in Anglia, medicos novi, qui usum vegetabilium negligunt, plantasque omnes fere, tribus quatuorve solum exceptis, ex praxi me-

dica sine ulla artis jactura exulare posse persuasum habent. Id quidem, re proprius investigata, non miror. Multæ plantæ medicinales hodie, in pluribus regionibus prope Metropolim, præcipue lucri causa, in campis aut hortis coluntur, fumigato optime et irrigato indies solo: Gigantææ sic nascuntur soboles, splendidissima florum varietate superbientes, sed virtute debiles aut effœtæ omnino et oleraceæ. Quid mirum si Medicus tales plantas in praxi adhibitas inefficaces inveniatur, illasque ut inertes ex thesauro pharmaceutico sine damno proscribendas esse existimet; præprimis si Botanicus ignarus easdem in locis natalibus ipse nunquam vidit. Judicium sane longe diversum ferret si easdem plantas in regionibus calidis, in Alpibus aut in locis demum quibuscumque, ubi natura illas sponte producit, proprio anni tempore decerptas examinasset. Hoc quidem adeo verum est ut feles noverim, qui Valerianam officinalem sibi adeo amicam ut illam continua frictione brevi destruant, æstivo tempore dum effœta radix est, ne-



gligenter prætereant et ne quidem intueri dignentur.

Quæ circa vires plurium vegetabilium ratione anni temporis, regionis et soli natalis mox observavi, id quoque valet ratione curæ in iisdem exsiccandis et conservandis adhibitæ. Si plantæ cæterum efficacissimæ ex solo nativo, proprio anni tempore collectæ, in sole male siccantur; vel etiam in umbra sub atmosphæra sicca et sæpius mutata probe siccatae, dein nudæ insectorum corrosioni aut in vasis vitreis radiis solaribus expositæ adservantur, frequenter omnem omnino virtutem perdunt et pulverem terreum potius quam medicamentum æquant.

In locis præterea, ubi pharmacopolæ legibus nullis adstricti, botanices ignari aut ex aliis demum causis, plantas medicinales ipsi nunquam colligunt sed à mulierculis sub nominibus, quibus offeruntur, promiscue coëmunt, sæpe fit, ut planta una pro altera vendatur; aut plantæ recentes in officinis in cumulo diutius asservatæ, fermentantes, corruptæ vel effoctæ

pro parandis extractis, tincturis, etc., adhibeantur. Taceo fraudem voluntariam qua medicamenta vel inertia vel corrupta aut noxia bonis et efficacibus toties in officinis pharmaceuticis, in opprobrium Medici et perniciem ægri, sponte et impune substituuntur. Hoc cum Valeriana officinali, cum Conio maculato, cum Polypodio filice, cum Arnica montana aliisque multis non semel ipse deprehendi. Inde fit ut Medici cæterum sagacissimi sæpissime decipiantur; et inde non raro circa virtutes medicamentorum saluberrimorum male sceptici, aut omnino increduli evadant.

Quæ de viribus simplicium mox memini, non quidem ita intelligi velim, quasi causas allatas solas agnoscerem, nullasque præterea alias, cur remedia cæterum præstantissima toties fallant. Probe enim novi, Empiricos et Medicastros frequenter inefficiæ medicamentorum adscribere, quod propriæ ignorantiae aut judicii defectui potius attribuere deberent. Falluntur sæpe practici, quod simplicia aut inertia

aut ambiguae virtutis, vel demum farra-  
ginem medicamentorum indigestam pro-  
miscue præscribant: Decipiuntur sæpissi-  
me, quod medicamenta, licet efficacissi-  
ma et vere heroica, causa vel naturamor-  
bi male cognita, administrent, minime ut  
videtur conscii, quod ad recte medendum  
non sufficit ut remedia generi morbi et  
speciei cuique aut etiam varietatibus qui-  
busdam apprimè accommodata sint; sed  
quod practico præterea in adplicatione  
remediorum ratio primaria habenda sit  
habitus ægri, id est, virium naturæ rea-  
gentium, utpote à quibus effectus medica-  
mentorum in corpore ægroto præprimis  
dependent.

Hi effectus diversissimi sunt in subjecto  
forti aut debili, torpido aut morbose irri-  
tabili, cachectico aut antea sano; et inde  
fit quod remedia cæterum eximia, male  
aut præpostere adplicata, modo nullos  
modo tremendos, aut plane exitiales pro-  
ducant effectus. Tyrones hinc facile me-  
cum sentient, quod ad artem salutarem  
probe exercendam, plura omnino requi-

rantur quam quidem vulgus et ægrorum et practicorum sibi communiter persuadet. Non vestitus affectatus, non frons rugosa aut faciei gravitas, nec superficiale demum pulsus, linguæ, urinæ, etc., examen, aut servilis formularum imitatio et præscriptio Medicum constituunt. Ut morbi graviores debellantur, habitus ægri et natura ægritudinis probe investiganda, causæ morborum rite determinandæ, et remedia iisdem ad amussim adplicanda sunt: hæc sedulam post studium multorum annorum, ad lectum ægri attentionem et meditationem, examen profundum, iudicium sanum et ingenium acutissimum sæpe requirunt.

Hæ sunt qualitates quæ Medicum philosophum á practicis vulgaribus, et empiricis (spuriis eheu artis filiis), linea acuta distinguunt. Hic solus novit, vires multorum medicamentorum magis certas esse, quam quidem Medicastrum sibi vulgo persuadent: Hic solus, quidquid contra ignari declament, convictus est, multos hodie curari morbos, quos Hippocrates suo tem-

pore curare non potuisset, et gravissima intra paucos sæpe dies debellari mala, quæ ab ignaris non infrequenter vel frustra tentantur, vel per menses et annos misere trahuntur.

Præmissis hisce observationibus quæ Tyronibus satis inculcari non possunt, ad scopum meum redeo.

Qualitates corporum sunt attributa sensibus externis evidentia, aut analysi chemica eruta.

CHEMIA partes plantarum constitutivas reserans principium eorum activum revelat: *Balsamicum; oleosum fixum, vel volatile; principium extractivum, gummosum seu mucilaginosum, resinosum, gummoso aut extractivo-resinosum, ect.*

SAPOR à lingua percipitur et aquæ aut salivæ solubilia manifestat:

*Fatua, insipida, aquosa;*

*Oleracea, mucilaginoso, pinguis;*

*Aromatica, acris, pungentia;*

*Calida, fervida, urentia;*

*Salsa, acida, austero-styptica;*

*Dulcia, amara, nauseosa.*

ODOR nares ferit et volatilia indicat:

*Inodora*, *fragrantia*, *suaveolentia*;

*Ambrosiaca*, *hircina*, *graveolentia*;

*Fœtida*, *tetra*, *suspecta*.

Fidem quam merentur simplicia, interdum uno alterove vocabulo indicavi; sic quod potentiam agendi spectat: *Præstantia*, *eximia*, *heroica*, *suspecta*, *venenata*. De dubiis autem vel omnino inertibus aut nihil dixi, aut signum (?) adjeci.

‘Cæterum quod nomina virium spectat, per se facile intelliguntur fere omnia, hinc ea hic recensere superfluum esset, præcipue cum eadem ad finem operis recensita sint. Sub *Adstringentibus* vegetabilia principio adstringente seu coriario, chemicis sub nomine *acidi gallici* noto, intelligo; sub *Stomachicis* ea quæ digestionis vitiatæ medentur. *Cardiaca* appellaui quæ motum cordis et systematis arteriosi augment; *Nervina* quæ actionem systematis nervosi languidam erigunt. Sub titulo *Alterantium* medicamenta intelligo quæ statum corporis cachecticum aut caco-chymicum mutare valent; sub *Alexiphar-*



*macis* ea volo quæ venena in ventriculo aut intestinis hærentia aut externe per vulnera adplicata immutant aut destruunt. *Deobstruentia* denique appello remedia quæ præcipue *Physconia* abdominali mendentur; *Resolventia* è contra ea quæ externe adplicata absorptionem humorum ex tumoribus topicis promovere videntur.

Quod nomina morborum spectat, quos sub usu medicamentorum adduxi; Nosologiam Cullenii secutus sum, paucis exceptis. Sub *Ataxia* mobilitatem systematis nervosi morbosam intelligo; sub *Physconia abdominali* autem obstructionem viscerum non solum sed et infarctum vasorum abdominalium (morbos in praxi hodie frequentissimos) comprehendo.

Menagogum specificum nullum novi præter terrorem subitum.—Ea quæ sub hoc titulo indicavi pharmaca, naturam ad hanc evacuationem dispositam solum juvare videntur.

Signum (?) adjectum dubium indicat an remedium in dato casu revera valeat.

Dosis notata ubique, ubi aliter ex-

pressum non est, ætati mediæ convenit.

PRÆPARATORUM nonnisi efficaciorum et vere utilium memini sub titulis sequentibus: aqua (vulgo *aqua stillatitia*); Alcohol (vulgo *spiritus plantæ*); Oleum volatile (vulgo *oleum essentielle.s.æthereum.s.stillatitium*); Oleum fixum (vulgo *oleum unguinosum s.expressum*); Tinctura; Extractum; Succus inspissatus; Conserva; Syrupus.—Composita nulla adduxi; utpote virtutem ab ingrediente simplici maxime activo mutuantia.

Ad finem denique, præmissis indicibus amplis, in opere tali præprimis necessariis, indicem virium adjeci, in quo simplicia juxta virtutes quas in corpore exserunt, ordine alphabetico disposita sunt.

Et hic quidem lectores fortasse plures titulos frustra quærent à me studio, non negligentia, omissos. Cæterum, ut supra monui, nullus sibi persuadeat, morbos simplici et servili adplicatione remediorum sub diversis titulis insertorum curari. Sed hic labor, hic opus: Dona naturæ lectura et instructione acuuntur; defectum

eorum nullus liber supplere valet. Medicamenta præstantissima, imo ipsa heroica, sæpe fallunt si promiscue ut quidem vulgo frequentissime fieri solet, nulla aut naturæ aut causæ aut stadii morbi aut habitus ægri ratione habita, administrantur. Specifica, ut vocant remedia, utpote quæ morbo cuicunque fixo, semper et sub omni temperamentorum et causarum diversitate debellando paria sint, nulla agnosco. Cinchona dialcipyram non semper tollit: Syphilis, sub diversis et morbi et ægri circumstantiis, diversa omnino Hydrargyri præparata poscit; hinc sales et oxyda hujus metalli ad debellandum hunc morbum cæterum efficacissima, promiscue et nulla aut ægri aut morbi status ratione habita, adplicata non raro fallunt; et Opium ipsum ex eadem causa spasmus non semper compescit, nec erethismum aut dolorem ubique sedat.

Ultimo demum Elenchum medicamentorum simplicium nuper à sagacissimo medico E. DARWIN in *Zoonomia* sua secundam novam theoriam propositum subjunxi,

cujus meritum non discutio, sed practicis philosophis dijudicandum relinquo; sicque opus absolvi.—Intra paucum tempus, si otium favet, Pharmacopœam Medici practici seu Epicrisin analyticam medicamentorum præparatorum et compositorum quæ à Practicis Europæ, ingenio et probitate jure celebribus, efficacissima inventa novi, publico juri tradere intendo.

# DE PONDERIBUS

## ET MENSURIS PHARMACEUTICIS.

PONDERA pharmaceutica, in diversis Europæ regionibus usitata, sunt:

GRANUM (gr j.) G. *un grain*, H. *un grano*, æstimatur pondere æquare granum piperis, Hispanis vero granum hordei. Quando igitur pars grani  $\frac{1}{2}$  aut gr.  $\frac{1}{4}$  præscribitur, granum piperis aut ordei in duas aut quatuor partes finditur.

SCRUPULUS (ʒj.) G. *un scrupule*, H. *un escrúpulo*, continet grana viginti. In Gallia et in Hispania scrupulus continet grana viginti quatuor.

DRACHMA (ʒj.) G. *un gros ou une drachme*, H. *una dracma*, continet scrupulos tres aut grana sexaginta; in Gallia vero et in Hispania grana septuaginta duo.

UNCIA (ʒj.) G. *une once*, continet drachmas octo, seu grana 480, in Gallia et in Hispania 576.

UNCIA SEMIS seu dimidia (ʒʒ.) G. *une*

## XVIII DE PONDERIBUS

*demi-once*, continet drachmas quatuor.

LIBRA MEDICINALIS (℥j.) g. une *libre* contitet uncias duodecim; — in Gallia uncias sedecim.

LIBRA CIVILIS, continet uncias sedecim.

Hæc tamen ponderum divisio, apparen-  
ter fere æqualis, pro ratione regionum  
multum difert. Nam Gallorum æque ac  
Anglorum libra pondere superat libram  
Germanorum, ita ut horum libra medici-  
nalis unciis undecim cum drachmis quin-  
que et semis Gallorum æquivalcat, ac  
drachmis tribus cum scrupulis duobus et  
granis XIII  $\frac{27}{103}$  levior sit libra Anglorum.

Pondera supra dicta, eadem ratione di-  
visa, ubique fere etiam pro determinan-  
dis liquidis inserviunt.

MENSURÆ pro medicamentis siccis, præ-  
cipue herbis, usitatae, vagæ omnino sunt:

FASCICULUS = unc. j.

N. B. juxta alios fasciculus æquivalet un-  
ciis sex aut manipulis duodecim.

MANIPULUS = unc. ℥.

PULGILLUS (quantum tribus digitis capi  
potest) = drachm. ℥ vel j.



MENSURÆ pro liquidis usitatæ sunt sequentes.

Cochleare majus = unc. β.

Cochleare minus = drach. j.

Pinta Anglorum = lib. j seu unc. xvi.

Pinta Gallorum (*Pinte*) = lib. ij seu unc. xxxii.

Mensura una Germanorum = lib. ij — iij.

— dimidia (Nöessel) = lib. j β.

Mensuræ quadrans = unc. x—xii.

Congius Anglorum (*gallon*) = libris seu pintis Anglicis viij.

Cantharus Suecorum = lib. v β.

Ex dictis patet, in genere præstare, liquida æque ac sicca, pondere potius quam mensura, præscribere.

## ADPLICATIO

*Novorum Galliæ ponderum & mensurarum pro usu medico-pharmaceutico.*

Mensuræ novæ quæ æstimandis ponderibus in Gallia nuper in usum publicum

## XX DE PONDERIBUS

introducæ fuerunt, communem ducunt normam à gravitate aquæ, certum quoddam volumen (ad datam temperaturam) occupantis: hocce liquidi volumen definitum est ope novarum mensurarum linearium, quæ ipsæ ex magnitudine terræ deductæ sunt, et ad longitudinem arcus meridiani, à polo at æquatorem ducti, tanquam ad primigeniam unitatem referuntur.

Pondus centimetri cubici aquæ destillatæ, summe condensatæ, quæ ad gradum glaciei quam proxime accedit, *gramma* audit.

Pondus decimetri cubici ejusdem liquidi nuncapatur *kilo-gramma*, quod idem audit ac *gramma* millies repetitum.

Unitates quæ *gramma* subdividunt, totidem sunt grammatis fractiones decimales quæ designantur nominibus *deci-gramma*; *centi-gramma*; *milli-gramma*; quasi diceres decima, centesima, millesima pars grammatis.

A grammate ad *kilo-gramma* fit progressio per unitates pariter decimales; quæ

sunt *deca-gramma* et *hecto-gramma*; quorum prius decem grammatibus, posterius centum grammatibus æquivalet.

Unitas decimalis quam dividit *kilogramma*, insignitur nomine *myria-gramma*; cujus interpretatio est *gramma* decies milles adsumptum.

Unaquæque ex prædictis unitatibus prostat metallo confecta, et in usum communem traditur, ponderibus quibuslibet æstimandis dicata; et ut ponderatio facilior redderetur, uniuersique unitati suum Duplum, suus Semis adscribuntur.

Quæ cum ita sint, fluit series haud interrupta novorum ponderum, quorum valores partibus libræ et semi-libræ consignatos et veritati proximos subministrat tabula sequens.

Duplum myriagramma = libris 40.

Myriagramma = libr. 20.

Semi-myriagramma, aut 5 kilogrammata = libr. 10

Duplum kilogramma = libr. 4.

Kilogramma = libr. 2.



Semi-kilogramma, aut 5 hectogrammata = libr. 1.

Duplum hectogramma = unc. 6.

Hectogramma = unc. 3.

Semi-hectogramma = unc.  $1\frac{1}{2}$ .

Duplum decagramma = unc.  $\frac{2}{3}$ .

Decagramma = unc.  $\frac{1}{2}$ .

Semi-decagramma = unc.  $\frac{1}{6}$ .

Duplum grammata = drachm.  $\frac{1}{2}$ .

Grammata = drachm.  $\frac{1}{4}$ .

Semi-grammata = granis 9 ad 10.

Duplum decigramma = gran. 4.

Decigramma = gran. 2.

Semi-decigramma, aut 5 centigrammata = grano 1,

Centi-gramma = grani  $\frac{1}{5}$ .

Præcedentem tabulam vel leviter per-  
lustranti facile patebit, pondus 100 li-  
brarum in veteri systemate vulgo dictum  
centenarium (*quintal*) idem esse cum  
quinque Myria - grammatibus ; unam  
libram parem esse quinque hectogram-  
matibus ; unciam quam proxime acce-  
dere ad trientem hectogrammatibus ; dra-  
chmam ad quatuor grammata ; granum

ad semi-decigramma aut quinque centigrammata.

His probe intellectis, nullam difficultatem facessere potest conversio veterum mensurarum in novas. Hæc operandi ratio nullas medicis aut pharmacopolis moras causavit. Sat erit hic loci nonnulla referre exempla conversionum quæ magis communiter occurrunt:

Quadrans grani = 1 aut 2 centigramm.

Semi-granum = 3 centigramm.

Granum = 5 centigrammatibus.

2 Grana = 1 decigrammati.

10 Grana = 5 decigrammatibus.

20 Grana = 1 grammati.

30 Grana =  $1 \frac{1}{2}$  grammati.

40 Grana = 2 grammatibus.

1 Drachma = 4 grammatibus.

1 Uncia = 3 decagrammatibus.

1 Libra = 5 hectogrammatibus.

Ex tabula præcedenti patet summam decigrammatum prodire, quando granorum numerus per numerum 2 dividitur, haud aliter quam in novis monetis Gallicis decimorum (*décimes*) summa obtinetur, dum

per 2 dividitur numerus assium Gallicorum (*sous*).

Hinc concluditur grana 4; 6; 8 decigrammatibus 2; 3; 4: — et grana 5; 7; 9 decigrammatibus  $2\frac{1}{2}$ ;  $3\frac{1}{2}$ ;  $4\frac{1}{2}$ ; coæquari.

Cæterum nullus existimet, rem ad vivum resecandam esse, atque, quando præscribuntur *ex. gr.* grana duo tartari stibiatii aut drachmæ duæ sulfatis magnesiæ vel uncia duæ aquæ aut tincturæ cujuscunque, incumbere curam, doses consignandi modo qui strictissime cum novis ponderibus conveniat; neminem enim fugiet, nec plus nec minus proficua fore medicamina, si in dosi deficient aut abundant nonnullæ portiunculæ aut corpuscula, quorum præstantia aut absentia vix indicatur trutina perfectissima. Id solum curandum, ut doses consignentur numeris rotundis: hosce autem et quidem solos indicat præcedens tabula.

Quicumque forte doses ponderibus libratas novis numeris exactissime expressas noscere desiderat, illi sequentes observationes servient.



In superiori tabella legitur, duo grana æquivalere uni decigrammati; revera autem unum decigramma continet duntaxat granum unum cum fractione  $\frac{89}{100}$ ; dum ponitur ergo unum decigramma pro duobus granis in dosi quæ adhiberi intenditur, fractio  $\frac{1}{20}$  deficit, quæ omnino negligi potest.

Pariter quando dicitur drachmam unam æqualem esse grammatibus quatuor, excipitur numerus fractus  $\frac{1}{21}$ ; quatuor quippe grammata unam conficiunt drachmam cum tribus granis et grani triente; hinc, dum præscribuntur quatuor grammata pro una drachma, dosi genuinæ additur fractio  $\frac{1}{21}$ .

Ubi uncia pro tribus decagrammatibus accipitur, ex legitima dosi detrahitur pars  $\frac{1}{31}$ .

Porro quisque facile conveniet rem esse plane indifferentem, si pro grano uno pars  $\frac{18}{20}$  aut  $\frac{19}{20}$  grani; pro drachma una, drachma cum tribus aut quatuor granis, (75 grana pro 72 granis); pro uncia una, uncia minus grani undecim (565 grana pro 576 granis) sumantur. Hi sunt tamen limites ultra quos non excurrunt errores

quos admittit computandi ratio quæ in superiori tabella proposita fuit.

Insuper considerari meretur, in novo ponderum systemate medicis offerri modum doses accomodandi ætati et temporamentis, longè commodiorem, quam in veteri systemate; calculus enim decimalium, longe facilius quam calculus vulgaris obviam reddit rationem quam habent unitates cujusvis ordinis ad unitates ordinis superioris. Ex. gr. non ita facile videtur quid sint 20 grana ad unciam; contra, quid sit gramma hectegrammati comparatum, sine mora percipitur, nomine quo signatur unitas ordinis superioris, indicante illam esse unitatem ipsissimam ordinis inferioris centies repetitam.

Quod mensuras capacitatis pro liquidis mensurandis attinet, mensuræ novæ veteribus in præscriptionibus formularum commode substitui possunt methodo sequenti:

LITRUM. (*le litre*) aquæ destillatæ æquivalet pintæ Parisinæ (*pinte*) seu libris duabus et drachmis quinque gallicis veteribus; et pondere æquat kilogramma.

SEMILITRUM (*demilitre*) æquivalet libræ uni cum drachmis duabus et semis (*chopine*).

DUPLUM DECILITRUM æquivalet unciis sex cum drachmis duabus (*quart de pinte* ou *demi-septier*) et pondere æquat duplum hectogramma.

DECILITRUM æquivalet unciis tribus cum drachma una et pondere æquat hectogramma.

SEMI-DECILITRUM æquivalet unciae uni cum drachmis sex (*gobelet*; *cyathus*), et pondere æquat quinque decagrammata.

N. B. *Litrum* continet circiter 50 pollices cubicos veteres; hinc *duplum centilitrum* (*double centilitre*) respondet pollici cubico, seu drachmis quinque, seu cochleari majori aquæ destillatæ.

Hic gradum sisto atque præsentibus observationibus finem impono; quæ si nulla ex parte, ut spero, claudicent, medicis offerunt maximam facilitatem mensuras et pondera vetera in nova commutandi.



## CANONES.

1. *RADICES sero autumnno , postquam folia caulesque emarcuere , vel hyeme aut primò vere antequam folia germinant , effodiantur. In delectu radicum , spongiosæ , farinacæ , cariosæ , imprimis vero exsucco cortice tectæ , rejiciantur ; Bonitatem enim radicum determinat perfectus torosusque corticis habitus. Quæ principiis aromaticis et resinosis præditæ sunt radices , lotionem non purgantur ; sufficit , si de modice siccatis pulveres sordesque excutiantur. Prægrandes et succulentæ radices in taleolas disectæ , reliquæ quales sunt , cito siccentur , aut loco calido umbroso ventis perflato , aut fornacis leni cautoque calore siccatae , frigido siccoque serventur loco , ne fætorem mucoremque contrahant , aut uredine atque carie exedan-*

*tur. Fragrantes vasis clausis, omnes locis umbrosis conserventur. Inquiline, tum succulentæ, multum gummosæ, tum etiam subtilibus aut facile avolantibus viribus præditæ, quotannis recenter legantur et arcesantur. Quibus siccatis exigua, recentibus vero multa virtus est, ut Cochleariæ armoraciæ, Iridium, Ari maculati, Scillæ maritimæ, Bryoniæ albæ, illæ opportuna tempestate collectæ, sabulo sicco reconditæ, servantur.*

2. *LIGNA hyberno succidantur tempore, mox findenda. STIPITES versus autumnum, quo tempore succo efficaci, probe cocto scatent, resecentur. CORTICES à fructicibus autumnò, ex arboribus adulta hyeme aut accedente vere, dum facillime à ligno secedunt, aut hyeme deglubantur.*

3. *TURIONES gemmæque primo vere, quo tempore turgidulæ sunt et ante explicationem foliorum decerpantur. HERBÆ colligantur adultæ cum foliis rite ex-*

*pansis, antequam flores sese explicuerint: Quæ semper virent, quovis tempore colligere licet; vernum tamen præstat. FOLIA colligenda sunt tempestate sicca, non diu post ortum solis, simul ac ros, quo noctu canescunt plantæ, solis radiis dissipatus fuerit; decerpantur vero postquam defloruit et antequam semina maturavit planta. Herbæ indigentiæ quotannis recentes comparari debent; effætæ superstites, si placet, pro sale alcalino herbarum adhiberi possunt. Exsiccatio herbarum citissime fiat, aut calido, umbroso et ab aëre perflato loco, aut lento cautoque fornacis calore.*

4. FLORES, absque calice et pistillo, sola corolla servata, decerpantur nuper expansi, certe antequam antherarum pollinem exploserint, eo tempore ubi radii solis rorem dissipaverint. COMA floris colligenda dum flos explicari incipit. Siccentur ut herbæ, et quidem quam fieri potest citissime.



5. SEMINA colligantur perfecte matura, dum sponte à planta secedunt, antequam excidant, locoque ab aëre perflato probe siccentur, sine ignis adminiculo. Quæ capsulas, involucra etc. retinent, ea his munita servantur: Plerorumque autem seminum delectus ita instituendus est, ut aquæ immittantur, et quicquid supernatat abjiciatur: quod vero fundum petit iterum siccet. FRUCTUS nonnisi maturi decerpantur, dum pericarpia sponte sese aperire incipiunt.

In genere notandum, vegetabilia tempore anni improprio vel ex solo artificiali, non nativo, collecta, aut male siccata, et negligenter conservata effæta sæpissime, aut plene corrupta esse; hinc à medico practico prudenti adhiberi nunquam debent nisi ex solo ubi natura eadem sponte producit, decerpta. Alpina ex Alpibus, et quæ solum sabulosum aut paludosum amant ex solo sicco arenoso aut ex humido palustri colligenda;

*eaque probe siccata in locis aut vasis  
ab accessu radiorum solarium sollicite  
conservanda sunt, siquidem virtutes ea-  
rum in curandis morbis efficaces ex-  
periri desideramus.*

# MATERIA

## MEDICA.



### I. Vegetabilia, eorumque præparata.

#### A

**ACANTHUS MOLLIS.** Folia; herba.  
CLAS. *Didyn. O. Angiosp. Perennis; Eu-*  
*rop. austral.*  
OFFICINIS: *Branca ursina.* GALLIS: *Pied*  
*d'ours.* ACANTE: *Branc-ursine.* HISPANIS. *Pie de oso. Yerba gigante, Branca ursina.*

QUALITAS: mucilaginoso.  
VIRTUS: emolliens? demulcens, diuretica.  
USUS: ambusta? tumores.  
DOSIS: *si in decocto.*  
PRÆPARATA:

**ACHILLEA AGERATUM.** Herba. Flores.  
CL. *Syng. O. Polyg. superfl. Perennis;*  
*Europ. austr.*  
OF. *Ageratum. H. Agerato.*

QUAL. Odor suaveolens; sapor amaricans, aromaticus.

VIRT. Stomachica. Vûlneraria.

USUS. Dyspepsia.

DOS.

ACHILLEA ATRATA. Herba.

CL. & O. præced.

OF. *Genipi veri herba*. H. *Achilea negra*.

QUAL. Odor aromaticus; sapor amarus.

VIRT. Stomachica.

USUS. Dyspepsia.

ACHILLEA MILLEFOLIUM. Folia; summitates florentes.

CL. & O. præced.

Perennis.

OF. *Millefolium*. G. *Millefeuille*. H. *Milen rama*.

QUAL. In oleo volatili et extractivo amaro residens; sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. Stomachica; leviter stimulans. Asttringens, tonica, vulneraria.

USUS *infusi*: dyspepsia; colica flatulenta; hæmoptysis; hæmorrhoids; hysteria; dolor spasmodicus post partum. Hemorrhagia, topice, cephalalgia, tumores.

DOS. Drach. ij-iiij ad lib. j aquæ in infuso.

PRÆP. Extractum.

ACHILLEA MOSCHATA. Herba.

QUAL. Odor moschatus.

VIRT.

USUS.

**ACHILLEA PTARMICA.** Radix; herba;  
flores.

CL. & O. *præced.* . . . . . *Perennis.*

OF. *Ptarmica.* G. *Ptarmique.* L'herbe à  
éternuer. H. *Tarmica.*

QUAL. In principio resinoso residens; odor  
florum nauseosus; sapor radicis acris,  
urens.

VIRT. Errhina; sialagoga.

USUS. (Loco radicis anthemidis-pyrethri)  
paralysis linguæ; odontalgia.

**ACHRAS SAPOTA.** Semen; cortex.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Arborea; Ame-*  
*ric. merid.*

OF. *Sapotilla.* H. *Sapotilla.*

QUAL. *Seminum*: sapor acris, amarus.  
*Corticis*: amaro-stypticus.

VIRT. *Seminum*: diuretica. *Corticis*: sto-  
machica; roborans.

USUS *seminum*: colica nephritica; dysuria.

*Corticis* loco cinchonæ: intermittentes.

DOS. *Seminum*: drach. j-ij ad ℥j. aquæ in  
infuso.

**ACONITUM ANTORA.** Radix.

CL. *Polyandr.* O. *Trig.* *Alpina.*

OF. *Anthora.* H. *Antora.*

QUAL. Venenata; sapor acris, amarus.

VIRT. Cathartica; anthelminthica.

USUS.

DOS. *Pulveris*: drach. j.

**ACONITUM CAMMARUM.** Folia; herba.  
 CL. *Polyandr.* O. *Trig.* *Alpina*; *Europ. austr.*  
 OF. *Aconitum.* G. *Aconit*; *chaperon de*  
*moine.* H. *Aconito.*

QUAL. Venenata; in principio acri res-  
 dens; sapor acris; odor nauseosus.

VIRT. Præstantior napello: sudorifica; diu-  
 retica.

USUS *extracti*: Rheumatismus chronicus;  
 amaurosis; ulcus rebelle. Paralysis, an-  
 chillosis, tumores glandulares.

PRÆP. Succus inspissatus herbæ recentis  
 junioris (vulgò *extractum*). Gran. j-ij.

**ACONITUM NApELLUS.** Herba.

CL. & O. *præced.* *Alpina.*

QUAL. et VIRT. *præced.* sed debilior.

Hodiè in Hispania utitur loco camari.

N. B. Antidotum ranunculi thoræ?

**ACORUS CALAMUS.** Radix.

CL. *Hexandr.* O. *Mong.* *Perennis*; in lo-  
*cis humidis paludosis.*

OF. *Calamus aromaticus*; seu *vulgaris*;  
*acorus verus.* G. *Rosseau aromatique*;  
*Acorus odorant.* H. *Calamo aromatico.*

QUAL. Odor fragrans; sapor acris, aroma-  
 ticus, amaricans.

VIRT. Præstans: stimulans; stomachica.

USUS. Dyspepsia.

DOS. Drach. semis.

PRÆP. Extractum; conditum.

ADIANTHUM CAPILLUS VENERIS. } Her-  
 ————— PEDATUM. } ba.

CL. *Cryptogam. O. Filices.*

OF. *Capillus veneris. Capillaire de Mont-  
 pellier. Capillaire d'Amerique. H. Cu-  
 lantrillo de Pozo.*

QUAL. *Odor debilis, sapor subdulcescens,  
 leniter amaricans.*

VIRT. ? *Substringens.*

USUS præcipuus adianthi pedati pro syrupo  
 capillorum veneris dicto.

PRÆP. Syrupus: G. *syrop capillaire.*

ADONIS VERNA.

————— APPENNINA.

} Radix.

CL. *Polyandr. O. Polyg.*

QUAL.

VIRT. *Menagoga (PALLAS).*

USUS.

ÆSCULUS HYPOCASTANUM. Cortex.

CL. *Hexandr. O. Monog. Arborea.*

G. *Maronier d'Inde. H. Castaño de In-  
 dias.*

QUAL. *Styptica.*

VIRT. *Adstringens.*

USUS *extracti vel pulveris: intermittentes.*

PRÆP. Extractum.

DOS. Drach. j. Extracti in unc-j. aquæ cin-  
 namomi, cujus gutt. lx. omni trihorio.



**ÆTHUSA MEUM. Radix.**

CL. *Pent. O. Digyn. Perennis; alpina; Europ. austral.*

OF. *Meum; meu radix. n. Meo atamantico.*

QUAL. In oleo volatili et principio resinoso residens; sapor acris, aromaticus, calefaciens.

VIRT. Stimulans; carminativa; menagoga, antiasthmatica.

USUS Tertiana; asthma pituitosum; leucorrhœa.

**AGARICUS MUSCARIUS.**

CL. *Criptogam. O. Fungi. In sylvis.*

QUAL. Venenata.

VIRT. Cathartica; sudorifica.

USUS *succi inspissati*, vulgo ad necandas muscas.

USUS *internus*: Epilepsia; paralysis à morbis cutis retropulsis. *Externus* pulveris inspersi: ulcus malignum; gangræna.

DOS. Pulveris gran. x-xxx. cum aceto pro dosi.

N. B. Pars terræ insidens sola, autumno colligenda, mundata, siccata, et pulverizata in vasis probe clausis usui servetur. Hodie utitur Boletus Laricis. L. Boletus purgans Persoon. n. Agarico blanco.

**AGAVE AMERICANA. H. Pita.**

CL. *Hexandr. O. Monog.*

USUS *decocti foliorum*: Syphilis.

DOSIS: unc. j. ad libr. j. aquæ.

AGRIMONIA EUPATORIA. Herba.

CL. *Dodecand. O. Digyn. Perennis.*

OF. *Eupatorium veterum; agrimonia. G.*

*Aigremoine. H. Agrimonia.*

QUAL. Substyptica.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

AJUGA PYRAMIDALIS. Herba.

CL. *Didyn. O. Gymnosp. Bienis; in nemorosis siccis.*

OF. *Herba consolidæ medicæ seu Bugulæ.*

QUAL. Amara; substyptica.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

Hodie utitur *Ajuga reptans. H. Consuelda media ò Bugula.*

ALCEA PURPUREA. Flores.

CL. *Monadelph. O. Polyandr.*

QUAL. *consolidæ medicæ seu Bugulæ.*

VIRT.

USUS chemicus, ut eximium reagens.

ALCEA ROSEA. Flores.

CL. & O. *præced. Perennis; Asiatica; hortensis.*

OF. *Malva arborea. H. Malva rosa.*

QUAL. Fatua; mucilaginosa.

VIRT. Involvens; emolliens.

USUS *infusi* forma gargarismatis: cyranche.

**ALCHEMILLA VULGARIS.** Herba; radix.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Alchemilla.* G. *Alchemille.* H. *Pied de lion.*

QUAL. inodora; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS.

**ALLAMANDA CATHARTICA.** Folia.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Frutex scandens; Guiana.*

QUAL. Lactescens; amara.

VIRT. Cathartica; stomachica.

USUS *infusi*: colica pectorum.

**ALLIUM CEPA.** Radix recens; succus radicis.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Bienis*

OF. *Cepa.* G. *Oignon.* H. *Cebolla.*

QUAL. *Recentis*: odor peculiaris, *alliacus* dictus, volatilis; sapor acris.

VIRT. Diaphoretica; anthelmintica; flatulenta; aphrodisiaca; diuretica; rubefaciens. *Radicis coctæ*: emoliens; maturans. *Assatæ*: stimulans.

USUS *externus succi*: otalgia; dysecoea rheumatica. *Radicis* forma cataplasmatibus: phlegmone; bubo; varix ani.

**ALLIUM SATIVUM.** Radix recens;

ejusque succus.

CL. & O. *Præced.*

*Perennis.*

OF. *Alium. c. Ail. h. Ajo.*

QUAL. In principio acri et pauco oleo volatili residens; odor alliaceus, volatilis; sapor acris, subcausticus.

VIRL. Præstans: diuretica; diaphoretica; anthelminthica; rubefaciens; maturans.

USUS *succi externus*: dysecocæ; herpes; clavus. *Radici recentis, vel succi*: quartana; dyspepsia; hydrops; asthma pituitosum; scorbutus.

ALOE PERFOLIATA.

—— SPICATA,

Aliæque VARIETATES.

} Succus extractivo - resinosus  
} inpissatus.

CL. *Hexandr. O. Monog.* Perennis;  
Afric. Ind. occid.

OF. *Aloë socotrina*: succus optimus incisione foliorum obtentus in insula Socotora. *Hepatica*: vilior expressione in insula Barbadoes. *Caballina*: pars post expresionem residua. *c. Aloës*:  
h. *Acivar.*

QUAL. Heroïca: in principio extractivo-resinoso residens; sapor intense amarus, nauseosus; odor nauseosus.

VIRT. Cathartica, intestinum rectum præcipue irritans; stomachica; menagoga; anthelminthica.

USUS. *internus*: Obstipatio; pyrosis; dyspepsia; hæmorrhoids suppressa. *Externus*: ulcus putridum; caries; otor-

rhoea; epiphora gr. j. pulv. oculo inflatum.

PRÆP. Extractum aquosum; tinctura; vinum aloëtico-alcalinum.

DOS. Succī vel ejusdem extracti aquosi gr. ij.; Tincturæ unc. semis-ij. Vini aloët.

3j. ad unc. semis.

## ALOEXYLUM VERUM (LOUREIRO.)

Lignum.

CL. O. *Arbor. Cochinchina.*

OF. *Lignum aloës S. agallochum verum.*

QUAL. Lactescens; venenatissima; medullium trunci amarissimum.

VIRT. Inebrians; anthelmintica; exco-  
rians.

USUS. Cholera; paralysis.

DOS. Gran. xx.

PRÆP. Resina; oleum volatile.

ALTHÆA OFFICINALIS. Radix; herba.

CL. *Monad. O. Polyand. Perennis; in locis humidis.*

OF. *Althæa. c. Guimauve. H. Malva-visco.*

QUAL. Mucilaginosa; insipida.

VIRT. Lubricans; emolliens.

USUS. Tisis; raucedo; stranguria. *Externus* forma enematis vel cataplasmatitis: tensesinus; phlegmone; dolor.

PRÆP. Decoctum; syrupus; pasta; unguentum.

**AMMI MAJUS.** Semen.

CL. *Pentand. O. Dygin. Annuæ; Europ. austral.*

OF. *Ammi vulgare. c. L'ammi. n. Ameos.*

QUAL. Leviter aromatica.

VIRT. Stomachica; carminativa.

USUS.

**AMOMUM CARDAMOMUM.** Semen.

CL. *Monand. O. Monog. Indiæ orientalis.*

*Amomum repens. (SONNERAT.)*

OF. *Cardamomum minus. c. Cardamome.*

*n. Cardamomo menor.*

QUAL. In oleo volatili residens; sapor acris, fervidus, aromaticus; odor gratus, fragrans.

VIRT. Stimulans; calefaciens.

USUS. Dyspepsia; flatulentia; chlorosis.

PRÆP. Tinctura.

DOS. Pulveris gran. x-xxx. Tincturæ ʒj-ij.

**AMOMUM GRANUM PARADISI.** Semen.

CL. & O. *præced. Perennis; Guinea.*

OF. *Cardamomum majus s. maximum.*

*c. Amome de Madascar. n. Granos del Paraiso.*

QUAL. In principio resinoso, magis quam oleo volatili residens; sapor urens instar piperis; odor subaromaticus.

VIRT. Eadem ac præced.

USUS.

## AMOMUM ZINGIBER. Radix.

CL. & O. *præced.* Perennis; Ind.  
oriental.

OF. *Zingiber s. zinziber fuscum et album.* G. *Gingembre.* H. *Gengibre mayor.*

QUAL. In oleo volatili et paucio principio resinoso residens; sapor acris, aromaticus, fervidus; odor gratus, subfragrans.

VIRT. Calefaciens; sialagoga; stomachica.

USUS. Dyspepsia; tisis stomachica; colica flatulenta; diarrhæa. *Externus*: uvulæ laxitas.

PRÆP. Conditum; tinctura.

DOS. Pulv. g. v-x-xxx. Conditi ʒj-unc. semis. Tinct. ʒj-ʒij.

## AMYGDALUS COMMUNIS. Nuclei.

*Varietas.* a. sativa: dulcis et amara.

CL. *Icosand.* O. *Monog.* *Arborea*, *Europ. austr.*

OF. *Amygdalæ dulces et amaræ.* G. *Amandes douces et amères.* H. *Almendras dulces y amargas.*

QUAL. In oleo fixo unguinoso residens.

VIRT. Nutriens; involvens; emolliens.

USUS *dulcium*: febres; tisis. *Amararum*: ebrietas; vermes.

PRÆP. Emulsio ex amygdalis dulcibus.  
Oleum ex dulcibus vel amaris promiscue paratum.

## AMYGDALUS NANA. Nuclei.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.



AMYGDALUS PERSICA. Flores re-  
centes; nuclei.

CL. & O. *præced.* *Arborea; hortensis.*

OF. *flores persici.*

G. *Pêcher.* H. *Persicos, melocoton, pavia, abridores, duraznos.*

QUAL. *Nuclei: oleoso mucilaginoso; odor florum peculiaris, nauseosus.*

VIRT. *Eadem ac amygdal. amararum.*

PRÆP. *Aqua florum.*

AMYRIS ELEMIFERA. Resina.

CL. *Octand. O. Monog.* *Arborea; Americ.*

OF. *Gummi Elemi.* H. *Goma de limon.*

QUAL. *Color pellucidus, flavescens.*

VIRT. *Resolvens; stimulans.*

USUS *externus* in emplastris et unguentis:  
tumores; punctura.

AMYRIS GIDEADENSIS.

OPOBALSAMUM.

} *Vide Balsa-*  
mea Mecca-  
nensis.

H. *Opobalsamo, balsamo de la Meca.*

AMYRIS ZEYLANICA (RETZIUS). Re-  
sina.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Zeylan.*

OF. *Gummi Elemi orientalis.*

QUAL. et VIRT. *Eadem ac amyr. elemiferæ.*

ANACARDIUM OCCIDENTALE. Nux.  
(testæ melligo).

CL. *Enneandr. O. Monog. Arbor; Ind. orient. et Brasil.*

H. *Anacordios.*

QUAL. *Melliginis*: nigra; urens.

VIRT. Excorians, tinctoria.

USUS. Maculæ; impectigo; herpes.

ANAGALLIS ARVENSIS. Herba.

N. B. Colligenda antequam flores explicati sint.

Varietas: a. flore rubro b. flore luteo.

CL. *Pentand. O. Monog. Annua.*

OF. *Herba anagallidis rubræ. c. Mou-ron. H. Anagalide, Murages.*

QUAL. Inodora; sapor acris, nauseosus.

USUS. Epilepsia; melancholia. *Extracti* anag. flore luteo: icterus. (STOLL.)

POS. Pulveris gr. xx. quater de die. *Extracti*: g. j-ij. Pro infuso zij. ad tñj. aquæ.

ANAGYRIS FÆTIDA. Folia; semen.

CL. *Dec. O. Monog. Frutex; Europ. austr.*

QUAL. Odor teter, foetidus; sapor amarus.

VIRT. Cathartica; menagoga.

USUS.

ANCHUSA OFFICINALIS. Radix; herba; flores.

CL. *Pent. O. Monog. Perennis.*

OF. *Buglossum*. G. *Buglosse*. H. *Buglosa*,  
*lengua de buey*.

QUAL. Mucilaginoso.

VIRT.

USUS.

ANCHUSA TINCTORIA. Radix.

CL. & O. *præced.* Perennis; Europ.  
 austr.

OF. *Alcanna spuria* s. *vulgaris*. G. *Orca-*  
*nette*. H. *Anchusa de tinte*.

QUAL. Rubra.

VIRT. Tinctoria.

USUS.

ANDROPOGON NARDUS. Fibrae radiceis.

CL. *Polyg.* O. *Monæc.* Perennis; Ind.  
 orient.

OF. *Spica nardi*. s. *spicae indicæ radix*.  
 H. *Spica nardo*.

QUAL. Eximia; odor fragrans; sapor acris,  
 amaricans.

VIRT. Cardiaca; stomachica.

USUS. Asthenia; Dyspepsia.

ANDROPOGON SCHÆNANTHUS. Herba.

CL. & O. *præced.* Perennis; Arabiæ.

OF. *Herba schœnanthi* H. *Junco oloroso*.

QUAL. Odor fragrans; sapor amaricans.

VIRT. Carminativa; menagoga.

USUS.

**ANEMONE HEPATICA.** Herba; flores.  
CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Perennis*; *montana*.

OF. *Hepatica nobilis.* H. *Hepatica.*

QUAL. Inodora; insipida.

VIRT.

USUS.

**ANEMONE NEMOROSA.** Herba; flores  
recentes.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

QUAL. Venenata; in principio acri volatili  
residens.

VIRT. Corrodens.

USUS *externus* loco cantharidum: cephalæa; tertiana; arthrodynia rheumatica;  
ischias.

**ANEMONE PRATENSIS.** Herba; flores.

CL. & O. *præced.* *Perennis*; in *locis nemorosis*, *montanis*, *arenosis*.

OF. *Pulsatilla nigricans.* G. *Pulsatille*;  
*coquelourde.* H. *Pulsatila.*

QUAL. Venenata; in principio acri residens; acerrima.

VIRT. Corrodens; rubefaciens, resolvens;  
diuretica.

USUS *succi inspissati*: amaurosis; paraly-  
sis. *Externus*: ulcus; herpes; caries.

PRÆP. Succus inspissatus *vulgo extractum*;  
*infusum.*

DOS. *Extracti*: gran. j-viij; pro infuso  
drach. j-iiij ad ℥-j aquæ.

N. in Hispania utitur Anemone Pulsatilla,  
vulgo Pulsatila.

ANETHUM FŒNICULUM. Semen.

CL. *Pentand. O. Digyn.*

*Biennis vel perennis hortensis.*

OF. *Semen fœniculi. s. fœniculum dulce.*

G. *Fenouil. , ou anis doux.* H. *Hinojo.*

QUAL. Præstans: in oleo volatili, non acri,  
residens; odor teter; sapor dulcescens,  
aromaticus.

VIRT. Carminativa; lactifera; resolvens.

USUS. Dyspepsia; flatulentia; colica infantum;  
defectus lactis; ophthalmia.

DOS. Pulv. gran. xx; pro infuso drach. ij-  
iij ad ℥j. aquæ.

ANETHUM GRAVEOLENS. Semen;  
herba.

CL. *Et O. Præced.*

*Annua hortensis.*

OF. *Anethum. G. Aneth. ou fenouil*  
*puant. H. Eneldo.*

QUAL. Præstans: odor teter; sapor subaromaticus.

VIRT. Hypnotica; carminativa; lactifera.

USUS. Colica; singultus; vomitus.

PRÆP. Oleum volatile seminum; aqua; alcohol vulg. spiritus.

DOS. Olei volat. gutt. v-x.

ANGELICA ARCHANGELICA. Radix;  
folia; semen.

CL. *Pentand. O. Digyn.*

*Biennis; Alpina, passim hortensis.*

OF. *Angelica sativa*. c. *Angélique*. h. *Angelica*.

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor acris, aromaticus, calefaciens.

VIRT. Stimulans; sialagoga; carminativa; sudorifica.

USUS. Dyspepsia; flatulentia.

PRÆP. Tinctura.

ANGELICA SYLVESTRIS. Radix.

CL. & O. præced.

*Perennis; in locis humidis, nemorosis.*

h. *Angelica silvestre*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced. sed debilior.

ANTHEMIS COTULA. Herba cum floribus.

CL. Syng. O. *Polyg. superfl.* *Annua in vis et locis asperis.*

OF. *Cotula foetida*. c. *Maroute* ou *camomille puante*; h. *Cotula fétida*.

QUAL. Odor foetidus; sapor amarus.

VIRT. Antispasmodica; stomachica.

USUS. Hysteria; asthma spasmodicum.

ANTHEMIS NOBILIS. Flores.

OF. *Chamæmelum nobile*; *Chamomilla Romana*. c. *Camomille romaine*. h. *Manzanilla de Botica ô fina*.

QUAL. Eximia: in oleo volatili et extracti-

no amaro residens; odor suaveolens; sa-  
por amarus.

VIRT. Antispasmodica; carminativa; sto-  
machica.

USUS. Hysteria: colica spasmodica; flatu-  
lentia; intermittentes.

## ANTHEMIS PYRETHRUM Radix.

CL. & O. præced.

Perennis, Europ.  
austral.

OF. *Pyrethrum verum*. c. *Pyrethre* ou ra-  
cine salivaire. n. *Pelitre*.

QUAL. Præstans: in principio resinoso re-  
sidens; sapor acris, penetrantissimus;  
urens.

VIRT. Sialagoga; errhina.

USUS *masticatorius*: odontalgia rheumati-  
ca; paralysis linguæ; tumor glandula-  
rum salivalium.

## ANTHIRRHINUM LINARIA. Herba.

CL. *Didyn*. O. *Angiosp.*

OF. *Linaria*. c. *Linaire*. n. *Linaria*.

QUAL. Præstans: odor hircino-urinosus;  
sapor subamarus.

VIRT. Diuretica; eccoprotica; alterans; re-  
solvens.

USUS. Icterus; hydrops: *Externus*: oph-  
thalmia; varix anii.

PRÆP. Unguentum.



**APIUM GRAVEOLENS.** Herba ; radix ;  
semen.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Biennis ; hortensis.*

OF. *Apium.* G. *Ache des marais.* H. *Apio.*

QUAL. Præcipue *seminum* : suspecta ; in  
oleo volatili residens ; odor subteter ;  
sapor dulcescens.

VIRT. Diuretica ; carminativa ; phthiriaca.

USUS.

**APIUM PETROSELINUM.** Radix ; her-  
ba ; semen.

CL. & O. *præced.* *Biennis.*

OF. *Petroselinum.* G. *Persil.* H. *Peregil.*

VIRT. *Radicis* : diuretica ; resolvens ; lac-  
tifuga ; phthiriaca.

USUS. Icterus ; dysuria ; ablactatio ; contu-  
sura ; pediculi.

**AQUILEGIA VULGARIS.** Herba ; flo-  
res ; semen.

CL. *Polyand.* O. *Pentag.* *Perennis,*

OF. *Aquilegia.* G. *Ancolie.* H. *Aguileña,*  
*Pelicano , manto real.*

QUAL. *Venenata.* *Seminum* : mucilaginoso ;  
oleosa.

VIRT.

USUS *Herbæ* : ieterus ; morbi cutis.

**ARBUTUS UVA URSI.** Folia.

CL. *Decand.* O. *Monogin.* *Fruticosa ; Europi*  
*sept. in collibus arenosis.*

OF. *Uva ursi*. G. *Arbousier trainant*;  
*bousserole*. H. *Uva de oso*; *gayuba*.

QUAL. Inodora; sapor amaro-stypticus.

VIRT. Adstringens; diuretica.

USUS. Calculus urinarius; ulcus renum,  
*vesicæ*.

DOS. Gr. xx. drach. j-ij.

ARCTIUM LAPPA. Radix; semen.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Liennis*

N. B. Duæ varietates.

OF. *Bardana*; *lappa major*. G. *Bardane*;  
*gloutron*. H. *Lampazo*, *bardana*.

QUAL. *Radicis*; sapor dulcis, subaust-  
 rus; odor nauseosus. *Seminum*: sapor  
 intense amarus; urinam decolorans.

VIRT. *Radicis*: diuretica; alterans; *semi-*  
*num*: Cathartica.

USUS *decocti radicis*: morbi cutis; syphi-  
 lis; arthritis.

DOS. Unc. j-ij ad ℥j. aquæ.

ARISTOLOCHIA ANGUICIDA. Radix.

CL. *Gynandr.* O. *Hexandr.* *Fruticosa*;  
*Ind. occid.*

QUAL. Odor nauseosus; serpentes fugans.

USUS *externus succi vulneri instillati*: mor-  
 sura serpentum.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis*

OF. *Aristolochia vulgaris s. tenuis*. s. c. c.  
*matitis*. G. *Aristolochie ordinaire*. H.  
*Aristolochia vulgar.*



QUAL. Præstans : odor graveolens ; sapor acris, amarus.

VIRT. Stimulans ; stomachica ; menagoga ; resolvens.

USUS Amenorrhæa retentionis ; chlorosis ; cachexiæ ; cacoethes ; fistula ; sarcoma.

N. B. Substituatur quandoque aristolochiæ serpentariæ.

ARISTOLOCHIA LONGA. } Radix.  
 \_\_\_\_\_ ROTUNDA. }

CL. & O. præced. Europ. austr.

H. *Aristolochia larga y redonda.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

ARISTOLOCHIA ODORATISSIMA.

CL. & O. præced. Jamaic.

QUAL.

VIRT.

USUS.

ARISTOLOCHIA SERPENTARIA Radix.

CL. & O. præced. Perennis ; Virgin. et Carolin.

OF. *Serpentaria virginiana.* c. *Serpentaire.* H. *Serpentaria virginiana.*

QUAL. Præstans : in oleo volatili residens ; odor hircinus instar valerianæ ; sapor aromaticus, amaricans, acris, pungens.

VIRT. Stimulans ; cardiaca.

USUS. Typhus ; intermittentes ; sphacelus ; chlorosis ; amenorrhæa retentionis ; morsura serpentum. *Forma gargarismatis :* cynanche atonica.

dos. *Pulveris*: gran. x-xxx; pro infuso  
drach. semis-ij ad ℥j. aquæ vel vini.

ARISTOLOCHIA TRILOBATA. Stipites.  
CL. & O. *præced.* *Fruticosa; Suri-*  
*nam, Jamaic.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac *præced.*

ARNICA MONTANA. Flores (*sine calice*);  
herba; radix.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.* *Perennis, alpina;*  
*in prætis montium,*

N. B. Foliis ovatis, integris, nervosis.  
OF. *Arnica. c. Arnique. n. Tobacco de*  
*montaña, arnica.*

QUAL. Heroica: odor virosus; sapor acris,  
aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans; diuretica; menagoga;  
errhina; antiseptica, resolvens.

usus *infusi florum*: asthenia; arthrodynia  
rheumatica; contusura; amaurosis; pa-  
ralysis; epilepsia; amenorrhæa; ischu-  
ria paralytica.

*Radicis forma pulveris*: diarrhæa, dy-  
senteria; quartana; gangræna; syno-  
chus. *Externus*: ulcus malignum; spha-  
celus.

dos. *Infusi florum* in sacculo suspenso-  
rum: drach. j-ij-iv. ad ℥j. aquæ. *Ra-*  
*dicis. pulv.* gran. v-x.

N. B. Cave ne flores substituantur aut  
misceantur floribus inulæ dysenteri-  
cæ, hypochæridis radicatæ aut ma-

culatæ ; anthemis tinctoriæ , aliisve floribus flosculosis.

ARTEMISIA ABROTANUM. Herba ;  
summitates.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.* *Perennis ; suffructic.*

OF. *Abrotanum hortense.* G. *Aurone mâle ; citronelle aurone.* H. *Yerba lombriguera , abrotano macho.*

QUAL. Præstans : odor nidorosus ; sapor aromaticus , amaricans.

VIRT. Stimulans ; stomachica ; menagoga ; anthelminthica.

usus. Dyspepsia ; amenorrhæa ; lumbrici. *Externus* forma balnei , fotsus , decocti vel infusi.

dos. Unc. j. ad fßj. aquæ.

ARTEMISIA ABSINTHIUM. Herba ;  
summitates.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Absinthium vulgare.* G. *Absinthe.*  
H. *Axenjo.*

QUAL. Præstans : in oleo volatili et extractivo amaro residens ; odor nidorosus ; sapor intense et pure amarus.

VIRT. Stomachica ; anthelminthica ; antiseptica ; resolvens.

usus. Dyspepsia ; intermittentes ; leucophlegmatia ; amenorrhæa : icterus , tinea ; achor ; gangræna ; vermes. *Externus* forma fotsus , cataplasmatidis.

PRÆP. Infusum aquosum et vinosum; tinctura; extractum; oleum volatile; conserva.

DOS. *Extracti*: drach. semis. *Conservæ* unc. j.

## ARTEMISIA CAMPESTRIS.

*Perennis; alpina.*

QUAL. et VIRT. Abrotani.

## ARTEMISIA DRACUNCULUS. Herba recens.

CL. & O. *præced.*

*Perennis.*

OF. *Dracunculus*. G. *Estragon*. H. *Estragon*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac *præced.*

## ARTEMISIA GLACIALIS.

CL. & O. *præced.*

*Perennis.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac *præced.*

## ARTEMISIA MARITIMA. Herba; summitates.

OF. *Absinthium maritimum*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac *absinthii*.

## ARTEMISIA PONTICA. Herba; summitates.

OF. *Absinthium pontificum* S. *Romanum*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac *absinthii*, sed debilior.

## ARTEMISIA RUPESTRIS. Herba.

OF. & O. *præced.**Perennis ; Alpina ;  
Siberica , Zelandica.*OF. *Genipi albi herba.*

QUAL. Odor grate aromaticus.

VIRT.

USUS. Febres intermittentes ; amenorrhæa.

ARTEMISIA SANTONICA. Summitates  
ramulorum cum semine.CL. & O. *præced.**Perennis.*OF. *Semen cinæ s. contra s. Santonici s.  
zedoariæ. g. Barbotine ; santoline ;  
poudre à vers. n. Santonico , semilla  
de Alexandria.*QUAL. Præstans : in oleo volatili residens ;  
odor nidorosus ; sapor acris , amarus.

VIRT. Anthelmintica ; stomachica.

USUS. Vermes ; anorexia.

DOS. Pro infantibus gran. x. drach. j. in  
pulvere vel electuario ; drach. ij-iii. in  
infuso lactis.ARTEMISIA VULGARIS. Herba ; sum-  
mitates.CL. & O. *præced.**Perennis.*OF. *Artemisia rubra et alba. g. Armoise  
ordinaire ; herbe de St. Jean. n. Ar-  
temisa o yerba de S. Juan.*QUAL. Præstans : odor aromaticus ; sapor  
amaricans.

VIRT. Stimulans ; stomachica ; menagoga.



USUS. Tertianæ.

PRÆP. Moxa.

ARUM MACULATUM. Radix recens.

Variet. : A. Arum non maculatum.

B. Ar. maculatum.

CL. *Cynand. O. Polyand.* *Perennis; in locis umbrosis, nemorosis.*

OF. *Arum. G. Gouet; pied de veau. H. Aro, zumillo.*

QUAL. *Recentis.* Præstans : in principio acri, volatili residens; sapor urens. *Siccatae* : farinacea; subacris.

VIRT. Stimulans; sudorifica; expectorans; cosmetica. *Rec.* Corrodens; vesicans.

USUS. Dyspepsia; cephalæa; intermittentes; asthma pituitosum; cachexiæ; arthrodynia rheumatica.

DOS. Pulveris gran. x-xx-xxx.

ARUNDO PIRAGMITIS.

CL. *Triand. O. Digyn.*

G. *Roseau à Balais. H. Carrizo.*

QUAL.

VIRT. Antisyphilitica.

USUS. Syphilis.

PRÆP. Decoctum ℥j-ij ad fl. ij aquæ coquendo ad colat. ℔j.

ASARUM EUROPÆUM. Fibræ radicis; folia.

CL. *Dodecan. O. Monog.*

*Perennis; in locis umbrosis, nemorosis, montanis.*

OF. *Asarum*. G. *Asaret*; *cabaret*. H. *Asaro*.

QUAL. Heroïca: in principio acri, volatili residens; odor fragrans; sapor acris, nauseosus, amaricans.

VIRT. Emetica; cathartica; errhina; diuretica; sudorifica; menagoga.

USUS *decocti*. Hydrops; intermittentes. *Extern.* pulv. naribus attracti: cephalæa.

DOS. Pulveris: gran. x-xx-xxx; scopo errhino gran. iij-iv. cum saccharo; pro decocto drach. ij ad fßj aquæ, cujus unc. j. omni bihorio vel trihorio sumenda.

PRÆP. Extractum: dosis gr. xx.

### ASCLEPIAS ASTHMATICA. Radix

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Fruticos. Zeylan.*

QUAL. Sapor dulci-acris, subnauseosus; odor vincetoxici.

VIRT. Subemetica; cathartica; expectorans.

USUS. Tussis; asthma pituitosum.

PRÆP. Decoctum; syrupus.

### ASCLEPIAS VINCETOXICUM. Radix.

CL. & O. *præced.*

*Perennis; in locis nemorosis.*

OF. *Vincetoxicum*. s. *hirundinaria*. G. *Asclepiade*; *dompte-venin*. H. *Vence-tósigo*.

QUAL. Lactescens; subvenenata; odor penetrans; sapor amaricans, acris, aromaticus.

VIRT. Stimulans ; diuretica ; menagoga.

USUS. Hydrops.

ASPARAGUS OFFICINALIS. Radix.

CL. *Hexand. O. Monog.* *Perennis ; hortensis.*

G. *Asperge.* H. *Esparraguera*, *Espàr-ragos.*

QUAL. Inodora ; subdulcis ; urinam odore foetido imbuens , qui acido instillato corrigitur.

VIRT. *Recentis* : diuretica.

USUS.

ASPERULA ODORATA. Herba.

CL. *Tetrand. O. Monog.* *Perennis , in silvis umbrosis.*

OF. *Aspergula matrisilva.* s. *hepatica stellata.* G. *Aspergule.*

QUAL. *Siccatae* : odor fragrans quem infuso communicat.

VIRT. Diuretica.

USUS. Infusi aquosi vel vinosi.

ASPHODELUS RAMOSUS. Radix.

CL. *Tetrand. O. Monog.* *Perennis ; Europ. austr.*

OF. *Asphodelus.* G. *Asphodèle.*

QUAL. *Recentis* : acris. *Siccatae* : mucilaginosa.

VIRT.

USUS.

N. B. In Hispania utitur Asphodelus fistulosus , vulgo *Gamon* , in herpetibus.

## ASPLENIUM CETERACH.

CL. *Cryptog. O. Filic.* *Perennis; Europæ.*OF. *Ceterach herba. G. Ceterach. Doradille. H. Doradilla.*

QUAL. Sapor subausterus, mucilaginosus.

VIRT.

USUS. Cachexiæ.

## ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*OF. *Scolopendrium s. lingua cervina. G. Scolopendre. H. Lengua de ciervo.*

QUAL. Substyptica.

VIRT. Subastringens.

USUS. Cachexiæ.

## ASPLENIUM RUTA MURARIA. Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*OF. *Ruta muraria. G. Sauve-vie. H. Ruta muraria, o de muros.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

## ASPLENIUM TRICHOMANOIDES. Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*OF. *Trichomanes. s. dianthus ruber. G. Capillaire polytric. H. Tricomanes.*

QUAL.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

## ASTRAGALUS EXSCAPUS.

Radix.

CL. *Diadelph. O. Decand.**Perennis;  
Hungariæ.*G. *Astragale à gausses velues.*

QUAL.

VIRT. Antisyphilitica.

USUS *decocti* : Syphilis.DOS. *Radicis siccatae concissæ* : unc. i-ij  
ad ℥ iij aquæ coquendo ad colat. ℥ ij  
quotidie sumend.

## ASTRAGALUS TRAGACANTHA. Gum.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa ; orientalis  
et Europ. austr.*N. B. *Tragacantha Cretica.* (Tournefort.)OF. *Gummi tragacanthæ.* G. *Gomme adraganthe.* H. *Goma tragacanta.*

QUAL. Mucilaginosæ.

VIRT. Involvens; obtundens.

USUS. Tussis; raucedo; stranguria.

## ASTRAGALUS GUMMIFER (LABILLARDIERE).

*Mons Libanon.*

N. B. Maximam partem gummi tragacanthæ vulgo venalis suppeditat.

## ATHAMANTA CRETENSIS. Semen.

CL. *Pentand. O. Digyn.**Perennis ; Candie , alpina.*OF. *Semen dauci cretici.* G. *Daucus d' Crète.* H. *Dauco cretica.*

QUAL. Acris; aromatica.

VIRT. Carminativa: diuretica; menagoga.

USUS. Flatulentia; tussis stomachica.

ATHAMANTA OREOSELINUM. Herba;

semen; radix.

CL. & O. *præced.*

*Perennis; in locis  
montanis, siccis.*

OF. *Oreoselinum*. G. *Persil de montagne*.

QUAL. Aromatica.

VIRT. Diaforetica, diuretica, discutiens.

USUS. Calculus urinarius.

ATROPA BELLADONA. Folia; radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.*

*Perennis; pas-  
sim hortensis.*

OF. *Belladonna* s. *solanum lethale* s. *Sol.*

*furiosum*. G. *Belladone*. H. *Belladonna*.

QUAL. Heroica: venenata; in principio narcotico residens; odor virosus; sapor acris, substypticus.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; resolvens.

USUS *cautus*: Mania; melancholia; epilepsia; pertussis; hydrophobia; Icterus inveteratus; hydrops. *Externus*. Scirrhus; cancer; fistula; arthrodynia rheumatica; ulcus malignum.

DOS. *Pulveris folior. aut rad. sicc.*

gran. j. gradatim ascendendo ad gran. vj.

de die in adultis; infantibus gran.  $\frac{1}{8}$  gran.

$\frac{2}{4}$  ad gran. ij-iii.

N. B. MOENCH ad preveniendam aut ad curandam hydrophobiam dat *radicem* omni secundo die in aqua calida, vel

*cerevisia* adultis gran. x-xv; infantibus sex annorum gran. v: quatuor annorum gran. iij. — *Folia siccata*: adultis gran. xii-xvj. et post 48 horas gran. x-xiiij. — Eadem pro infuso aquoso, scrup. j. ad unc. x. aquæ fervidæ, hujusque unc. ij adultis dantur primis diebus, dein quotidie augendo dosin, donec siccitas et tensio faucium aut vertigo appareant. *Externus*: forma pulveris, vel cataplasmatidis.

PRÆP. Succus foliorum inspissatus, vulgo *extractum*.

### ATROPA MANDRAGORA. Radix.

CL. & O. *præced.* Perennis; Europ. austr.

OF. *Radix mandragoræ.* G. *Mandragore.*  
H. *Mandragora.*

QUAL. Venenata: in principio narcotico residens. *Cortex radicis*: acris.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; *corticis radic.* cathartica; menagoga.

USUS. *Pulv. radicis externus* forma *cataplasmatidis*: Scirrhus; scrophula; tumor testiculi. *Internus*: epilepsia?

### AVENA SATIVA. Semen excortica- tum; farina.

CL. *Triand.* O. *Digyn.* *AVENA.*

OF. *Avena.* G. *Gruau d'avoine.* H. *Avena.*

QUAL. Insipida; farinacea.

VIRT. Demulcens; emolliens; nutriens.

USUS. Forma decocti, cataplasmatidis.

Tom. I.



AVICENNIA TOMENTOSA. Nucleus; suc-  
cus putaminis.

CL. *Didyn. O. Angiosp.*, *Arborea; utrius-  
que Indiæ.*

OF. *Anacardium orientale. G. Pomme ou  
Noix d'acajou. H. Anacardios.*

QUAL. *Nuclei: dulcis; oleosa. Putaminis:  
acerrima.*

VIRT. *Nuclei: nutriens. Putaminis: cor-  
rodens; caustica.*

USUS succi: cum calce mixtus characteres  
pannis gossypinis et linteis indelebiles  
imprimit. *Putaminis: Morosis; obliuio?*

## B

BALSAMEA MECCANENSIS

(GLEDITSCH).

Balsamum.

CL. *Octand. O. Monog.*

*Arbor; Arabia  
yemen, Mecca.*

CARACT. *Cal. 5-partitus. cor. 5-petal. æqua-  
lis, rubra. stamin. 10. longa calici in-  
serta. pistil. 1. superum. styl. 1. stigm.  
obtus. fol. bipinnata: foliolis lanceolatis.*

*Amyris gileadensis seu opobalsamum LINN.  
NOMEN NATALE. Balessan.*

OF. *Balsamum de mecca; opobalsamum  
verum; balsamum gileadense. G. Beau-  
me de Mecca. H. Balsamo de la Mecc  
ó Gileadense.*

OPOBALSAMUM viridescens; incisione ramu-  
lorum.

CARPOBALSAMUM expressione fructus maturi.  
 XYLOBALSAMUM rubescens, expressione et  
 decoctione ramulorum obtinetur. (BRUCE.)

QUAL. Præstans: tenaci-liquida; odor fragrans; gratus; sapor acris, amaricans.

VIRT. Stimulans; diuretica; cosmetica.

USUS. Blennorrhœa; tabes; morbi pituitosi; maculæ cutis.

DOS. gutt. xv-xxx-L. cum saccharo, vitello ovi, aut haustu aquæ.

BANKSIA ABYSSINICA (BRUCE.) Flores.

CL. *Tetrand. O. Monog.* *Arborea; Abyssin.*

NOMEN NATALE: CUSO.

QUAL.

VIRT. Anthelminthica.

USUS *infusi*: ascarides.

DOS. Manip. j. florum ad ℥ iv. cerevisiæ per 12 horas digerendo.

BELLIS PERENNIS. Flores; herba.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.* *In pratis*

OF. *Bellis minor. G. Marguerite. H. Margaritas.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Tabes.

BERBERIS VULGARIS. Baccarum recentium succus; cortex.

CL. *Hexand. O. Monog.* *Fruticosa*

OF. *Berberis. G. Epine-vinette; vinetier.*

H. *Agracejo.*

QUAL. *Baccarum* : sapor intense acidus.

*Corticis* : flava ; sapor amarus.

VIRT. Refrigerans ; antiseptica. *Cort.* tinctoria.

USUS. Febres acutæ ; cholera. *Cort.* icterus ; leucorrhœa.

PRÆP. Succus ; syrupus ; conditum baccarum.

### BETA CICLA

Succus radicis.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Hortensis.*

OF. *Beta alba.* G. *Poirée.* H. *Acelga.*

QUAL. Sapor aquosus , dulcis.

VIRT. Errhina. Laxativa.

USUS.

### BETA VULGARIS.

Radicis succus.

CL. & O. *præced.* *Hortensis.*

OF. *Beta rubra.* H. *Acelga.*

QUAL et VIRT. Eadem ac *præced.*

### BETONICA OFFICINALIS. Herba et flores ; radix.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis.*

OF. *Betonica.* G. *Betoine.* H. *Betónica.*

QUAL. Odor nidorosus , halituosus. *Radic.* nauseosa.

VIRT. Nervina. Errhina. *Radic.* emetica.

USUS.

### BETULA ALBA. Folia tenerrima ; epidermis ; lymphæ.

CL. *Monœc.* O. *Tetrand.* *Arborea ; Europæa*

OF. *Betula*. G. *Le bouleau ordinaire*. H.  
*Abedul*.

QUAL. *Olei*; suaveolens.

VIRT.

USUS *foliorum*: Erysipelas. *Succi saccharini* (vulgo *lymp̄ha dicti*) terebro ex arbore primo vere obtenti: Morbi cutis; scorbutus; lumbrici.

PRÆP. *Oleum epidermidis nigrum*.

BIGNONIA OPHTHALMICA. Radix; succus expressus.

CL. *Didyn*. O. *Gymnosp*.

*Frutic. Amer.  
meridion.*

G. *Bignones*.

QUAL.

VIRT.

USUS *succi expressi vel decocti*: ophthalmia membranarum.

DOSIS guttula una succi vel guttula una alterave decocti oculo instillatur omni mane. (CHISHOLM).

BIXA ORELLANA. Radix et fæcula ex capsulis seminum arte obtenta.

CL. *Polyg*. O. *Monog*.

*Arborea; Indiæ  
occident.*

OF. *Terra orellana*. s. *orleana*. G. *Roucou*. H. *Achiote*.

QUAL. *Fæculæ*: rubra; odor mucidus; sapor subamaro stypticus.

VIRT. *Radicis*: diuretica.

USUS *radicis et fæculæ*; tinctorius. Pig-

mentum corpori illitum contra morsus  
culicum munit.

**BOLETUS IGNIARIUS.** Quercui, tiliæ  
aut fago putrescentibus insidens.

CL. *Cryptog.* O. *Fungi.*

OF. *Agaricus quernus.* s. *agaricus chi-*  
*rurgorum*, s. *fungus quercinus.* G. *Agar-*  
*ric de chêne.* H. *Agarico-yesca* o *yesc-*  
*ca de seta.*

QUAL.

VIRT. Mechanice sanguinem sistens.

USUS *externus*, ablato ab utraque parte  
tegmine contusus: Hæmorrhagiæ.

**BOLETUS LARICINUS.** Larici insidens.

OF. *Agaricus albus optimus.* G. *Agaric.*  
H. *Agarico blanco.*

QUAL. In principio resinoso acri residens;  
sapor nauseosus, amaricans.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica.

USUS *intern.* hirudo deglutita; sudor phthy-  
sicorum. *Extern.* hæmorrhagiæ. *Pulv.*  
*inspersi*: ulcera.

DOS. Gran. ij.

**BOLETUS SUAVEOLENS.** Salici insidens.

OF. *Fungus salicis*, seu *fungus albus sa-*  
*lignus.*

QUAL. Odor suaveolens.

VIRT.

USUS. Mucilagine humectatus, leniter sic-  
catus et cum alcoholis pauxillo in pul-

verem tritus : Tabes pulmonalis : asthma  
spasmodicum.

DOS. Pulveris drach. ℥-ij. bis de die cum  
saccharo.

**BORAGO OFFICINALIS.** Herba et flores.

CL. *Pentand.* O. *Monog.*

*Annua.*

G. *Bourrache.* H. *Borraja.*

QUAL. Oleracea.

VIRT.

USUS.

**BRASSICA ERUCA.** Semen ; folia.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliquos.*

*Annua ;  
montana.*

OF. *Erucæ semen.* G. *Roquette des jar-*  
*dins ou annuelle.* H. *Oruga.*

QUAL. In acri volatili residens ; sapor acris,  
fervidus , penetrans , fere ut sinapis.

VIRT. *Veteribus* aphrodisiaca.

USUS. Paralysis linguæ.

**BRASSICA OLERACEA.** Folia.

CL. & O. *præced.*

*Hortensis.*

OF. *Brassica capitata alba et rubra ;*  
*aliæque varietates.* G. *Choux.* H. *Berza.*

QUAL. Aquosa ; inodora.

VIRT.

USUS. Cocta , vel muriate sodæ condita,  
germanis sub nomine *Sauerkraut* : scor-  
butus. *Forma cataplasmatidis* mammis  
puerperarum applicata ad coagulum lac-  
tis impediendum. *Decocti* : Raucedo ;  
tussis ; scorbutus ; combustura.

BRASSICA RAPA.

Radix recens.

CL. & O. *præced.**Biennis; hortensis.*OF. *Rapa.* H. *Raba.*QUAL. *Succi*: in principio saccharino et mucilaginoso residens.

VIRT. Flatulenta: diuretica.

USUS *succi expressi*: Tabes; asthma; stranguria. *Radici recentis forma cataplasmatidis*: Pernio, podagra? *Succi*: Otagia; aphtha.

PRÆP. Syrupus frigide è succo paratus.

BROMELIA ANANAS.

Bacca (*vulgo**fructus*); cortex exterior recens.CL. *Hexand.* O. *Monog.**Perennis; Americ. merid.*OF. *Ananas fructus.* H. *Ananas.*

QUAL. Odor ambrosiacus; sapor gratissime acidodulcis, subacris.

VIRT. Analeptica. *Cortic*: menagoga.

USUS.

PRÆP. Liqueur *Italica* NAJANA dictus.

BRUCEA FERRUGINEA.

Cortex.

(HERITIER).

Brucea antidysenterica. *Abyssin.* (MILLER).

N. B. An cortex angusturæ officinarum?

NOMEN NATALE *Wooginoos.* H. *Angostura.*

QUAL.

VIRT. Antidysenterica. (BRUCE.)

USUS. Dysenteria.



dos. Pulveris ʒʒ mane et vesper. in haustu lactis recenter mulsi, abstinendo ab omni potu post usum ejus. (BRUCE.)

BRYONIA ALBA.

———— DIOICA.

} Radix recens; succus radicis inspissatus.

CL. *Monœc.* O. *Syngen.*

*Perennis; in sepibus.*

OF. *Bryonia.* G. *Brione; couleuvrée.* H. *Nueza.*

QUAL. Præstans: in principio acri, volatili residens; sapor acris, intense amarus; odor nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; anthelminthica; menagoga. *Externus:* Rubefaciens; resolvens.

usus forma pulveris vel infusi: Hydrops, asthma; mania; epilepsia; arthrodynia rheumatica. *Externus radicis contusæ* forma cataplasomatis: OEdema; lupia; ecchymoma.

dos. *Pulv. radicis siccatae:* drach. ʒʒ. *Succi inspissati:* drach. ij-ʒʒ.

PRÆP. Syrupus ex succo recenti paratus; succus inspissatus, vulgo *extractum.*

BUBON GALBANUM. Succus gummi-resinosus incisione obtentus, inspissatus.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

*Perennis; Afric.*

OF. *Gumi galbanum.* H. *Galbano.*

QUAL. In oleo volatili residens: sapor amaro-acris; odor alliaceus, penetrans.

**VIRT.** Stimulans ; antispasmodica ; menagoga expectorans ; resolvens.

**USUS.** Hysteria ; asthma ; amenorrhæa ; asthenia. *Externus* scopo resolvendi aut maturandi : Tumores ?

**DOS.** Gran. xx-3j forma emulsionis vel pilularum.

**PRÆP.** Emplastrum.

**BUBON MACEDONICUM.** Semen ; herba.

**CL. & O.** *præced.*

*Biennis.*

**OF.** *Petroselinum Macedonicum.* *G. Persil de Macedoine.* *H. Peregil de Macedonia.*

**QUAL.** Sapor aromaticus , dulcescens.

**VIRT.** Carminativa ; diuretica ; menagoga.

**USUS.** Syphilis ?

**BUPLEURUM ROTUNDIFOLIUM.** Herba ; semen.

**CL.** *Pentand.* **O.** *Digyn.*

*Annua.*

**OF.** *Perfoliata.*

**QUAL.** Subaromatica.

**VIRT.**

**USUS.**

**BURSERA GUMMIFERA.**

**CL.** *Hexand.* **O.** *Monog.*

**G.** *Gomart.*

*N. B.* Quidam ex hac planta quassiam sinarubam derivant , cujus corticem virtute æmulat.

**BUXUS SEMPERVIRENS.** Lignum; folia.  
 CL. *Monœc.* O. *Tetrand.*

G. *Buis.* H. *Box.*

QUAL. Odor teter, foetidus; sapor amarus.

VIRT. Sudorifica; alterans; *folior*; cathartica.

USUS *decocti*: Epilepsia, syphilis? *Olei*:  
 Hirsuties?

## C.

**CACHRIS ODONTALGICA.** Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

G. *Amarinte.*

QUAL. Sapor acris, urens.

VIRT. Sialogoga.

USUS loco *anthemis pyrethri*: Odontalgia  
 rheumatica.

**CACTUS OPUNTIA.** Folia.

CL. *Icosand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Europ. austr.*

OF. *Opuntia folia.* H. *Cacto.*

QUAL. Mucilaginosa.

USUS *externus* foliorum calore molitorum  
 et medio dissectorum forma cataplas-  
 matis: Dolores; dysenteria; arthro-  
 dynia.

**CÆSALPINIA CRISTA** } Lignum.  
 ————— SAPPAN.

OF. *Lignum Brasiliense.*

**CALAMUS ROTANG.** Resina fructum  
 tegens.

CL. *Hexand.* O. *monog.* *Fruticosa; Indica.*

OF. *Sanguis draconis*. c. *Sang. dragon*.

H. *Sangre de Drago*.

N. B. Vide etiam *dracæna draco*, et *pterocarpus draco*, ex quibus promiscue desumitur *resina draconis*.

CALENDULA OFFICINALIS. Folia et flores.

CL. *Syng. O. Polyg. necess.*

*Annua, Europ. austral.*

VAR. A. *Flore simplici*. B. *Flore pleno*.

OF. *Calendula*. c. *Souci*.

QUAL. Flava; sapor amaricans.

VIRT.

USUS.

CAMBOGIA GUTTA. Succus gummi-resinosus incisione ramulorum obtentus, inspissatus. *Arborea; Indica.*

CL. *Polyand. O. Monog.*

OF. *Gambogia*; *gummi gutta*; *gutta gambha*. c. *Camboge*; *gomme-gutte*.

QUAL. Heroica: lutea; opaca; in principio resinogummoso residens; insipida; inodora.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; subemetica.

USUS. Hydrops; obstipatio; tœnia; ictus; quartana; cachexiæ; morbi cutis.

DOS. Gran. iij-iv. pulveris cum saccharo triti omni trihorio in hydropo. In tœnia gr. x-xx. in obstipatione gr. j-ij.

PRÆP. Tinctura dos. ʒj-ij.

N. B. Antidotum ejus est alcali.

# CAMPHOROSMA MONSPELIENSIS.

Herba.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.*

*Annua; Eu-  
rop. austr.*

OF. *Camphorata* G. *Camphrée.* H. *Alcanforada.*

QUAL. Subaromatica.

VIRT. Nervina; sudorifica; resolvens.

USUS. Hysteria; leucorrhœa; asthma; arthrodynia rheumatica; coryza.

# CANELLA ALBA. Cortex interior arboris.

CL. *Dodec.* O. *Monog.*

*Albæ; Ind. occid.*

*Wintera canella* (PALLAS).

OF. *Canella alba.* H. *Canela blanca.*

QUAL. Aromatica; sapor leviter acris, amaricans.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Dyspepsia.

DOS. Drach. ʒj-ij in infuso: gran. xxx. in pulvere.

# CANNABIS SATIVA.

Semen.

CL. *Dicæc.* O. *Pentand.*

*Annuæ.*

OF. *Semina cannabis.* G. *Semences du chanvre.* H. *Cañamo.*

QUAL. Præstans: in principio oleoso et mucilaginoso residens; odor virosus.

VIRT. Involvens; sedativa.

USUS *infusi aut emulsionis*: Blennorrhagia; stranguria; tussis catarrhalis.

DOSIS : unc. ſſ-j. ad aquæ ſſ iv in infuso.  
PRÆP. Oleum fixum.

CAPPARIS SPINOSA. Cortex radicis.

CL. *Polyand. O. Monog.*

*Fruticosa;  
Europ. austr.*

OF. *Capparis. G. Capres. H. Alcaparras.*

QUAL. Sapor amaricans, substypticus.

VIRT. Adstringens; diuretica.

USUS. Obstipatio; physconia abdominalis;  
paralysis.

PRÆP. Oleum fixum.

CAPSICUM ANNUUM.

Fructus.

CL. *Pentand. O. Monog.*

*Annua.*

OF. *Piper. Indicum, Hispanicum, Tur-*  
*cicum. G. Capsique; poivre d'Inde.*  
*H. Pimientos.*

QUAL. Eximia: in principio resinoso resi-  
dens; sapor acris, urens.

VIRT. Stimulans; stomachica; rubefaciens.

USUS. Dyspepsia; cardialgia arthritica; co-  
ryza; intermittentes.

CAPSICUM BACCATUM.

Fructus.

H. *Pimientillos.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

CARDAMINE PRATENSIS. Petala (*vulgo*  
flores) et folia.

CL. *Tetrand. O. Siliquos.*

*Perennis.*

OF. *Flores cardamine; nasturtium pra-*  
*tense. G. Cresson élégant; cresson des*  
*prés; passeraige sauvage.*

QUAL. In principio subacri residens.

VIRT. *Petalorum*: Antispasmodica. *Fo-*  
*lior.* Antiscorbutica.

USUS *petalorum* · Convulsio ; chorea.

DOS : pulv. *petalorum* scrup. j-drach. ß.

CARDUUS MARIANUS. Semen; herba.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.* *Annua.*

OF. *Carduus mariae.* H. *Cardo de Maria.*

QUAL. *Semin* : oleosa : *herbæ* : amara.

VIRT.

USUS Carcinoma.

CAREX ARENARIA.

Radix.

CL. *Monæc. O. triand.*

*Perennis ; in*  
*arenosis.*

OF. *Gramen rubrum.* G. *Laiche des sa-*  
*bles.*

QUAL. *Radicis recentis* : odor resinoso-  
terebinthinaceus ; subdulcis.

VIRT. Sudorifica ; diuretica.

USUS loco sarsaparillæ : Morbi cutis ; syphi-  
lis. (GLEDITSCH.)

CARICA PAPAYA.

Semen.

VIRT. Anthelminthica.

CARLINA ACAULIS.

Radix.

CL. *Syng. O. polyg. æqual.* *Perennis ; alpi 12.*

OF. *Carlina.* H. *Angelica carlina.*

QUAL. Præstans : odor graveolens , pene-  
trans ; sapor acris , amarus , aroma-  
ticus.

VIRT. Stimulans ; stomachica ; sudorifica.



USUS. Physconia abdominalis; morbi cutis;  
hysteria.

CARTHAMUS TINCTORIUS. Semen;  
flores.

CL. *Syng.* O. *polyg. æqual.*

*Perennis.  
alpina.*

G. *Carthame.* H. *Alazor.*

QUAL. Lutea; tinctoria; sapor nauseosus.

VIRT. Cathartica; diuretica.

USUS. Tussis senilis; asthina pituitosum;  
icterus.

CARUM CARVI. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

*Biennis.*

OF. *Semen carvi.* H. *Alcaravea.*

QUAL. Præstans: in oleo volatili residens;  
sapor aromaticus, acris, calefaciens.

VIRT. Stimulans; carminativa; lactifera;  
resolvens.

USUS. Colica; intermittentes.

DOSIS: pulv. ℥j-3j; in decocto ʒj ad  
aquæ ℥bj.

PRÆP. Tinctura; oleum volatile.

CARYOPHILLUS AROMATICUS. Flores  
cum pericarpio immaturo. (*Vulgo*  
*caryphylli.*)

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Arborea; Indica.*

OF. *Caryophylli aromatici.* G. *Giroffles.*  
H. *Clavos de especia.*

QUAL. In oleo volatili et principio acri-  
resinoso residens; odor gratus, fra-

grans, penetrans; sapor aromaticus, acris, urens.

VIRT. Stimulans; calefaciens; sialogoga; stomachica; menagoga.

USUS. Dyspepsia; paralysis linguæ; odontalgia;

DOSIS: ℥ss-3j in pulvere vel infuso aquoso vel vinoso.

PRÆP. Oleum volatile.

CASSIA ALATA.

Folia.

CL. *Decand. O. Monog.*

*Fruticosa; Ind. orient. et occident.*

QUAL. Sapor amarus, nauseosus.

VIRT. Cathartica.

USUS. Herpes.

CASSIA FISTULA. Fructus; pulpa fructus.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Egypt.; Ind. orient.*

OF. *Cassia fistula. s. Fistularis; pulpa cassiæ. G. Casse. H. Caña fistula.*

QUAL. Sapor acidulo-dulcis, mucilaginosus, subnauseosus.

VIRT. Cathartica.

USUS: Obstipatio.

DOSIS: unc. ℥-ij.

CASSIA SENNA.

Folia.

CL. & O. *præced.*

*Fruticosa; Afric.*

OF. *Folia sennæ. G. Sené. H. Sen.*

QUAL. Odor nauseosus; sapor subacris, amaricans.

VIRT. Cathartica.

Tom. I.

QUAL. Dulcis ; mucilaginoso.

VIRT. Demulcens ; expectorans.

USUS *decocti* : Raucedo ; tussis ab acri ; catarrhus.

CHAEROPHYLLUM SILVESTRE. Herba.

CL. *Pentand.* O. *digyn.*

OF. *Herba cicutaria.* G. *Persil d'âne.*

H. *Cicutaria.*

QUAL. Odor subfoetidus ; sapor amaricans.

VIRT.

USUS : Physconia abdominal.

CHEIRANTHUS CHEIRI. Flores.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliqu.* *Europ. austr. ; hortensis.*

OF. *Flores cheiri, viola lutea ; leucoium luteum.* G. *Giroflée, violier jaune.*

H. *Aleli.*

QUAL. Lutea ; odor fragrans ; in principio volatili residens.

VIRT. Nervina ; narcotica.

USUS : Dolores. Amenorrhæa ; icterus ; physconia abdominalis.

CHELIDONIUM MAJUS. Radix ; herba

*recens.*

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Perennis,*

OF. *Chelidonium.* G. *Chélidoine éclair.*

H. *Celidonia.*

QUAL. Præstans : in principio acri volatili residens ; odor nauseosus ; sapor amarus, acris ; succus luteus.

VIRT. *Radicis recentis* : Diuretica ; resolvens.

*usus internus decocti* : Cachexiæ ; tabes ;  
 icterus ; hydrops ; morbi cutanei.  
*usus Succi externus* : Verruca ; herpes ;  
 ulcus phagedænicum ; pterygium.

## CHENOPODIUM AMBROSIOIDES. Her- ba ; semen.

CL. *Pentand. O. Digyn.*

*Mexicana.*

OF. *Botrys Mexicana seu chenopodium  
 Mexicanum. G. Patte d'oye , thé du  
 Mexique. H. Té de España.*

QUAL. Eximia : odor fragrans ; sapor acris,  
 aromaticus.

VIRT. Nervina ; stimulans. *Seminum* : an-  
 thelmintica ; carminativa.

USUS : Paralysis ; asthenia nervosa ; dyspep-  
 sia ; flatulentia ; vermes.

PRÆP. Tinctura ; infusum.

## CHENOPODIUM ANTHELMINTHICUM. Semen.

CL. & O. *præced.*

*Perennis ; Penansylv.*

G. *Anserine vermifuge.*

QUAL. Præstans : odor graveolenti-fragrans ;  
 sapor aromaticus.

VIRT. Anthelmintica.

USUS : Lumbrici.

## CHENOPODIUM BONUS HENRICUS.

*Herba.*

OF. *Herba boni Henrici. G. Bon-Henri.*

H. *Buen Henrique.*

QUAL. Oleracea ; fatua.

CINCHONA ANGUSTIFOLIA. (SWARZ).  
Cortex.

CL. *Pent. O. Monog.* *Arbuscula ; insule Doming.*

QUAL. Sapor intense amarus, subdulcis, subaromaticus.

VIRT. Roborans ; stomachica.

USUS : Febres intermittentes et remittentes ; dyspepsia ; asthenia.

CINCHONA CARYBÆA. Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea ; Ind. occident.*

OF. *China carybea ; cortex St. Lucæ ; cinchona Jamaicensis.*

QUAL. Sapor substypticus ; magis amarus, sed minus aromaticus quam cinchonæ officinalis.

VIRT. Roborans ; adstringens ; stomachica.

USUS : Febres remittentes ; intermittentes ; typhus.

CINCHONA CORYMBIFERA. (FORSTER)  
Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea ; Ind. occident.*

*Nota.* Idem ac *Cortex de St. Fe* esse videtur.

QUAL. Sapor intense amarus, substypticus.

VIRT. Stomachica ; subastringens.

USUS idem ac *præced.*

CINCHONA FLORIBUNDA. (SWARZ).  
Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea ; Ind. occident.*

OF. *Chinchina Sanctæ Luciae.*

QUAL. Sapor amarus, stypticus.

VIRT. et usus præced.

CINCHONA MONTANA. (BADIER) Cortex.

CL. & O. præced.

*Arbor insule Martinique  
et Guadeloupe.*

OF. *China-piton.*

QUAL. Sapor intense amarus, stypticus.

VIRT. Emetica; cathartica.

usus.

CINCHONA OFFICINALIS.

Cortex.

CL. & O. præced.

*Arborea; Peruviana,  
montana.*

OF. *Cortex peruvianus; chinchina; cortex chinæ. G. Quinquina. H. Quina; cascarilla de loxa.*

QUAL. Heroica: in principio adstringente resinoso et amaro mixto residens; sapor tenacissime amarus, substypticus.

VIRT. Antiseptica; roborans; adstringens; stomachica.

usus. Febres atonicæ, putridæ, intermittentes, remittentes; asthenia; ataxia; spasmi; pertussis; tabes pituitosa; diarrhoea; scrophula; gangræna; sphacelus; ulcera phagedænica; arthrodynia à debilitate. *Internus & externus*: forma pulveris; extracti; electuarii; infusi in aqua calcis, alcohole, vino, aqua; decocti; tincturæ; fots, cataplasmatibus; enematis: *Pulv. externus* frictione cum

saliva ventri adplicatus in junioribus,  
omni bihorio vel trihorio tempore re-  
missionis vel intermissionis.

DOSIS *pulveris*: gran. xv-drach. ℥-j. *Ex-  
tracti*: drach. ℥-℥ij. In infuso vel de-  
cocto unc. j ad ℥j aquæ.

## CINCHONA TECAMEZ.

Cortex.

*Arborea; Amer. merid.*OF. *Cortex Tecamez*.

QUAL. *Cort. pulv.* Lutescens; odor aro-  
maticus; sapor aromaticus, amarus.

VIRT. Aphrodisiaca?

USUS *decocti vel infusi*: Asthenia ex go-  
norrhoea vera.

## CINERARIA SIBIRICA.

Radix recens.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Anaphrodisia ex ebrietate (PALLAS).

## CISSAMPELOS CAAPEBA.

QUAL. Mucilaginoso.

USUS. Dysuria; stranguria; morsura ser-  
pentum.

## CISSAMPELOS PAREIRA.

Radix.

CL. *Diœc. O. Monadelph.**Perennis; Amer.  
ric. merid.*

OF. *Pareira brava. c. Pareira brava*  
*blanche. n. Butua.*

QUAL. Eximia: Sapor amaro-dulcis.

VIRT. Diuretica; alterans.



usus infusi: Dysuria; calculus urinarius;  
icterus; arthritis; morbi pituitosi.  
dosis: ℥j ad ℥ij aquæ ad colat. ℥j.

**CISTUS CRETICUS.** Succus resinosus ex  
foliis exsudans.

Cistus Ladaniferus (Hort. Kew.).

CL. Polyand. O. Monog. Fruticosa; Eu-  
rop. austr.

OF. Ladanum; gummi-labdanum; cistus  
creticus. n. Ladano.

QUAL. Resina amara; grisea; fumo grato.

VIRT. Stimulans; aromatica.

usus externus ad emplastra; suffumigia.

**CITRUS AURANTIUM.** Fructus recens;  
cortex flavus fructus; folia; flores.

CL. Polyadelph. O. Icosand. A. b. n. p. a.  
Europ. austr.

N. B. Duæ varietates.

OF. Flavedo corticum aurantium: fo-  
lia; flores naphæ; fructus aurantii  
dulcis è amari; aurantia hispaniensa,  
curassavica. c. Oranges. n. Naranjas.

QUAL. Corticis florum et foliorum: odor  
fragrans, sapor aromatico-amarus. Suc-  
ci; Acidulo-dulcis, vel amaro-dulcis.

VIRT. Nervina; stimulans; stomachica.  
Succi: refrigerans.

usus corticis forma pulveris, infusi, tinc-  
turæ: Dyspepsia; intermittentes; me-  
norrhagia? Foliorum: Chorea; epilep-  
sia; convulsio; hysteria.

**POSIS pulveris corticis:** drach.  $\beta$ . *Foliorum:* drach.  $\beta$ -j ter quaterve de die.

**PRÆP.** Aqua destillata; oleum volatile florum vulgo *oleum Naphæ*; tinctura; conditum; syrupus corticis: oleum corticis volatile expressione paratum vulgo *oleum Bergamotte*.

**CITRUS MEDICA.** Fructus ejusque succus; cortex flavus fructus.

**Varietas:** *citrus limonia.* *Arborea; Europ. aust.*

**OF.** *Succus; flavedo limoniorum. s. Citri. g. Citronier; citrons. h. Limon.*

**QUAL.** *Fructus:* Sapor acidus. *Corticis:* Sapor amarus, aromaticus.

**VIRT.** *Succi:* Refrigerans; antiseptica. *Corticis:* Stimulans; stomachica.

**USUS:** *Succi:* Scorbutus; febres. *Corticis;* dyspepsia.

**PRÆP.** Succus; oleum volatile corticis destillatione obtentum; oleum volatile incisione et expressione corticis obtentum, vulgo oleum seu *essentia de Cedro*; confectio seu conditum corticis et carnis fructus; acidum citricum.

**CLEMATIS RECTA** Herba cum floribus.

**CL.** *Polyand. O. Polyg.*

*Perennis.*

**OF.** *Flammula Jovis. g. Clematite. h. Clematide recta.*

**QUAL.** In principio acri residens.

**VIRT.** Corrodens; vesicans; diuretica.

**USUS** *infusi vel extracti:* Exostosis syphilitica.

litica? *Pulveris externus*: Ulcera syphilitica, canerosa, phagedænica? *Infusi forma lotionis*: Psora rebellis.

*DOSIS herbæ cum floribus siccatae*: drach. ij-iiij ad ℥bj aquæ.

*PRÆP.* Extractum foliorum recent. g. j.-iiij.

## CLEMATIS VITALBA.

Folia.

*CL. & O. præced.* *Perennis; sarmentosa; Europ.*

*OF. Vitalbæ folia. c. Herbe aux gueux.*

*H. Yerba de pordioseros.*

*QUAL.* In principio acri residens; sapor acidus, subdulcis, stypticus.

*VIRT.* Adstringens; corrodens; diuretica.

*USUS infusi*: Hydrops. *Externus succi oleo excepti*: Psora.

**COCHLEARIA ARMORACIA.** Radix recens; ejusque succus expressus.

*CL. Tetrady. O. Siliquos.* *Perennis; horten-  
tensis, ad rivos et in locis humidis.*

*OF. Raphanus rusticanus; armoracia.*

*c. Cran; raifort. H. Rabano rusticano.*

*QUAL.* Eximia: in principio acri volatili residens.

*VIRT.* Emetica; diuretica; antiscorbutica; rubefaciens.

*USUS.* Cachexiæ; quartanæ; scorbutus; hydrops; asthma pituitosum; paralysis; arthrodynia rheumatica; paraphonia.

*DOSIS radice recentis rasæ*: ℥j-ij. *Succi expressi*: ʒ℥. in haustu vini.

PRÆP. Succus ; aqua destillata ; alcohol ;  
infusum aquosum et vinosum.

COCHLEARIA OFFICINALIS. Herba recens ; ejusque succus expressus.

CL. & O. præced.

Annua ; ad littora maris ;  
hortensis.

OF. *Cochlearia hortensis*. G. *Herbe aux cuillères*. H. *Coclearia*.

QUAL. *Herbæ recentis* : Eximia ; in principio acri volatili residens ; sapor acris.

VIRT. Diuretica ; antiscorbutica , alterans.

USUS *herbæ & succi* : Scorbutus ; cachexiæ.

PRÆP. Conserva ; succus ; aqua destillata ; alcohol ; syrupus.

DOSIS *succi* : unc. j-ij-iiij. Conservæ drach. j-ij.

COCOS BUTYRACEA. } Oleum fixum fructus.  
——— NUCIFERA. }

*Palmæ.*

OF. *Oleum palmæ*. G. *Cocotier*. H. *Coco*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac aliorum oleorum fixorum.

USUS. Fissura ; pernioles ; tumores ; nodi podagrici ; ventris tumor durus : Pro injectionibus anatomicis per se vel cum tertia aut quarta parte ceræ mixtum.

COFFEA ARABICA.

——— OCCIDENTALIS.

} Semina.

CL. *Pentand*. O. *Monog*.

*Arborea ; Arab. et Ind. occident.*

OF. *Coffeæ semina*. G. *Caféyer*. H. *Cafè*.

QUAL. *Semen ustulatorum*: Fragrans; aromatica.

VIRT. Excitans; nervina; calefaciens, carminativa.

USUS *decocti seminum crudorum*: Catarrhus; rheumata; amenorrhœa suppressionis; diarrhœa. *Infusi seminum ustulatorum*: Sopor; cardialgia; cephalalgia; obstipatio; Polysarcia. *Infusi saturati* Unc. j ad aquæ unc. iiij-iv haustus omni semi hora repetendus: asthma spasmodicum; (PRINGLE). *Pulveris* drach. vj cum unc. iiij aut iv aquæ coctæ ad dimidium; hocque cum anatica portione succi citri mixtum calide in intermittentibus die apyrexiaë jejuno stomacho ebibendum in lecto.

PRÆP. Semen ustulatum pro infuso.

COLCHICUM AUTUMNALE. Radix.

CL. *Hexandr*. O. *Trigyn*.

*Perennis; in pratis humidis.*

OF. *Colchicum*. G. *Colchique*; mort aux chiens. H. *Quita meriendas*.

QUAL. In principio acris residens; odor graveolens; sapor intense acris, nauseosus.

VIRT. Narcotica; drastico-cathartica; phthyrifica diuretica.

USUS. Hydrops.

PRÆP. Acetum; oxymel.

COLCHICUM ILLYRICUM. Radix.

(GRONOVII et FÆRSKAL).

OF. *Radix hermodactyli*. G. *Hermodactylus*. H. *Hermodatiles*.

QUAL. In principio acri volatili residens.

VIRT.

USUS.

COLLINSONIA CANADENSIS. Radix.

CL. *Diand.* O. *Monog.*

*Perennis; Americ. septent.*

G. *Collinsone*. H. *Colinsonia del Canada*.

QUAL. Odor nidorosus.

VIRT.

USUS. Colica lochialis.

CONFERVA HELMINTHOCHORTON.

CL. *Cryptog.* O. *Algæ.*

*In Corsica ad littus maris.*

N. B. Dubium an hæc substantia sit conferva, an fucus, aut potius nidus insecti marini?

OF. *Fucus helminthochorton*. s. *Corallina melitochorton*; *lemitochorton*; *corallina corsicana rubra*. G. *Mousse ou coralline de Corse*. H. *Musgo de Còrcega*. *Coralina*.

QUAL. Sapor salinus nauseosus; magnam quantitatem mucilaginis decoctione largiens.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Lumbrici.

dos. *Pulveris*: gran. x ad drach. j: in infuso ʒj-ʒj ad ℥j aquæ.

## CONFERRA RIVULARIS.

G. *Conserve*. H. *Conferva de riachuelos*.

QUAL. Magnam gazis oxygenii quantitatem præcipue hyeme exhalans.

## CONIUM MACULATUM.

CL. *Pentand*. O. *Digyn*.

*Biennis ; in desertis umbrosis , humidis.*

N. B. Cautè à *cicuta virosa*, *æthusa cynapio*, *chærophyllo sylvestri*, temulento et bulboso, nec non à *tortyllo anthrisko* distinguenda.

N. B. Conii maculati character est semen in uno latere striis nitide serratis notatum.

OF. *Cicuta major*. s. *Vulgaris*. G. *Ciguë ordinaire*. H. *Cicuta*.

QUAL. *Recentis*: Venenata; in principio narcotico et acri residens; odor teter; sapor aeris, nauseosus.

VIRT. Narcotica; diuretica.

USUS *externus* forma pulveris et cataplasmatibus: Scirrhus; ulcus phagedænicum; scrophula; tabes scrophulosa; caries; pertussis; tinea; tumor testiculi; tumor prostatae.

DOSES *pulveris vel succi inspissati*: gran. j. ascendendo gradatim ad gran. xv. de die.

PRÆP. Succus foliorum recentium expressus.



sus et inspissatus vulgo *extractum* *cutæ*.

# CONVALLARIA MAJALIS. Flores.

CL. *Hexandr.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Lilium convallium.* G. *Muguet de mai.*

H. *Lilio de los valles.*

QUAL. *Recentis* : Odor fragrans ; sapor amarus , acris , nauseosus.

VIRT. Errhina ; narcotica ; antispasmodica ; cathartica.

USUS. Epilepsia?

# CONVALLARIA POLYGONATUM.

Radix.

CL. & O. *præced.*

*Perennis.*

OF. *Sigillum salomonis* G. *Sceau de Salomon.* H. *Poligonato.*

QUAL. Fatua ; mucilaginoso.

VIRT. Cosmetica?

USUS.

# CONVOLVULUS JALAPPA. Radix.

CL. *Pent.* O. *Monog.*

*Mexicana.*

OF. *Jalapa.* G. *Jalape.* H. *Jalapa.*

QUAL. In principio resinoso acris residens ; odor ingratus ; sapor nauseosus.

VIRT. Cathartica. *Resinæ* : Drastica ; anthelminthica.

USUS : Vermes ; obstipatio ; physconia abdom.

DOSES *pulveris* : Drach.  $\beta$ - $\gamma$ ij pro adultis.

PRÆP. Resina ; tinctura resinæ.

CONVOLVULUS SCAMMONIA. Succus  
radicis gummi-resinosus inspissatus.

N. B. Optimus incisione radicis; vilior  
expressione aut decoctione plantæ ob-  
tentus.

CL. & O. *præced.*

*Perennis; Syriæ.*

OF. *Scammonium. c. Scamonée d' Alep.*

II. *Escamonea.*

QUAL. In succo lacteo acri et principio re-  
sinoso cum puaco gummoso residens;  
sapor acris, amaricans; odor nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica.

USUS.

DOSIS: Gran. v-x-xx.

PRÆP. Resina cum extracto glycyrrhizæ  
mixta vulgo *diagridium*.

CONVOLVULUS SEPIUM. Succus herbæ  
expressus et inspissatus.

OF. *Convolvulus major albus. c. Liseron.*

QUAL. et VIRT. Scammonium æmulans.

DOSIS: Gran. xx-xxx.

CONVOLVULUS SCOPARIUS. Lignum.

*Fructu. insul. Larrancus.*

H. *Palo de rosa?*

AN lignum Rhodium verum?

CONVOLVULUS SOLDANELLA. Herba.

CL. & O. *præced.*

*Ad litora maris Europæ.*

OF. *Soldanella; Bressica marina. c. Sol-  
danelle; chous marin. II. Soldanela.*

QUAL. In succo lacteo acri residens; sapor acris, amaricans, nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica.

USUS. Hydrops.

DOSIS: ʒj.

CONVOLVULUS TURPETHUM. Radix.

CL. & O. præced.

Perennis; Indica.

OF. *Radix turpethi*, G. *Racine de turbith*.

H. *Turbit*.

QUAL. In principio resinoso acri residens; sapor subinsipido-acris, nauseosus.

VIRT. Cathartica.

USUS.

COPAIFERA OFFICINALIS. Resina liquida incisione arboris obtenta (vulgo Balsamum).

CL. *Decand*. O. *Monog*.

Arborea; Americ. merid.

OF. *Balsamum copaivæ*. s. *de copaiba*. G. *Baume de copahu*. H. *Resina copaiva*.

QUAL. Liquido-tenax; flavescens; in principio resinoso residens; odor fragrans; sapor aromaticus, subacris, amaricans; urinam amaram reddens.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS; Blennorrhœa; leucorrhœa; morbi pulmonum, renum et hepatis pituitosi; atonici; circumeissio.

DOSIS: Gutt. xxx-℥i. bis de die in haustu aquæ vel in vitello ovi.

CORDIA MYXA. Fructus (Drupa).  
 CL. *Pentand. O. Monog.* *Arbor. Egypt. ; Ind.*

OF. *Sebesten. G. Sebestier. H. Sebesten.*  
 QUAL. Dulcis; mucilaginoso.  
 VIRT. Nutriens; lubricans.  
 USUS: Raucedo; tussis; stranguria.

CORIANDRUM SATIVUM. Semen.  
 CL. *Pentand. O. Digyn.* *Annua.*  
 OF. *Semen coriandri. G. Coriandre. H. Cilantro.*

QUAL. Odor teter; sapor aromaticus; sennæ odorem et saporem ingratum egregiè mitigans.  
 VIRT. Hypnotica; lactifuga; carminativa.  
 USUS. Cum infuso sennæ.  
 DOSIS: Drach. j.

CORIS MONSPELIENSIS. Herba.  
 CL. *Pentand. O. Monog.* *Biennis; Europ. austr.*  
 OF. *Coreos. G. Corise. H. Coris de Montpellier.*

QUAL. Præstans: sapor intense amarus; nauseosus.  
 USUS. Syphilis?

CORTEX ANGELINÆ. Obscura.  
*Insul. Grenad.*  
 OF. *Angelina.*

QUAL.  
 VIRT. Anthelmintica.  
 USUS: Lumbrici.

DOSIS : ℥j ad ℥iij aquæ ad celat. ℥j. Cujus uncia una alterave exhibetur omni mane.

## CORTEX ANGUSTURÆ.

Obscura.

*Insul. Trinit. ; Florid.*

Vide BRUCEA.

## CORTEX BELA-AÏE.

Obscura.

*Arbor. Madagascar.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Diarrhœa; dysenteria; hæmorrhoids.

DOSIS. ℞j-i℥ mane et vespere.

## CORTEX CHINÆ FLAVUS.

Obscura.

*Americ. merid.*OF. *Cortex Chinæ regius*, H. *Quina amarilla del Rey*.

QUAL. Sapor intense amarus; substypticus.

VIRT. Roborans; stomachica.

USUS. Intermittentes.

## CORTEX CHINÆ RUBER.

Obscura.

*Amer. merid.*H. *Quina roja*.

QUAL. Sapor intense amarus.

VIRT. Eadem ac præced.

USUS. Intermittentes.

## CORTEX CHINÆ SURINAMENSIS.

Obscura.

*Surinam.*H. *Quina de Surinam*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

## CORTEX JUBABÆ.

Obscura.

*Ind. orient.*H. *Yubaba*.

QUAL. Sapor amaricans.

VIRT. Nervina?

USUS.

## CORTEX LAVOLA.

Obscura.

H. *Lavola aromatica*.

QUAL.

VIRT.

USUS.

## CORTEX MASOY.

Obscura.

*Nov. Guinea.*H. *Masoy*.

QUAL. Odor gratus.

VIRT.

USUS *externus*: Tormina ventris.

## CORTEX POGGEREBÆ.

Obscura.

H. *Pogereba*.

QUAL. Styptica; subamara.

VIRT. Adstringens.

USUS. Diarrhœa; dysenteria.

## CORYLUS AVELLANA.

Oleum fixum  
nuclei expressum.CL. *Monœc. O. Polyand.**Fruticosa.*OF. *Coryli s. Avellanæ nuces, c. Avellane, Noissettier, Coudrier. H. Avellanas.*

QUAL. Oleum fixum, ægre rancescens, inodorum; hinc odoribus excipiendis aptum.

**COSTUS ARABICUS.** Radix; Cortex  
Radiciſ.

CL. *Monand.* O. *Monog.* Perennis; Ind. orient.  
et occident.

OF. *Costus arabicus*; *costus dulcis & amarus.* G. *Coste arabique.* H. *Costo arabigo.*

QUAL. In extractivo amaro et oleo volatili residens; sapor amaricans, aromaticus; odor fragrans; urinam violaceo odore imprægnans.

VIRT. Stimulans; calefaciens; menagoga.

USUS: In officinis sæpe cum canella alba confunditur.

DOSIS *pulv.* drach. semis; pro infuso unc. semis ad ℥j aquæ.

**CRAMBE ORIENTALIS.** Radix recens.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliquos.* Perennis.

OF. *Crambe.* H. *Crambe oriental.*

QUAL. In principio acri volatili residens.

VIRT. Antiscorbutica.

USUS.

**CROCUS SATIVUS.** Stigmata pistilli.

CL. *Triand.* O. *Monog.* Alpina; Europæ austri.  
hortensis.

Variet. A. officinalis autumnalis.

OF. *Crocus austriacus s. orientalis.* G. *Saffran.* H. *Azafran.*

QUAL. Luteo-tinctoria; in oleo volatili et principio narcotico et resinoso residens;



odor fragrans, virosus; sapor subaromaticus.

VIRT. Sedativa; hypnotica, leviter stimulans; antispasmodica; menagoga.

USUS: Amenorrhœa atonica; colica lochialis; pneumonia notha; vomitus. *Externus*: Ophthalmia.

DOSIS *pulveris*: gran. x-xx-xxx. *Tinct.* ʒß. *Extracti* gran. xv.

PRÆP. Tinctura; syrupus; extractum.

CROTON CASCARILLA. Cortex.

*Croton lineare* (HORT. KEW.).

CL. *Monœc.* O. *Monadelph.* *Arborea; Americ. meridion.*

OF. *Cortex cascarillæ. s. Eleutheriæ. G. Chaquerille. H. Chacarila.*

QUAL. In oleo volatili et extractivo amaro residens; sapor aromaticus, amarus, subacris; odor fragrans, fumo moschato.

VIRT. Roborans; stimulans.

USUS: Dyspepsia; diarrhœa; febres intermittentes et remittentes biliosæ.

DOSIS *pulveris*: Gran. x-xxx. Pro infuso aquoso vel vinoso drac. j. ad ʒj. *Extracti*: Drach. j.

PRÆP. Tinctura; extractum.

CROTON LACCIFERUM. Substantia resinosa (*Nidus insecti*).

CL. & O. *præced.* *Arborea; Ind. orient.*

N. B. Succus resinusus ex hac arbore æque ac ex fico religiosa et indica; nec

non ex arbore plasonis et rhamno jujuba, punctura insecti coccy lacca dicti exsudans; ejusque nidulum constituens.

OF. *Lacca*. s. *gummi lacca*. n. *Laca*.

QUAL. Resina rubro tinctoria; substyptica.

VIRT. Subastringens; diuretica.

USUS. Lacca sigillatoria; vernices. *Tincturae*: Laxitas gingivarum.

PRÆP. Tinctura.

CROTON TIGLIUM. Semen; lignum.

CL. & O. præced. *Arborea; Zeylanica.*

OF. *Grana tiglii*. s. *tilli*: *Lignum pavanae*. s. *Moluccense*. n. *Granos tilios*.

QUAL. Venenata, acerrima. Semen decorticatum oleum fixum, sine acri continet.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica; diuretica; exurens.

USUS.

CROTON TINCTORIUM. Fæcula.

CL. & O. præced. *Annua; Lapp. austr.*

OF. *Lacmus*. g. *Tournesol*. n. *Tornasol*.

QUAL. Cærulea, tinctoria.

USUS chemicus pro reagente.

CUCUMIS COLOCYNTHIS. Fructus: pulpa.

CL. *Monœc.* O. *Digyn.* *Annua; Asiatica; Hispan.*

OF. *Colocynthides*. g. *Coloquinte*. n. *Peppinera coliquintida*.

QUAL. Odor nauseosus; sapor amarissimus, nauseosus.

VIRT. Eximia: Diuretica; deobstruens, drastico-cathartica; menagoga; anthelminthica.

USUS. Physconia; hydrops; obstipatio; epilepsia.

DOSIS: *Intern.* gran.  $\frac{r}{8}$ . *Pulpæ* gran. xxx ad ℥ ss aquæ decoct. pro enemate.

PRÆP. Extractum cum mucilagine gummi tragacanthæ tritum, vulgo TROCHISCI ALHANDAL; resina.

N. B. Antidotum ejus est camphora.

## CUCUMIS MELO.

Semen.

CL. & O. præced.

*Annua hortensis.*

OF. *Semen melonum.* c. *Semance de melon.* h. *melon.*

QUAL. Oleosa; subdulcis.

VIRT. Refrigerans.

USUS forma emulsionis: Febres; stranguria.

## CUCUMIS SATIVUS.

Semen.

CL. & O. præced.

*Annua; hortensis.*

OF. *Semen cucumis.* c. *Concombre.* h. *Pepino.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

## CUCURBITA LAGENARIA. }

————— PEPO. }

————— CITRULLUS. }

Semen.

CL. *Monæc.* O. *Syng.*

*Annua; hortens.*

OF. *Semen cucurbitæ.* c. *Semence de cour-*

*ge, ou potiron. n. Calabaza larga, Calabaza comun, y Zandia.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

# CUMINUM CYMINUM.

Semen.

CL. *Pentand. O. Digyn.* *Annua; Europ. austr. Egypt.*

OF. *Semen cumini. g. Cumin. n. Cominos.*

QUAL. Præstans: odor fragrans; sapor acris, aromaticus.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Colica flatulenta; tympanitis; tumores frigidi.

# CUPRESSUS SEMPERVIRENS. Strobili; folia.

CL. *Monæc. O. Monadelph.* *Arborea; Asiatica.*

OF. *Folia cupressi; nuces. s. Galbuli cupressi. s. Cypressi. g. Cyprès. n. Ciprès.*

QUAL. Amaro-styptica.

VIRT. Adstrigens.

USUS.

# CURCUMA LONGA.

Radix.

CL. *Monand. O. Monog.* *Perennis; Indica.*

*Amomum curcuma (JACQUIN).*

OF. *Curcuma vulgo terra merita. g. Curcuma. n. Curcuma.*

QUAL. In principio extractivo et paucio oleo volatili residens; sapor amarus, subaromaticus; urinam luteo colore tingens.

VIRT. Tinctoria; menagoga; diuretica; deobstruens.

usus. *internus* : intermittentes ; physconia  
abdomin ; icterus ; morbi cutis.  
Dosis *pulveris* scrup. ij-drach. j. In *infuso* :  
drach. ij ad ℞ aquæ.

## CUSCUTA EPITHYMUM.

Herba.

CL. *Tetrand.* O. *Digyn.**Parasitica lupuli,  
dulcamaræ, Cannabis.*G. *Epitim.* H. *Epitimo.*

QUAL. Odor et sapor thimi ; sed debilior.

VIRT. Debilior sequenti.

## CUSCUTA EUROPÆA.

Herba.

*Parasitica ; annua.*OF. *Cuscucæ herba.* G. *Cuscute.* H. *Cus-  
cuta.*

QUAL. Inodora ; amaricans ; subacris.

VIRT. Deobstruens.

usus. Physconia abdomin. ; intermittentes.

## CYCLAMEN EUROPÆUM. Radix recens.

CL. *Pentand.* O. *Monog.**Perennis ; Hungar ;**Austriæ ; in locis umbrosis , nemorosis.*OF. *Cyclamen ; arthanita.* G. *Pain de  
pourceau.* H. *Artanita , pan de puerco.*QUAL. *Radix recentis* : In principio acri  
volatili residens , siccatione avolans ; sa-  
por primo mucilaginosus ; dein acris,  
urens , amaricans ; *assatæ* : Esculenta.VIRT. Drastico-cathartica ; menagoga ; an-  
thelminthica ; resolvens.usus : Scirrhus ; tumores frigidi ; pernio ;  
vermes.

DOSIS : Drachm. j.

PRÆP. Unguentum *de arthanita*.

# CYNARA SCOLYMUS.

Folia.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.* *Annua ; hortensis.*

OF. *Cynara hortensis. G. Artichau. H. Alcachofas.*

QUAL. Oleracea.

VIRT. Diuretica?

USUS. Hidrops.

DOSIS succi : ℥ij. iij in haustu vini generosi.

# CYNOGLOSSUM OFFICINALE. Herba; Radix.

CL. *Pentand. O. Monog.* *Biennis ; in viis et cimiteriis.*

OF. *Cynoglossum. G. Cynoglosse. H. Cynoglosa, Viniebla, lingua de perro.*

QUAL. Odor graveolens ; sapor mucilaginosus.

VIRT. Subnarcotica ; phthiriaca.

USUS.

# CYNOMORJUM COCCINEUM.

CL. *Monœc. O. Monand.* *Plantarum maritimarum parasitica ; Afric. ; Sicil. ; Jamaic.*

OF. *Fungus Melitensis. H. Hongo de Malta.*

QUAL. Nigra ; sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS. *decocti internus* : Hæmorrhagiæ ; dysenteria atonica ; ulcera. *Externus* : Ulcera phagedænica.

DOSIS pulveris : Gr. xx ad drach. j.

## CYPERUS LONGUS.

Radix.

CL. *Triand.* O. *Monog.* *Perennis ; Europ. austr. Syrie ; in locis humidis.*OF. *Cyperus longus.* G. *Souchet.* H. *Juncia larga.*

QUAL. Odor fragrans ; sapor grate aromaticus, calidus.

VIRT. Diuretica ; menagoga.

USUS. Ulcera vesicæ, uteri, oris ?

## CYPERUS ODORATUS.

Radix.

———— ROTUNDUS. }

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced. sed debilior.

CYTINUS HYPOCISTIS. Succus bacca-  
rum expressus, inspissatus.CL. *Gynand.* O. *Dodecand.* *Annua ; parasitica ; Europ. austr.*OF. *Hypocistidis succus.* G. *Hipocistis.* H. *Hipocistido.*

QUAL. Sapor acido-austerus, stypticus ; alcohole solubilis.

VIRT. Adstringens.

USUS. Profluvia.

## CYTISUS LABURNUM.

Cortex.

VARIETAS : *Alpinus.*CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Arborea ; alpina ; hortensis.*OF. *Cytisus alpinus.* G. *Cytise des Alpes.* H. *Citiso.*

QUAL.



VIRT. Menagoga.

USUS *decocti*: Amenorrhœa.

## D.

DAPHNE GNIDIUM.

Semen.

CL. *Octand. O. Monog.**Fruticosa.*OF. *Semen coccognidii*; *granum gnidium.*G. *Garou.* H. *Torvisco.*

QUAL. Venenata.

VIRT.

USUS.

DAPHNE LAUREOLA. Cortex radicis.

OF. *Cortex mezerei.* G. *Joli-bois.* H. *Laureola.*

QUAL et VIRT. Eadem ac sequentis.

USUS præcipuus corticis recentis aceto emolli loco vesicantis.

PRÆP. Unguentum ad foniculos.

DAPHNE MEZEREUM. Cortex radicis.

CL. & O. *præced.**Fruticosa.*OF. *Cortex laureolæ.* S. *Mezerei.* G. *bois-gentil.* H. *Mezereon.*

QUAL. Venenata; in principio acris residens; sapor acris, urens.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica; diuretica. *Extern.*: Corrodens; vesicans.USUS *decocti corticis*: Ulcera maligna; morbi cutis et ossium syphilitici. *Externus* forma cataplasmati: Scirrhus; orchiochele; lepra.

dos: Drach. ij corticis radicis (vel radicis) concisi cum portione æquali glycyrrhizæ in ℥iij aquæ coquendo ad colat. ℥ ij.

N. B. Antidotum ejus est camphora.

DAPHNE TYMELÆA.

Radix.

℞. *Timelea*.

QUAL et VIRT. Eadem ac præced.

DATISCA CANNABINA.

Herba.

CL. *Diæc. O. Dodecand.*

QUAL.

VIRT.

USUS. *pulveris* (loco *cinchonæ*): Inter-  
mittentes.

dos: Gran. xx-xxx; repetendo hanc do-  
sim ter quaterve tempore apyrexia.

DATURA STRAMONIUM. Semen; folia;  
succus foliorum expressus et inspissatus.

CL. *Pentand. O. Monog.*

*Annua; in locis  
desertis, arenosis.*

OF. *Stramonii herba; daturæ semina c.*  
*pomme épineuse. ℞. Extramonio.*

QUAL. Venenata; in principio acri, narco-  
tico residens; odor virosus, sapor nau-  
seosus, amarus. *Seminis*: insipida.

VIRT. Narcotica interne vel externe appli-  
cata dementans.

USUS *succi inspissati*: Melancholia; mania  
post puerperium; epilepsia; amentia;  
carcinoma; varix ani; combustura.

DOSIS: gran.  $\frac{x}{4}$  ad gran. j-vj.

N. B. Antidotum ejus est acidum acetosum, vel acidum citricum.

DAUCUS CAROTA. Radix recens; folia;

Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

*Biennis.*

OF. *Daucus sativus.* G. *Carote.* H. *Zanahoria.*

QUAL. *Radicis*: In principio mucilaginoso-saccharino residens; sapor dulcis, mucilaginosus. *Seminum*: odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans.

VIRT. *Radicis*: Demulcens; antiseptica; *seminum*: stimulans; anthelminthica?

USUS *radicis rasæ forma cataplasmatidis*: ulcera phagedænica, putrida, herpetica; carcinoma. *Decocti radicis*: Stranguria.

DELPHINIUM CONSOLIDA. Flores.

CL. *Polyandr.* O. *Trig.*

*Annua.*

OF. *Flores calcitrappæ*; *consolida regalis.* G. *Pied-d' alouette.* H. *Espuela de Caballero.*

QUAL. *Cærulea.*

VIRT.

USUS.

DELPHINIUM STAPHISAGRIA. Semen.

CL. & O. *præced.*

*Biennis*; in montibus Europæ austr.

OF *Staphisagria.* G. *Staphisaigre.* Herbe aux Poux. H. *Albarraz.*

QUAL. Præstans: Sapor amarus, acris, nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica; anthelminthica; phthiriaca.

USUS pulveris: Pediculi; acari subcutanei; odontalgia.

PRÆP. Unguentum.

DENTARIA PENTAPHYLLOS. Radix.

CL. *Tetradyn. O. Siliquos.* Alpina; Europ. austr.

OF. *Dentaria minor. c. Dentaire.*

QUAL. In principio acris volatili residens; sapor acris, nauseosus ut cochleariæ armoraciæ.

VIRT.

USUS.

DIANTHUS CARYOPHILLUS. Petala.

CL. *Decand. O. Digyn.* Annuæ.

OF. *Floræ tunicæ hortensis; caryophylla rubra. c. OEillet girofflée. n. Clavel.*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT.

USUS.

DICTAMNUS ALBUS. Radix.

CL. *Decand. O. Monog.* Perennis.

VARIET. A. *Flore nivea. n. Flore rubro.*

OF. *Dictamnus albus; fraxinella. c. Dictame; fraxinelle. n. Dictamo blanco.*

QUAL. Radicis recentis: Odor ambrosiacus; sapor amarus, subaromaticus.

**VIRT.** Nervina; anthelminthica; menagoga.  
**USUS.** Epilepsia; ataxia; leucorrhœa; vermes.  
**PRÆP.** Tinctura gutt. xx-l ter die.

## DIGITALIS PURPUREA. Folia.

**CL.** *Didyn. O. Angiosp.* *Biennis; in sylvis.*

**N. B.** Tempore quo flores erumpunt colligenda, et caute siccanda.

**OF.** *Digitalis purpurea. G. Grande digitale. H. Dedalera; gualda perra.*

**QUAL.** Venenata; in principio acri residens; sapor acris, amarus, nauseosus.

**VIRT.** Emetica; Drastico-cathartica; diuretica.

**USUS.** Hydrothorax (WITHERING); hidrops atonicus; nephritis calculosa; epilepsia et mania à sero effuso; dysuria; phthisis forma decocti debilis pro potu ordinario vel forma syrupi (PARKINSON); scrophula?

**DOSIS:** Unc. j-ij ad ℥ j ℥ aquæ coquendo ad colat. ℥ j cuius ℥j-℥ cum drach. ij. aquæ aromaticæ omni bihorio sumenda.

**Pulveris:** Gran. j-iiij bis die pro adultis. Pro infuso drach. j foliorum siccatorum ad uncias viij aquæ fervidæ per quadrihorium digesta; colat. addendo unc. j. aquæ aromaticæ cujusdam; dosis unc. j. bis de die, quæ est dosis media pro adulto; multis unc. semis bis de die sufficit.

**PRÆP.** Syrupus cum succo herbæ et florum paratus.

DOLICHOS URENS. Pubes leguminis rigida.

CL. *Diadelph. O. Decand.* Ind. orient. et Amer. merid.

OF. *Siliquæ hirsutæ ; dolichos pruriens.*

G. *Yeux de bourique.* H. *Dolico.*

N. B. PAIVA hanc et sequentem plantam ad genus novum *Lavradia* dictum refert.

QUAL. *emulsi.*

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Lumbrici.

DOSIS. Drach. j-iv. cum syrupo aut mucilagine.

DOLICHOS PRURIENS. Pubes leguminis rigida.

N. B. Vid. *Lavradia.*

CL. & O. *præced.* Ind. occident.

G. *Pois à gratter.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac *præced.*

DOLICHOS SOJA. Faba.

CL. & O. *præced.* Ind. orient.

G. *Dolic des Indes.*

QUAL. Subdulcis ; farinacea.

VIRT. ?

USUS. Culinaris.

DORONICUM LATIFOLIUM. } Radix.

----- PARDALIANCHES. }

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.* Perennis ; alpinæ, Europ. austr.

OF. *Doronicum*. G. *Doronic*. H. *Doronicò*, *Mata lobos*.

QUAL. Sapor dulcis, aromaticus.

VIRT. Arnicam montanam æmulans.

USUS.

**DORSTENIA CONTRAYERVA.** Radix.

CL. *Monæc.* O. *Diand.* Perennis Americ. merid.

OF. *Contrayervæ radix*. G. *Contrayerva*.  
H. *Contrayerba*.

QUAL. Præstans: Odor subfragrans; sapor amaricans, subaromaticus, stypticus.

VIRT. Adstringens; antiseptica; sudorifica; stomachica; stimulans.

USUS. Febres et exanthemata atonica; dysenteria.

DOSIS *pulveris*. Gran. x-drach. j. *Tincturæ*; drach. j-ij.

**DRACÆNA DRACO.**

Resina.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* Fruticosa; Ind. orient.

OF. *Sanguis draconis*. G. *Sang dragon*.  
H. *Sangre de drago*.

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Hæmorrhagiæ; Leucorrhœa; apocenos.

DOSIS.

**DRACOCEPHALUM CANARIENSE.**

Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.*

Perennis; Insular. Canar.



*N. B.* Floribus spicatis; foliis compositis.

OF. *Melissa canariensis*.

QUAL. Eximia: Odor intense fragrans; sapor gratus, aromaticus.

VIRT. Excitans; nervina; stomachica.

USUS. Cachexiæ; cephalalgia; cardialgia.

## DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM.

CL. & O. *præced.*

*Annua.*

OF. *Melissa turcica*.

QUAL. et VIRT. Multo debilior *præced.*

## DROSERA ROTUNDIFOLIA. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Tetrag.*

*Biennis.*

OF. *Ros solis*; *rosella*. H. *Rocio del sol*.

QUAL. Lactescens; sapor acris.

VIRT. Corrodens.

USUS.

## E

## ECHITES SYPHILITICA. Folia; Herba.

CL. *Pentand.* O. *Monog.*

*Fruticosa; Surinam.*

G. *Echite antivenérienne*.

QUAL. Lactescens.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS *decocti*: Syphilis.

## EPIDENDRUM VANILLA. Siliqua.

CL. *Gynand.* O. *Diand.*

*Fruticosa; parasitica.*

*Ind. occident.*

OF. *Vanilla*. G. *Vanille*. H. *Vainilla*.

QUAL. Eximia: pinguis; odor ambrosiacus; sapor gratus, aromaticus.

VIRT. Stimulans ; calefaciens ; nervina ;  
aphrodisiaca.

ŪSUS. Potissimum ut chocoladæ ingrediens.

DOSIS. Drach. semis.

## EQUISETUM ARVENSE.

Herba.

CL. *Cryptog.* O. *Filices.*

*Perennis.*

OF. *Equisetum* ; *cauda equina.* G. *Prele.*

*Queue de cheval.* H. *Cola de caballo.*

QUAL.

VIRT. Adstringens ; diuretica.

USUS. Blennorrhœa ; apocenoses ; tabes?

Hœmaturia?

## EQUISETUM HYEMALE.

QUAL. et VIRT. Præced.

## ERIGERON ACRE.

Herba.

CL. *Syngen.* O. *Polyg. superfl.*

*Perennis.*

OF. *Coniza cærulea.*

QUAL. Sapor acris ; synapim æmulans.

VIRT. Antiscorbutica.

N. in Hispania *Erigeron viscosum* ; vulgo  
*Olivada.*

## ERVUM LENS.

Semen.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.*

*Annua.*

OF. *Lens* ; *lentium semen.* G. *Lentille.* H.

*Lentejas.*

QUAL. Farinacea.

VIRT.?

USUS.

## ERVUM ERVILIA.

Semen.

CL. & O. præced.

*Annua* ; *Europ. austr.*

OF. *Ervi s. orobi semen. g. L'Ers. h. Al-berja, Yeros.*

QUAL. Farinacea.

VIRT.

VSUS.

ERYNGIUM CAMPESTRE. Radix.

CL. *Pentand. O. Digyn.* Perennis; maritim.

OF. *Eryngium vulgare. g. Chardon-roland.*

H. *Cardo corredor.*

QUAL. Sapor dulcescens, subaromaticus.

VIRT. Diuretica; aphrodisiaca.

VSUS. Tabes pulmonalis ulcerosa.

DOSIS. Unc. semis ad ℥ j aquæ pro infuso

quotidie.

ERYNGIUM FÆTIDUM. Herba

CL. & O. præced.

Americ.

QUAL. Eximia: odor teter, foetidissimus.

tenax.

VIRT. Cathartica; diuretica; antispasmodica.

VSUS. Hysteria; hydrops.

ERYSIMUM ALLIARIA. Herba.

CL. *Tetrad. O. Siliqu.*

Perennis; in locis umbrosis.

OF. *Herba alliariæ. g. Alliaire. h. Aliaria.*

QUAL. In principio acri residens, odor alliaceus; sapor amarus.

VIRT. Diuretica; errhina; antiscorbutica.

VSUS. Asthma; ulcus putridum.

## ERYSIMUM BARBAREA.

Folia.

CL. & O. *præced.**Perennis.*OF. *Barbareæ folia.* G. *Herbe St. Barbe.* H. *Yerba de Sta. Bárbara.*

QUAL. Sapor amarus, subacris; odor herbaceus.

USUS. Antiscorbutica.

## ERYSIMUM OFFICINALE. Herba recens et fructus.

CL. & O. *præced.* *Annua; ad vias et in sabulosis.*OF. *Erysimum.* G. *Velar; tortelle.* H. *Erisimo.*

QUAL. In principio acri residens sapor acris.

VIRT. Adstringens; diuretica; antiscorbutica.

PRÆP. Syrupus ex succo recenti paratus.

USUS *Syrupi* egregius: Paraphonia; rauco; tussis; ischuria?

## EUPATORIUM CANNABINUM. Herba; radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.**Perennis.*OF. *Eupatorium.* G. *Eupatoire d'Avicenne.* H. *Eupatorio.*

QUAL. Sapor intense amarus; odor acris; penetrans.

VIRT. *Radicis*: diuretica; cathartica; emetica.

USUS. Cachexiæ; hydrops; hydrocele.

## EUPHORBIA CANESCENS.

CL. *Dodecand.* O. *Trigyn.*

QUAL. Acris.

VIRT. Antisymphilitica.

USUS. *Americanis* : syphilis.

EUPHORBIA ESULA. Succus foliorum  
expressus.

CL. & O. *præced.*

*In sepibus et locis aridis.*

OF. *Esula.*

QUAL.

VIRT. ?

USUS. Icterus.

DOS. *succi* drachm.  $\beta$ -j-unc. semis omni  
mane.

PRÆP. Extractum-gr. viij-x.

EUPHORBIA OFFICINARUM. Succus  
gummi-resinosus incisione plantæ ob-  
tentus.

CL. & O. *præced.*

*Fruticosa.*

OF. *Gummi Euphorbium. G. Euphorbe.*

H. *Euforbio.*

QUAL. Lactescens ; in principio acri resi-  
noso residens ; sapor acris ; urens.

VIRT. Drastico-cathartica ; errhina ; rube-  
faciens ; vesicans.

PRÆP. Tinctura ; emplastrum.

USUS *externus pulveris (melius tincturæ) :*  
punctura ; caries. *Emplastri :* Arthro-  
dynia rheumatica.

N. B. Euphorbiæ diversæ species qua-  
litate et virtute fere similes sunt.

## EUPHORBIA LATHYRIS. Semen.

CL. & O. *præced.* Biennis; Europ. austr.OF. *Cataputia minor.* c. *Epurge*, *Catapuce.* c. *Tartagos.*

QUAL. Lactescens; acris.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica; corrodens.

## EUPHORBIA PALUSTRIS. Succus foliorum expressus et inspissatus; radix; cortex radiceis,

CL. & O. *præced.* Perennis.OF. *Tithymalus.* c. *Tithymale des marais.*  
H. *Esula.*

QUAL. Lactescens; acris.

VIRT. Drastico-cathartica; errhina; corrodens; vesicans.

USUS *externus*: Tinea; verruca; clavus; serpigo; odontalgia.

DOSIS succi inspissati gr. viij-xii-3j.

## EUPHORBIA PARVIFLORA. Herba.

CL. & O. *præced.* Ind. occident.

QUAL.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS decocti: Syphilis.

## EUPHRASIA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* Annua; in collibus siccis, sterilibus.OF. *Euphrasia.* c. *Euphrase.*

QUAL. Pinguis; amaricans.

VIRT. ?

USUS. Ophthalmia.

EXCŒCARIA AGALLOCHA. Lignum.

OF. *Agallochum verum.*

F.

FAGARA OCTANDRA. Resina sponte, vel  
incisione corticis. exsudans (JACQUIN).CL. *Tetrand. O. Monog.**Arborea; insule  
Curacao.*H. *Tacamaca*

QUAL. Odor ambrosiacus.

USUS. Ad suffimigia.

Vide etiam *populus Balsamifera.*

FAGARA PTEROTA.

Baccæ.

CL. & O. *præced.**Arborea; Jamaica.*

QUAL. Subacris; aromatica.

VIRT. Calefaciens; stomachica.

USUS.

FERULA ASSA FÆTIDA. Succus gummi-  
resinosus, incisione radicis plantæ  
obtentus, concretus.CL. *Pentand. O. Digyn.**Perennis; Persiæ.*OF. *Assa fætida; gummi assæ fætidiæ.*G. *Assa fætida.* H. *Asa fætida.*QUAL. In oleo volatili et principio resino-  
so residens; sapor acris, aromaticus,  
nauseosus; odor alliaccus. Gummi-resi-  
na ex  $\frac{2}{3}$  gummi et  $\frac{1}{3}$  resinæ constans.

VIRT. Stimulans; antispasmodica; anthel-



minthica ; carminativa ; menagoga ;  
deobstruens ; resolvens.

usus *internus* et *externus* forma pilularum , tincturæ , enematis , emplastri :  
Hysteria ; convulsio ; cardialgia spasmodica ; colica flatulenta ; tympanitis ; asthma spasmodicum ; pertussis ; physconia abdominalis ; vermes : paronychia ; bubo ; caries.

DOSIS *pulveris* : Gran. x-xl-lx *Tincturæ* :  
gutt. x-xxx-3ij.

PRÆP. Tinctura ; emplastrum ; pilulæ.

## FEVILLEA TRILOBATA.

VIRT. Morsura serpentum.

## FICUS CARICA.

Fructus:

CL. *Polyg. O. Dicc.*

*Arborea ; Europ. austr.*

OF. *Carica pinguis ; ficus. G. Ficus. H. Higos.*

QUAL. Dulcis ; mucilaginosus.

VIRT. Nutriens ; emolliens ; maturans ;  
obtundens ; expectorans ; eccoprotica ;  
herpetica ?

usus *decocti internus* : Raucedo ; tussis ;  
colica pictorum ; obstipatio. *Externus*  
in lacte decocti , vel assati fructus forma cataplasmatibus : Odontalgia ; phlegmone ; cynanche ; bubo ; anthrax.

FICUS INDICA.

— — RELIGIOSA.

Substantia gumi-re-  
sinosa punctura in-  
secti ex arbore ex-  
sudans; ejusque ni-  
dum constituens.

CL. & O. *præced.**Arborea ; Ind. orient.*G. *Figuiers à Lacque.*

OF. *Gummi-lacca in granis. Igne fusa,*  
*Gummi-lacca in tabulis dicta. Vid.*  
*COCCUS.*

QUAL. *resin.*VIRT. *Adstringens.*

USUS *externus tincturæ : Laxitas gingiva-*  
*rum : Item ad ceram sigillatoriam con-*  
*ficiendam.*

FRAGARIA VESCA. Radix; herba;  
fructus recens.

CL. *Icosand. O. Polyg.**Perennis.*

OF. *Fragaria; fraga. G. Fraisier ordi-*  
*naire s. Fragaire : fraises. H. Fresa.*

QUAL. *Radicis & herbæ : Subastringens;*  
*fructus : Sapor acidulo-dulcis ; odor*  
*fragrans.*

VIRT. *Diuretica ; eccoprotica ; refrigerans.*USUS. *inter.*

FRAXINUS EXCELSIOR. Cortex ramu-  
lorum; semen; folia.

CL. *Polyg. O. Diæc.**Arborea.*

OF. *Cortex fraxini. G. Ecorce du fresne*  
*ordinaire. H. Fresno.*

QUAL. *Corticis* : Sapor amaricans. *Seminum* : aromaticus.

VIRT. *Corticis* : Antiseptica. *Seminum* : Diuretica ; aphrodisiaca ?

USUS *Corticis* , loco cinchonæ officinalis : intermittentes. *Seminum* : Lithiasis ?

Polysarcia ? *Foliorum* : Morsura serpentum ?

## FRAXINUS ROTUNDIFOLIA

Aliæque SPECIES.

Succus saccharinus  
ex arbore  
exsudans

CL. & O. præced.

Arborea ; Europ. austr.

OF. *Manna*. c. *Manne*. H. *Maná*.

QUAL. In principio saccharino mucilaginoso residens ; sapor nauseoso-dulcis.

VIRT. Eccoprotica.

USUS. Obstipatio.

DOS. Unc-j. Infantibus drach. j-iiij.

## FUCUS VESICULOSUS.

Cineres.

CL. *Cryptog.* O. *Algæ*.

OF. *Quercus marina* ; æthiops vegetabilis. c. *Varech*. *Ethiops vegetal*.

QUAL. Salina ; alkalina.

USUS *Calcinati* : Bronchocele ; scrophula.

DOS. Drach. j. bis de die.

## FUMARIA VULBOSA.

Radix.

CL. *Diadelph.* O. *Hexand.*

Perennis ; in  
umbrosis.

Variet. A. Radice cava. B. Radice non cava.

OF. *Aristolochia cava. s. favacea. G.*

*Fumeterre bulbeuse.*

QUAL. Sapor amarus; debilior sequenti.

VIRT. Stomachica.

FUMARIA OFFICINALIS. Herba recens;  
succus.

CL. & O. præced.

*Annua; in campis.*

OF. *Fumaria. G. Fumeterre ordinaire. H.*

*Fumaria.*

QUAL. Inodora; sapor pure et intense  
amarus.

VIRT. Stomachica; antacida.

USUS. Dyspepsia; morbi cutis; cachexia;  
phthisia abdominalis.

DOS. succi herbæ recentis expressi unç. ij  
bis de die. *Extracti: Drach. j-ij.*

PRÆP. Extractum; conserva; syrupus;  
tinctura.

## G.

GALEGA OFFICINALIS.

Herba.

CL. *Diadelph. O. Decand.*

*Peregrina; Europ.*

OF. *Galega. G. Galèga, Lavanèse. H.*

*Ruda cabruna.*

QUAL. Sapor amaricans, mucilaginosus.

VIRT. ?

USUS.

GALIUM APARINE. Succus ex herba,  
primo vere collecta, expressus.

CL. *Tetrand. O. Monog.*

*Tom. I.*

OF. *Aparine. c. Grateron. n. Amor de hortelano.*

QUAL. Sapor adstringens.

VIRT.?

USUS. Scrophula; morbi cutanei?

DOS. Unc. iv bis de die.

**GALIUM MOLLUGO.** Herba cum floribus

CL. & O. *præced.*

*Perennis.*

OF. *Galium album. c. Caillelait blanc.*

QUAL.

VIRT.?

USUS *succi expressi*: Epilepsia.

DOS.: Unc. v-vj mane jejuno stomacho.

**GALIUM VERUM.** Herba cum floribus

seu coma.

CL. & O. *præced.*

*Perennis; in pratis et multis antiquis.*

OF. *Galium luteum. c. Aune; caille-lait. n. Cuajaleche.*

QUAL. *Recentis*: Odor fragrans; sapor adstringens.

VIRT. Coagulans lac.

USUS. Epilepsia; hæmaturia; hysteria.

**GARCINIA MANGOSTANA.** Cortex: cap

sulæ; medulla.

CL. *Dodecandr. O. Monog.*

*Arborea; Ind. orient.*

OF. *Mangostanæ cortex. n. Mangostan.*

QUAL. Styptica. *Medullæ*: Farinacea.

USUS *infusi vel tincturæ cort.*: Dysenteria; tenesmus; aphtha.

GENISTA CANARIENSIS. Radix lignosa.  
An lignum Rhodium?

CL. *Diadelph. O. Decand.*      *Arborea; insule  
Canariens.*

G. *Faux bois de Rhodes.* H. *Palo de rosa?*

QUAL. Odor fragrans, roseus; sapor subamarus; resinosus.

VIRT. Sudorifica.

USUS.

PRÆP. Oleum volatile.

GENISTA TINCTORIA.      Herba; flores;  
semen.

CL. & O. *præced.*      *Fruticosa.*

G. *Genestrose.* H. *Retama macho.*

QUAL. Luteo-tinctoria, inodora, insipida.

VIRT.

USUS. Hydrops.

GENTIANA AMARELLA.      Herba.

CL. *Pentand. O. Digyn.*      *Perennis; alpina.*

OF. *Gentianella.* G. *Gentiane amarelle.*

QUAL. Sapor intense amarus.

VIRT. Stomachica; anthelminthica.

USUS.

GENTIANA ASCLEPIADEA.      Radix.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

USUS idem.

GENTIANA CRUCIATA.      Radix.

*G. Gentiane croissette.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

**GENTIANA CENTAUREUM.** Herba; ca-  
CL. & O. præced. cumen.

OF. *Centaurium minus.* A. *Petite centauree.* H. *Centaura menor*; *Hiel de la tierra.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac sequentis.

PRÆP. Extractum.

DOSIS. Scrup. j-drach. j.

**GENTIANA LUTEA.** Radix.

CL. & O. præced. Perennis; alpina.

OF. *Gentiana rubra.* G. *Gentiane.* H. *Gentiana.*

QUAL. Intense et pure amara.

VIRT. Stomachica; antiseptica; anthelminthica.

USUS *extracti*: Dyspepsia; icterus; intermittentes; phisconia abdominal.; leucophlegmatia; chlorosis; podagra; vermes.

PRÆP. Extractum; infusum aquosum vel vinosum. DOSIS. ʒj-3j.

**GENTIANA PURPUREA.** Radix.

CL. & O. præced. Norwegica.

NORWEGIS: *Skorsite.*

OF. *Radix cursuta.*

QUAL. VIRT. et USUS. Præced.

**GEOFFROYA INERMIS** (HORT. KEW.)

Cortex.

CL: *Diadelph.* O. *Decand.* Arborea; Jamaic.



QUAL. Odor nauseosus ; sapor nauseosodulcis.

VIRT. Drastico-cathartica ; emetica ; anthelminthica.

USUS *decocti* : Lumbrici et ascarides.

DOS. *pulveris corticis* : Unc. j ad ℥ij aquæ coctæ ad ℥j β. - Sumendo unc. j omni hora , donec album movere incipiat.

GEOFFROYA SURINAMENSIS. Cortex.

QUAL. *Surinam.*

VIRT. anthelminthica efficax , ubi alia fefellerunt.

USUS Idem ac præced.

DOS. Drach. iij ad aquæ colat. ℥ viij pro adulto ; minuendo pro junioribus.

GERANIUM MOSCHATUM. Herba.

CL. *Monadelph. O. Decand.* *Annua.*

H. *Almizcleña.*

QUAL. Odor ambrosiacus , moschatus.

VIRT.

USUS.

GERANIUM ROBERTIANUM. Herba.

G. *Herbe à Robert.*

QUAL. Odor sapor salsus , substypticus.

VIRT. Subastrigens ; lactifuga ?

USUS. Hæmaturia : profluvia. *Externus* :

Bubo ; ulcera vulvæ aut mammarum ;

Rhagas.

GEUM RIVALE.

Radix.

CL. *Icosand. O. Polyg.*

*Perennis ; in locis humidis nemorosis*

OF. *Geum rivale*, seu *palustre*. g. *Benoite aquatique*.

QUAL. Præstans : sapor amaricans, sub-  
typticus.

VIRT. Adstringens.

USUS *pulveris radice extern.* Ulcera sy-  
philitica. *Internus* : Diarrhœa atonica;  
chlorosis; intermittentes.

DOS. *pulveris* : Scrup. ij-drach. j. Pro de-  
cocto unc. ℥ ad ℥j aquæ.

GEUM URBANUM. Radix; fibræ radi-  
cis (primo vere ex solo sicco colli-  
gendæ).

CL. & O. præced.

*Perennis; in locis umbratis  
nemorosis.*

OF. *Radix caryophyllatæ*. s. *gei urbani*.  
g. *Benoite caryophyllée*. n. *Cariofilata*.

QUAL. In principio adstringente cum pau-  
co oleo volatili residens; sapor subaro-  
maticus, amaricans; odor fragrans ca-  
ryophylli.

VIRT. Roborans; antiseptica; cinchonæ  
virtutes æmulans.

USUS. Egregius, loco cinchonæ: Intermit-  
tentes rebelles; febres atonicæ; dyspep-  
sia; diarrhœa; amenorrhœa; atoni-  
ca; chlorosis.

DOS. *pulveris* : Drach. j cum melle vel sy-  
rupo corticis aurantii. *Decocti aut me-  
lius infusi* : Unc. j ad ℥j aquæ.

PRÆP. Extractum; tinctura dosi ℥℥ ter-  
quaterve, tempore apyrexiae.

GLADIOLUS COMMUNIS. Radix.

Variet. : A. Flore rubro. B. Flore incarnato. c. Flore albo.

CL. Triand. O. Monog. In locis nemorosis.

OF. *Radix victorialis rotundæ.*

QUAL.

VIRT. Aphrodisiaca?

USUS.

GLECOMA HEDERACEA. Herba.

CL. Didyn. O. Gymnops. Perennis.

OF. *Hedera terrestris. g. Lierre terrestre. h. Yedra terrestre.*

QUAL. Sapor amaricans ; subacris.

VIRT. Espectorans ; roborans.

USUS *infusi cum lacte vel aqua* : Catarrhus atonicus ; tabes ulcerosa.

GLOBULARIA ALYPUM. Folia.

CL. & O. *præced.* Suffrutex ; Europ. austr. ; in sylvis saxosis.

OF. *Globularia. g. Globulaire turbith.*

h. *Coronilla de Rey o de fraile.*

QUAL. Sapor amarus.

VIRT.

USUS. Intermittentes ; obstipatio ; siphilis.

GLYCYRRHIZA GLABRA.	} Radix; suc- cus radicis expressus, et inspissatus.
_____ ECHINATA.	

CL. Diadelph. O. Decand. Perennis ; Europ. aust.

OF. *Liquiritia* ; *glycyrrhiza*. G. *Réglisse*.  
H. *Regaliz* ; *orozuz* ; *palo dulce* ; *palo duz*.

QUAL. In principio mucilaginoso-saccharino residens ; sapor dulcis , subacris ; amaricans.

VIRT. Demulcens ; expectorans.

USUS *in infuso* cum aliis. — *Succi* : *Cattarrhus* ; *paraphonia* ; *stranguria*.

PRÆP. *Succus inspissatus vulgo extractum*.

### GNAPHALIUM ARENARIUM. Flores.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.* *Perennis in colibus sterilibus.*

OF. *Stœchas citrina*. G. *Stœchas citrin*, *immortelle jaune*. H. *Estecade citrino*.

QUAL. Odor suaveolens , moschum quoddammodo referens ; sapor aromaticus , substypticus.

VIRT.

USUS.

### GNAPHALIUM DIOICUM. Flores.

OF. *Pescati*. G. *Pied de Chat*. H. *Nafalio*.

QUAL. Substyptica.

VIRT. Eadem ac præced.

### GOSSYPIUM HERBACEUM. } Lana semen Aliæque SPECIES. } circumdant.

CL. *Monadelph. O. Decandr.* *Ind. orient. et occident.*



VIRT. Præstans : stimulans ; sudorifica ; alterans. *Extracti* errhina.

usus. Syphilis ; arthritis vaga ; arthrodynia rheumatica et arthritica ; morbi pulmonum atonici ; leucorrhœa ; morbi cutanei ; podagra atonica , retrocedens.

DOS. *Ligni rasi vel corticis ligni* : In decocto unc. j ad ℥ij aquæ coct. ad colat. ℥j. *Gummi-resinæ* : Gran. x-xx-drach. j forma pulveris, vel in alcohole diluto soluta.

PRÆP. Gummi-resina ; extractum ; tinctura ; oleum volatile.

## GUAJACUM SANCTUM.

VIRT. eadem ac Guajaci officinalis.

GUILANDINA MORINGA. Lignum ; fructus ; oleum fructus.

CL. *Decand. O. Monog.*

*Arborea ; Afric.  
et Ind. orient.*

An lignum Nephriticum et oleum Behen ex hac planta proveniunt?

OF. *Lignum nephriticum* : *Nuces behen* s. *been* s. *balani myrepsicæ*. s. *glandes unguentariæ*. c. *Bois Néphrétique?*  
H. *Leño Nefrítico*.

QUAL. *Ligni* : Flavo-palescens ; cæruleo tingens ; sapor subacris , amaricans.

VIRT. *Fructus* : Mucilaginosus , oleosus. *Olei fructus* : Pinguis , tardissime rancescens.  
usus *ligni* : Nephritis calculosa ? Psora.

PRÆP. Tinctura ; oleum fixum *Behen*  
dictum.

GUMMI-RESINÆ. Seu extractivo-resinæ.

GUMMI-RESINA ALOES.

*Vide Aloe perfoliata.*

N. B. Aloë *socotrina*, maxima parte principio extractivo, et paucò solum resinoso; *hepatica* anatica fere portione horum principiorum constat.

GUMMI-RESINA AMMONIACUM.

Obscura.

An umbellifera?

*Agypt.*

OF. *Gummi ammoniacum.* G. *Gomme ammoniac.* H. *Goma amoniaco.*

QUAL. Odor alliaceus, ingratus; sapor nauseosus, amarus, acris.

VIRT. Stimulans; antispasmodica; expectorans; deobstruens; *extern.* resolvens.

USUS *internus*: Asthma; expectoratio difficilis; phisconia abdominalis. *Externus*: Aceto scillitico soluta forma emplastri et unguenti: Lupia; tumores articulorum frigidi; hydarthrus.

N. B. Hoc medicamentum tumore genu dolentissimo (arthritico) affectus in me ipso primus tentavi, ejusque usu pedem ab amputatione servavi; inde hoc scopo in praxin medicam introductum fuit Londini.

Dos. Scrup. j-ij-iiij.



PRÆP. Pilulæ; emulsio; solutio in aceto  
scillæ maritimæ; emplastrum.

### GUMMI-RESINA. ASSÆ FÆTIDÆ.

*Vide Ferula assa foetida.*

### GUMMI-RESINA BDELLIUM. Obscura.

*Arabic. ; Afric.*

OF. *Bdellium*. II. *Bedelio*.

QUAL. Odor fragrans; sapor amarus.

VIRT. Stimulans; deobstruens; resolvens;  
maturans.

USUS *externus*: Forma emplastri vel un-  
guenti.

### GUMMI-RESINA CAMBOGIE.

*Vide Cambogia gutta*. II. *Guta Gamba*.

N. B. Ex stalagmite cambogioide, cam-  
bogia gutta, gutæfera vera, hyperico  
baccifero, aut pneumonanthis specie  
promiscue desumi creditur.

### GUMMI-RESINA CARANNA. Obscura.

An palmæ species?

*Amer. merid.*

OF. *Carannæ gummi*. G. *Caragne*. II.  
*Caraña*.

QUAL.

VIRT. Stimulans; resolvens; maturans.

USUS *externus*: Tumores frigidi.

### GUMMI-RESINA CATACHU.

*Vide Mimosa Catechu*.

OF. *Terra Japonica*; *succus Japonicus*;  
*catechu*. G. *Cachou*. II. *Cato*.

GUMMI-RESINA EUPHORBIAE.

*Vide Euphorbia officinalis.*

GUMMI-RESINA GALBANUM.

*Vide Bubon galbanum.*

GUMMI-RESINA GALDA. Obscura.

OF. *Gummi galda*. H. *Galda*.

QUAL. Odor et sapor resinæ amyr. elemiferæ.

VIRT. Stimulans; expectorans; resolvens.

USUS.

GUMMI-RESINA GUAJACI.

*Vide Guajacum officinale.*

GUMMI-RESINA HEDERAE.

*Vide Hedera helix.*

GUMMI-RESINA JUNIPERI.

*Vide Juniperus lycia.*

OF. *Olibanum*, *Thus*. H. *Incienso*?

GUMMI-RESINA KIKEKUNEMALO.

Obscura.

OF. *Kikekunemalo gummi*.

QUAL. Sapor subacris, resinosus.

VIRT. Antispasmodica; nervina; resolvens.

USUS.

GUMMI-RESINA KINO.

Obscura.

*Africana.*

OF. *Gummi kino*, s. *gummi rubrum Gambiense*.

QUAL. Eximia: styptica; extractivo-resinosa.

VIRT. Adstringens; roborans; antiseptica.

USUS *pulv. vel infusi intern. & exten.*:

Hæmorrhagiæ; hæmorrhœæ; blenor-  
rhœa; diarrhœa. *Amaris juncta*: In-  
termittentes.

nos. *pulv.* ʒj - jʒ. Pro. infuso ʒʒ ad ʒij  
aquæ, cujus unc. ij - iij ter quaterve  
de die.

PRÆP. Tinctura cum alcohole diluto para-  
ta ʒiʒ pro dosi.

### GUMMI-RESINA LACCA.

*Vide Ficus indica.*

*Ind. orient.*

OF. *Gummi Lacca.*

### GUMMI-RESINA LOOK.

Obscura.

OF. *Look gummi.*

QUAL. Potissimum resinosa.

VIRT. Stimulans; resolvens.

USUS.

### GUMMI-RESINA LUTEA.

Obscura.

QUAL.

*Novæ Hollandiæ.*

VIRT.

USUS Dysenteria; alvi profluvia.

### GUMMI-RESINA MYRRHA.

Obscura.

*Vide Laurus myrrha.*

*Arborea; Littoris merid. et orient.  
maris Rubri.*

An Mimosæ, an lauri species?

OF. *Myrrha*; *gummi myrrhæ. c. Gomme  
myrrhæ. h. Myrrha.*

QUAL. Sapor aromaticus, intense amarus, subacris.

VIRT. Stomachica; stimulans; menagoga.

USUS *internus* Myrrhæ masticatæ vel solutæ in alcohole diluto: Dispepsia; hysteria; asthma pituitosum; catarrhus; amenorrhœa atonica. *Externus*: Caries; ulcus; fistula; gangræna; cynanche atonica; laxitas gingivarum; aphta.

DOS. Gran. x-ðij.

PRÆP. Tinctura. Drach. ß-j pro dosi.

GUMMI-RESINA OLAMPI. Obscura.  
Americ.

OF. Olampi gummi.

QUAL.

VIRT.

USUS

GUMMI-RESINA OPOPANACIS.

*Vide* Pastinaca opopanax.

GUMMI-RESINA PAPAVERIS.

*Vide* Papaver somniferum.

OF. Opium. — VETERIBUS. *Lachryma papaveris*.

GUMMI-RESINA RAKASIRA. Obscura.

An balsamum?

OF. *Rakasira balsamum*.

QUAL. Sapor subamarus, balsamicus.

GUMMI-RESINA SAGAPENUM. Obscura.

OF. *Gummi sagapenum*. s. *serapinum*.  
Africana.

QUAL. Odor alliaceus; ingratus; sapor acris; nauseosus, amaricans.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica, menagoga; deobstruens; resolvens.

usus. Hysteria; amenorrhœa atonica; tumores frigidi; physconia abdominalis. Forma pulveris vel solutionis in alcohole diluto.

DOS. Gran. x-xx-xxx.

### GUMMI-RESINA SARCOCOLLA.

An ex Penea sarcocolla? *Vide* Penea. OF. *Gummi sarcocolla*. H. *Sarcocolla*.

QUAL. Sapor nauseosus, amaro-dulcis, acris.

GUTTÆFERA VERA. (KÆNIC). Succus gummi-resinosus, ex cortice trunci aut ex foliis et ramulis fractis promanans (*vulgo* gummi-gutta dictus).

*Arborea; Siamensis, Zeylonica.*

OF. *Gummi-gutta*. s. *gummi gambogia*. H. *Guta gamba*.

N. B. *Vide* etiam *Hypericum* et *Cam-bogia*.

### GYPSOPHILA STRUTHIUM.

Radix.

CL. *Decand.* O. *Digyn.*

QUAL. Saponacea.

H.

HÆMATOXYLUM CAMPECHIANUM.

Lignum.

CL. *Decand.* O. *Monog.*

*Arborea; Amer. merid.*

OF. *Lignum campechianum. s. Campechense. G. Bois de campêche. H. Palo campeche.*

QUAL. Tinctoria; sapor stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS *decocti vel extracti*: Diarrhœa; sub finem dysenteriae.

DOS. Unc. ij ad ℥ij aquæ coctæ ad ℥j.

PRÆP. Extractum gran. x-xl pro dosi.

HEDERA HELIX. Folia; baccæ; succus gummi-resinosus incisione corticis obtentus, concretus.

CL. *Pentand.* O. *Monog.*

*Fruticosa.*

OF. *Hedera arborea; gummi hederæ.*

H. *Hiedra arborea.*

QUAL *foliorum*: Sapor amarus, stypticus, nauseosus. *Baccarum*: Sapor amarus, acidus. *Gummi-resinæ*: Odor et sapor leviter aromaticus.

VIRT.

USUS *infusi foliorum*: Atrophia infantum; Rhachitis; ozæna; ulcera; epiphora; fonticuli.

HEDYOTIS AURICULARIA.

Herba.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.*

*Frutic. Zylonica.*

Tom. I.

QUAL. Odor fragrans.

VIRT.

USUS. Cophosis.

HELLEBORUS FÆTIDUS. Herba; folia;

succus expressus.

CL. *Polyand. O. Polyg.* Perennis; Europ. austr.

OF. *Helleborus fœtidus. s. helleboraster.*

G. *Pied de Griffon.*

QUAL. Præstans: Odor teter; sapor acris, amaricans, nauseosus.

VIRT. Emetica; cathartica; anthelminthica; deobstruens.

USUS *succi vel pulv. foliorum*: Asthma pituitosum; hypochondriasis; hysteria; physconia abdomin.; vermes.

DOSIS.

HELLEBORUS NIGER. Fibræ radicis.

CL. & O. *præced.* Perennis; alpina; Europ. austr.

OF. *Melampodium. s. helleborus niger.*

G. *Hellébore. n. Helleboro negro.*

QUAL. In principio acri cum mucilaginoso resinoso residens; odor fœtidus, nauseosus; sapor amaricans, acris.

VIRT. *Præcipue recentis*: Drastico-cathartica; diuretica; menagoga; anthelminthica; deobstruens.

USUS *extracti aut decocti (vel melius infusi)*: Amenorrhœa; melancholia, mania; morbi cutis; quartana; physconia abdomin.; hydrops; vermes; psora; achor.



DOS. Drach. iij ad ℥j aquæ vel vini infusi.  
*Pulveris gran. iij-x-xxx.*

PRÆP. Tinctura dosi 3j. Extractum dosi  
 gran. x-3℥ bis terve de die.

N. B. Cavendum ne cum radiculis adonidis vernalis, trollii Europæi, actææ spicatae, astrantiæ majoris et præcipue aconiti napelli confundatur: Priores debiliores; posterior venenata.

HELLEBORUS VIRIDIS. Fibræ radicis.

QUAL. Sapor magis amarus, nauseosus, et acrior helleboro nigro.

VIRT.

USUS.

HERACLEUM SPONDILIUM. Radix.

CL. *Pentand. O. Digyn.*

QUAL. Mucilaginoso-dulcis; subaromatica.

VIRT.

USUS.

HERNIARIA GLABRA. Herba.

CL. *Pentand. O. Digyn.*

GA. *Herniaire ou turquette. c. Hernigle, turquette. n. Mil en grana.*

QUAL. Inodora; insipida.

HERNIARIA HIRSUTA.

VIRT?

*Annua.*

HIBISCUS ABELMOSCHUS.

CL. *Monadelph. O. Poliand.*

Semen.

*Finitiosa;  
Asatica.*

OF. *Semen abelmoschi. s. grana moschata. g. Graine de musc; herbe à la poudre de Chypre. h. Granos moscados.*

QUAL. Odor ambrosiacus.

VIRT.

USUS. Cosmeticus : Tinea.

**HIERACIUM PILOSELLA.**

Herba.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.*

Perennis.

OF. *Herba auriculæ muris. h. Pelosilla, oreja de raton.*

QUAL. Lactescens ; sapor amarus.

VIRT. Adstringens.

USUS. Hernia ; diarrhœa ; psora ; herpes.

**HORDEUM DISTICHON.** Semen ; semen excorticatum ; maltum.

CL. *Triand. O. Digyn.*

Cereale ; annuum

OF. *Semen hordei : hordeum perlatum ; maltum. g. Orge. h. Cebada.*

QUAL. mucilaginoso ; farinacea.

VIRT. *seminis* : Demulcens ; emolliens ; nutriens. *Malti* : Antiseptica.

USUS *decocti malti* : Scorbutus.

PRÆP. Cerevisia ; alcohol ; acetum.

**HORDEUM VULGARE.**

Semen.

h. *Cebada.*

USUS idem ac prioris.

**HUMULUS LUPULUS.**

Strobili.

CL. *Diœc. O. Pentand.*

Perennis.

OF. *Lupulus*. G. *Houblon*. H. *Hombrecillo*.

QUAL. Odor grate aromaticus, nidorosus; sapor amarus.

VIRT. Narcotica; stomachica.

USUS. Luxatio; alopecia? *Semin.* obstipatio.

HYMENÆA COURBARIL. Resina ex cortice et radice arboris exsudans.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea; Brasiliensis.*

OF. *Gummi seu resina anime*. H. *Anime*.

QUAL. Subflavescens; pellucida; odor fragrans; sapor resinosus.

VIRT. Nervina.

USUS. Contractura; paralysis.

HYOSCIAMUS ALBUS. Folia; semina.

CL. *Pent.* O. *Monog.* *Annua vel biennis.*

H. *Beleño*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac sequentis sed mitior.

USUS *extracti*: Amaurosis; cataracta.

HYOSCIAMUS NIGER. Herba, folia recentia.

CL. & O. *præced.* *In desertis pinguibus.*

OF. *Hyosciamus*. G. *Jusquiame*. H. *Beleño negro*.

QUAL. Venenata: In principio narcotico residens; subinsipida; odor virosus.

VIRT. Narcotica; sedativa; antispasmodica; resolvens.

USUS. Paralysis; varix ani; hæmorrhagiæ

ab irritatione; palpitatio; convulsio; epilepsia, mania. *Externe* forma cataplasmatiſ: Scirrhus.

*N. B.* Loco opii, præcipue ubi obſt-  
patio uſum opii contriandicat.

PRÆP. Extractum foliorum.

DOS. Extracti gran. ſſ-ij-xx.

## HYPERICUM BACCIFERUM.

———— GUTTIFERUM (RICHARD).

Quidam gummi reſinam, *gummi-gutta*  
dictam, ex hac planta derivant.

CL. *Potjadolph. O. Icosand. Cayenn.*

## HYPERICUM PERFORATUM. Summi- tates florentes.

CL. & O. præced.

*Perennis.*

OF. *Hypericum. c. Millepertuis ordinari-*  
*re. n. Hipericon.*

QUAL. Odor graveolens.

VIRT. Reſolvens; anthelminthica.

USUS *infusi.* Tabes pulmonalis; hæmopty-  
ſis; hæmaturia; vermes.

## HYSSOPUS OFFICINALIS.

*Herba.*

CL. *Didyn. O. Gymnosp.*

*Suffruticosa  
hirsuta.*

OF. *Herba hyssopi. c. Hyssope. n. Hi-*  
*sopo.*

QUAL. In oleo volatili cum principio ex-  
tractivo amaro reſidens; odor nidoro-  
sus; ſapor amarus, ſubaromaticus.

VIRT. Stomachica; leniter stimulans; expectorans resolvens.

USUS *infusi*: Morbi pulmon. pituitosi; echymoma.

## J.

JASMINUM OFFICINALE. Flores.

CL. *Diandr. O. Monog.* *Arborea;*

OF. *Jasminum. G. Jasmin. H: Jazmin.*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT. Narcotica; sedativa.

USUS.

PRÆP. Oleum fragrans infusione paratum.

N. B. Flores nyctanthis et Philadelphi Coronariæ odorem jasmino similem largiuntur.

JATROPIA CURCAS. Semen.

CL. *Monæc. O. Monadelph.* *Arborea; Americæ meridion.*

OF. *Ricinus major; ficus infernalis. G.*

*Pignons d'Indes, Nois de Barbades.*

H. *Piñones de las Indias.*

QUAL. *Seminis*: oleosa. *Corticis seminum*: Venenata.

JATROPIA ELASTICA. Succus lacteus incisione arboris exstillans.

*Hevea Gujanensis. s. Peruviana. (AUBLÆT).*

CL. & O. *præced.* *Arborea; Americæ austr.*

N. B. *Ficus indica, cecropia peltata, aliaque arbores similem succum erogant.*

NATIVIS. *Caout-chouc.*

OF. *Resina elastica.* G. *Caout-Chouc*,  
*Gomme ou résine elastique.* H. *Goma elastica.*

USUS eximius ad catheteres, candellas medicatas et pessaria.

JATROPHA MANIHOT.

Radix.

NATIVIS: *Jucca*; *cassavi.*

*Amér. austr.*

G. *Manioc*, *cassave.* H. *Casave*, *tapioca.*

QUAL. *succiradicis*: Venenata acris, urens.

*Radicis siccatae*: Farinacea.

VIRT. *Rad. recent.* Drastica. *Farinae*:

Nutrients.

IGNATIA AMARA. *Vide Strychnos.*

CL. *Pentandr. O. Monog.*

ILEX AQUIFOLIUM.

Folia.

CL. *Tetrand. O. Tetragyn.*

*Fruticosa*; *Eu-*

*rop. austr. in locis umbrosis, siccis.*

OF. *Agrifolium.* G. *Houx*, *Chene vert.* H. *Acebo.*

QUAL. In principio amaro-adstringente cum mucilagino-resinoso residens: sapor mucilaginoso-amaricans, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; antiseptica.

USUS *decocti*: Rigiditas articulorum post podagram remanens? Intermittentes rebelles; dyspepsia.

DOSIS *foliorum concisorum*: Unc. j ad ℥j aquæ.

## ILEX CASSINE.

Folia.

CL. & O. *præced.**Arborea ; Carolin. Virgin.  
Florid.*OF. *Folia cassinæ. s. Apalachines para-  
guay. g. Apalachine. h. Acébo de la  
Carolina.*

QUAL. Sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. Stomachica ; stimulans ; expectorans.  
*Recentium : Emetica.*ILLICIUM ANISATUM. Fructus; (semen  
cum Capsulis.)CL. *Polyandr. O. Polyg.**Arborea ; Asiat.  
Chinens.*OF. *Semen anisi stellati ; badian. g. Anis  
de la Chine. h. Anis estrellado.*QUAL. In oleo volatili residens ; odor fra-  
grans, aromaticus ; sapor aromatico-dul-  
cis instar anisi.VIRT. Stimulans ; stomachica ; carminati-  
va ; expectorans.USUS *pulveris vel infusi : Morbi pulmo-  
num atonici. Semen infuso Theæ addi-  
tum, idem magis gratum stomacho  
reddit.*DOS. *pulveris gran. xxx. Infusi : drach. j  
ad ℥ j aquæ.*

## IMPERATORIA OSTRUTHIUM. Radix.

CL. *Pentand. O. Digyn.**Perennis ; alpina,  
Europ. austr.*OF. *Imperatoria. g. Imperatoire. h. Im-  
peratoria.*



QUAL. Præstans : In oleo volatili et principio resinoso residens; odor fragrans; sapor amaro-acris, aromaticus calidus.

VIRT. Stimulans; carminativa; menagoga; sialagoga.

usus Amenorrhœa atonica; dyspepsia; colica flatulenta; paralysis; intermittentes; serpigio; sterilitas.?

DOSIS *pulveris* : Gran. x-xxx.

## INDIGOFERA TINCTORFA

CL. *Diadelph. O. Decandr.*

Fecula.

*Frutic; Ind. et Afric.*

OF. *indigo. G. Indigo, Anil. H. Añil.*

QUAL. Cærulea; tinctoria.

VIRT. Phtiriaca.

usus Diarrhœa; lochia nimia?

## INULA DYSENTERICA.

Herba.

CL. & O. *præced.*

*Perennis; in fossis siccatis.*

OF. *Herba conyzæ.*

QUAL. Odor debilis; sapor subacris.

VIRT?

usus Dysenteria; psora.

## INULA HELENIUM.

Radix.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.*

*Perennis; Europ. austr.*

OF. *Enula campana. s. Helenium. G. Inula campana; aunée. H. Enula campana; Raiz del Moro.*

QUAL. Præstans: In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans, mucilaginosus.

VIRT. Stimulans, angelicam æmulans, expectorans; stomachica, alterans; anthelminthica.

USUS *pulveris & tincturæ*: Dyspepsia; cachexiæ; tussis: asthma pituitosum; physconia abdomin.; psora; hæmorrhoides mucosæ.

DOSIS. Drachm. semis-unam.

PRÆP. Tinctura; conditum; extractum.

## IRIS FLORENTINA.

Radix.

CL. *Triand. O. Monog.*

*Perennis; Italiæ.*

OF. *Iris Florentina. G. Iris de Florence.*

*H. Lirio de Florencia.*

QUAL. In acri corrosivo residens; siccatione avolans; odor fragrans instar violæ.

*Radicis recentis*: sapor acris amaricans.

VIRT. *recentis*: Cathartica; diuretica; expectorans; errhina.

USUS.

DOSIS.

## IRIS FÆTIDA.

Radix.

CL. & O. *præced.*

*Perennis; Europ. austr.*

OF. *Spathula fætida. s. xyris. G. Glayeul puant.*

QUAL. Eximia: Nigra; odor foetidus, ter; sapor acris, ingratus.

VIRT. Deobstruens; diuretica; narcotica; antispasmodica; cathartica.

USUS Histeria; scrophula; hydrops.

DOSIS  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

## IRIS GERMANICA.

Radix recens.

CL. & O. *præced.**Perennis in sylvis.*OF. *Iris nostras. G. Fleur de lys. H. Lirio de Alemania.*QUAL. *Radicis recentis*: In acri volatili residens; Sapor acris, amarus, nauseosus. *Siccatae*: farinacea.VIRT. *recentis*: Subemetica; diuretica; errhina; expectorans; menagoga.

USUS.

## IRIS PSEUD-ACORUS. Radix; succus radicis expressus.

CL. & O. *præced.**Perennis; ad litora fluxionum et lacuum.*OF. *Acorus palustris; pseudoacorus; iris palustris; gladiolus luteus. G. Flambe, Acorus faux. H. Falso acoro.*QUAL. *recentis*: In odora; sapor acris, substypticus.VIRT. *succi*: Diuretica. *Radicis*: adstringens.

USUS Hydrops; stomacace.

DOSIS *succi*: Drach. j. — Unc. semis.

## IRIS TUBEROSA.

Radix.

CL. & O. *præced.**Syriae, Arab.*G. *Hermodacte faux.*

An radix Hermodactili officinalis?

QUAL. Inodora; acris, dulcescens.

VIRT. Cathartica; alterans.

USUS Amaurosis; arthrodynia rheumatica.

DOS. 3 ij.

**JUGLANS REGIA.** Cortex viridis fructus immaturi; putamen et dissepimentum nucum.

CL. *Monæc.* O. *Polyand.* *Arborea.*

OF. *Nuces juglandes immaturæ.* G. *Ecorce verte des noix.* H. *Nueces.*

QUAL. *Corticis & putaminis:* Odor graveolens; sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; anthelminthica.

USUS *decocti:* Syphilis inveterata; lepra; vermes.

DOSIS: ℥ j ad ℥ xx aquæ ad colat. ℥ x.

PRÆP. Extractum 3℔-j: vermes infantum.  
Rob: angina.

**JUNIPERUS COMMUNIS.** Baccæ; lignum; resina.

CL. *Diœc.* O. *Monadelp.*

OF. *Juniperus;* gummi seu resina sandaraca. G. *Genevrier ordinaire;* gomme sandarac. H. *Enebro.*

QUAL. *Baccarum:* in oleo volatili copioso, et principio resinoso residens; odor fragrans; sapor aromatico-dulcis. — *Ligni:* Eadem, sed debilior. *Resinæ:* Sapor resinusus.

VIRT. *Baccarum, ligni & resinæ:* Stimulans; diuretica; alterans; carminativa. *Decocti & extracti:* Minus stimulans; magis diuretica.

USUS *decocti aliorumque præparatorum:*

Cophosis? hydrops; asthma; catarrhus;  
morbi cutis. *Olei*: vermes.

*Dos. pulv.* Drach. ℥. In infuso drach iij-iv  
ad ℥ j aquæ vel vini.

*PRÆP. Ligni & baccarum*: Decoctum; in-  
fusum. *Baccarum*: Extractum; rob;  
aqua stillatitia; oleum volatile; alcohol.

JUNIPERUS LYCIA.

————— THURIFERA.

} Gummi-re-  
sina.

*CL. & O. præced.*

*Arborea; Litteris merid. et  
orient. maris Rubri.*

*OF. Gummi Olibani. s. Olibanum; thus.  
c. Encens. n. Incienso.*

*QUAL.* Flavescens; pellucida; odor gratus;  
sapor amaricans.

*VIRT.*

*USUS.* Leucorrhœa? Ad suffimigia.

JUNIPERUS SABINA.

Folia.

Variet. A. cupressifolia.

*CL. & O. præced.*

*Fruticosa; hortensis.*

*OF. Sabina. c. Sabine. n. Sabina.*

*QUAL.* Præstans: in oleo volatili copioso  
residens; odor hircosus; sapor acris,  
amaricans.

*VIRT.* Stimulans; corrodens; menagoga;  
antispasmodica; diuretica; depilans; an-  
thelminthica.

*USUS internus*: Amenorrhœa atonica. *Ex-  
ternus forma* pulveris, decocti, infusi,  
aut cataplasmatibus: Caries; tinea; psora;  
ulcera fungosa; verrucæ; Condyloma;  
odontalgia.

DOS. *pulveris* : Gr. v-xv.

PRÆP. Aqua stillatitia ; oleum volatile ;  
extractum.

## K.

KAEMPFERIA ROTUNDA. Radix.

CL. *Monand.* O. *Monog.* Perennis ; Ind. orient.

OF. *Zedoaria.* G. *Zedoire.* H. *Zedoaria.*

QUAL. In oleo volatili residens ; odor sub-  
fragens ; sapor subacris ; amaricans,  
aromaticus.

VIRT. Stimulans ; calefaciens ; stomachica ;  
anthelminthica.

USUS *pulveris* (*præcipue zeylonici*) : Dys-  
pepsia ; pyrosis ; febres intermittentes,  
atonicæ ; vermes.

DOS. Scrup. j.

PRÆP. Aqua stillatitia ; alcohol ; tinctura.

KAJEPUT OLEUM.

*Vide* Melaleuca leucadendron.

KIKEKUNEMALO.

*Vide* Gummi-resina kikekunemalo.

KINO. *Vide* Gummi-resina kino.

## L

LABRADIA PRURIENS.

——— URENS. *Vide* Dolichos.

PAIVA ex autopsia ad hoc novum genus  
refert Dolichum prurientem et uren-  
tem *Linn.*

LACTUCA SATIVA. Herba; semen.

CL. Syng. O. Polyg. æqual. *Annua; hortensis.*

G. *Laitue ordinaire.* H. *Lechuga.*

QUAL. Oleracea.

VIRT. Refrigerans.

USUS Culinaris.

LACTUCA VIROSA.

———— SCARIOLOLA. } Herba; succus.

OF. *Lactuca sylvestris.* G. *Laitue vireuse.*

H. *Lechuga hedionda; escarola.*

QUAL. In succo lacteo acri residens; odor teter; sapor acris, amarus.

VIRT. Sedativa; diuretica.

USUS. Hydrops; icterus.

DOS. *succi* ad mellis consistentiam inspissati, vulgo *extractum* dicti, drach. j-iv de die.

LAGOECIA CUMINOIDES. Semen.

CL. Pentand. O. Monog. *Annua; insul. Græc.*

OF. *Ammi veterum.*

QUAL. Præstans; Sapor aromaticus.

VIRT. Stomachica; carminativa.

USUS.

LAMIUM ALBUM.

Herba.

CL. Didyn. O. Gymnosp. *Annua.*

OF. *Lamium album; urtica mortua; ga-leopsis.* G. *Ortie blanche.* H. *Ortiga muerta.*

QUAL. Oleracea; odor teter.



VIRT.

USUS.

**LASERPITIUM LATIFOLIUM.** Radix.  
 CL. *Pentand. O. Digyn.* *Perennis, alpina;  
 in locis siccis.*

OF. *Gentiana alba.* H. *Comino etiopico,  
 sesali. Laserpitio de hoja ancha.*

QUAL. Præstans: sapor aromaticus, acris,  
 amarus.

VIRT. Stomachica; stimulans; diuretica.

**LASERPITIUM SILER.** Semen.  
 CL. & O. *præced.* *Alpina; in locis siccis.*

OF. *Siler montanum.* H. *Siler montano.*

QUAL. Aromatica; cumini odore et sapore  
 remissione.

VIRT. Carminativa; stomachica.

USUS Colica lochialis.

**LATHRAEA SQUAMMARIA.** Radix.  
 CL. *Didyn. O. Angiosp.* *Perennis; in locis  
 nemorosis. umbrosis.*

OF. *Dentaria major.*

QUAL.

VIRT.

**LAURUS CAMPHORA.** Substantia resi-  
 nosa volatilis, *Camphora* dicta; præ-  
 cipue ex ramis arboris sublimatione  
 parata. *Arborea; Ind. orient.*

CL. *Enneand. O. Monog.*

OF. *Camphora. G. Camphre.* H. *Alcanfor.*

QUAL. Heroica: in principio volatili res-  
dens; odor fragrantissimus; sapor acris,  
aromaticus, amaricans; simul cum sen-  
su frigoris.

VIRT. Nervina; antispasmodica; antisepti-  
ca; anthelmintica; resolvens.

USUS *internus*: Febres, et exanthemata  
atonica; cardialgia; hysteria; mania;  
nymphomania; satyriasis; (*cum sul-  
phure*) colica pictonum. *Externus*:  
Arthrodynia rheumatica; ophthalmia;  
grangræna; ulcus fungosum; morsura  
insectorum; colica spasmodica.

DOSIS. Cum saccharo trita aut mucilagine  
vel alcohole subacta; gr. v-gr. xv bis  
terve de die, ascendendo ad drach. ij.

PRÆP. Alcohol camphoratum, æther cam-  
phoratus; acetum camphorat.; acidum  
nitricum camphoratum; seu solutio  
camphoræ nitrica; oleum camphorat.  
unguentum camphoratum.

An opium est antidotum camphoræ?

N. B. An oleum volatile camphoræ Javæ,  
Sumatræ, ect. in arthrodynia arthriti-  
ca et rheumatica adeo celebre ex eadem  
arbore provenit?

LAURUS CASSIA.

Cortex; flores.

Variet Lauri cinnamomi. (THUNBERG).

OF. *Flores cassiæ; calyces cassiæ; cas-  
sia cinnamomea; cortex cinnamomi in-  
dici; folia malabathri; cassia lignea;*

*xylocassia. g. Cannelle de Coromandel.*

*h. Canela de Manila.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor acris, aromaticus; debilior sequente.

VIRT. Stimulans; calefaciens.

USUS Paralysis linguæ.

N. B. Flores supplere possunt corticem cinnamomi.

PRÆP. Oleum volatile.

## LAURUS CINNAMOMUM.

Cortex.

CL. & O. præced.

*Arborea; Zeylonica.*

OF. *Cinnamomum verum. s. acutum g. Cannelle. h. Canela fina.*

QUAL. Heroica: in oleo volatili residens; odor intense fragrans; sapor dulcis, dein subacris, aromaticus, gratus.

VIRT. Cardiaca; stimulans; calefaciens; roborans; antispasmodica; stomachica; carminativa; aphrodisiaca.

USUS Dyspepsia; anaphrodisia; morbi atoniei.

DOS. *pulveris*: Gr. x-xxx.

PRÆP. Infusum aquosum vel vinosum frigidum; aqua; alcohol; tinctura; oleum volatile.

## LAURUS CULILAWAN.

Cortex.

CL. & O. præced.

*Arborea; Amboin. et insul. Mollucc.*

OF. *Cortex culilawan; cariophiloides. h. Culilawan.*

QUAL. Præstans: sapor aromaticus, caryophyllum aromaticum æmulans, mucilaginosus, substringens.

VIRT. Calefaciens; roborans; carminativa; stomachica.

USUS. Paralysis; colica flatulenta; dyspepsia.

LAURUS MYRRHA. (LOUVEIRO). Cortex; gummi-resina.

CL. & O. præced. *Arborea; China, Conchinchina.*

An gummi-resina myrrha ex hac arbore?

LAURUS NOBILIS. Folia; Baccæ.

CL. & O. præced. *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Laurus. G. Laurier franc, baïes de laurier. H. Laurel.*

QUAL. Præstans; In oleo volatili cum oleo fixo mixto residens; sapor aromaticus, subacris, amaricans.

VIRT. Calefaciens; stomachica; carminativa; resolvens; phthiriaca.

USUS *In—& externus*; Amenorrhœa; dyspepsia; chlorosis; hysteria; colica lochialis. *Olei*: Tumores frigidi; psora; pediculi.

PRÆP. Oleum laurinum.

LAURUS PECURIM? (BERGIUS).

CL. & O. præced. *Fructus. Arborea; Brasiliæ.*

OF. *An faba pechurim ex hac arbore?*  
*H. Pinoli.*

QUAL. In oleo volatili cum oleo unguino-

so mixto residens; odor fragrans; sapor grate amaricans, aromaticus, substyp-ticus.

VIRT. Stimulans; stomachica; subastrin-gens.

USUS. Sub finem dysenteriae; diarrhoea, tormina ventris.

DOS. *pulveris* : Gr. x cum saccharo.

LAURUS SASSAFRAS. Radix; cortex  
radicis.

CL. & O. *præced.*

*Arborea; Virginica.*

OF. G. *Sassafras*. H. *Sasafras*.

QUAL. Præstans: In oleo volatili copioso residens; odor fragrans; sapor aroma-ticus, subacris, subdulcis.

VIRT. Stimulans; diuretica; sudorifica.

USUS *decocti vel infusi*: Cachexiæ; Syphi-lis? Arthrodynia arthritica et rheuma-tica; psora.

PRÆP. Oleum volatile.

LAVANDULA SPICA. Flores

CL. & O. *præced.*

*Suffruticosa; Europ  
austr.; hort*

OF. *Lavendula*. G. *Lavande*. H. *Espliego*;  
*alhucema; lavanda*.

QUAL. Præstans: In oleo volatili copioso residens; odor fragrans; sapor amarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans, nervina; resolvens.

USUS. Paralysis; aphonia; balbuties.

PRÆP. Oleum volatile ; aqua ; alcohol ;  
tinctura lavandulæ composita Ph. Lond.

# LAVANDULA STÆCHAS. Flores.

CL. & O. præced. Suffrutuosa ; Europ. austr.

OF. *Stœchas Arabica* ; *stœchas spica*. G.  
*Stêchas arabique*. H. Cantueso.

QUAL. fragrans, præcedenti graveolentior.

VIRT. et USUS. præced.

# LAWSONIA INERMIS. Radix.

GL. *Octand*. O. *Monog*. Orientalis.

OF. *Alcanna vera*. s. *Orientalis*.

QUAL. Radix rubra ; folia lutea.

VIRT. Tinctoria ; adstringens

USUS.

# LEDUM PALUSTRE. Folia cum floribus.

CL. *Decand*. O. *Mong*. Fruticosa ; in locis humidis, nemorosis.

OF. *Rosmarinus sylvestris*. G. *Lede* ; *ro-*  
*marin sauvage*. H. *Lodano* , *Leda*  
*Xaguarzo*.

QUAL. Heroica : in oleo narcotico cum ex-  
tractivo amaro adstringente residens ;  
odor nidorosus ; sapor amaricans, as-  
tringens.

VIRT. Narcotica ; sudorifica ; phthiriaca.

USUS infusi : Lepra ; psora ; tinea ; pertusis.

insecta.

DOS. : Unc. ℥-j. ad ℥j aquæ, lactis vel se-  
ri lactis infusi per horam, libram se-  
mis-unam de die sumend.

## LEONURUS CARDIACA.

Herba.

Biennis.

CL. *Didyn. O. Gymnosp.*OF. *Cardiaca. g. Agripaume, Cardia-*  
*que. n. Cardiaca.*

QUAL. Amara.

VIRT.

USUS Hysteria.

## LEONTODON TARAXACUM.

Radix.

Perennis.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.*OF. *Taraxacum; dens leonis. g. Pissen-*  
*lit; dent de lion. n. Amargon, tara-*  
*xacon; diente de leon.*QUAL. In succo lactescente, amaro, salso  
residens.

VIRT. Diuretica; deobstruens.

USUS *Decocti vel extracti radiceis*: Phys-  
conia abdomin.; icterus; quartanæ re-  
belles.

DOS. Unc. ij-iii ad ℥ j aquæ.

PRÆP. Succus recens expressus; extractum.

## LEPIDIUM IBERIS.

Herba.

CL. *Tetradyn. O. Silicul.*

Annuæ; Europ. austr.

QUAL. Sapor acris.

VIRT. Diuretica; alterans.

USUS Febres intermittentes; cachexiæ.

## LEPIDIUM SATIVUM.

Herba recens;

semen.

CL. &amp; O. præced.

Annuæ.

OF. *Nasturtium hortense. g. Cresson ale-*  
*nois, Nasitord. n. Mastuerzo.*



QUAL. *Herbæ & seminum*: In principio acri leniori residens.

VIRT. Diuretica; antiscorbutica.

USUS. Scorbutus; hydrops; achor.

### LICHEN APHTHOSUS.

CL. *Cryptog. O. Algæ.*

OF. *Muscus cumatilis.*

QUAL. Tetra, mephitica.

VIRT. Cathartica; anthelminthica.

USUS *infusi vel decocti*: Vermes; aphtha.

DOS. *Pulveris* infantibus gr. xij mane et vesperi.

### LICHEN CANINUS.

OF. *Herba musci canini.*

QUAL. Tetra, mephitica.

VIRT. Alterans.

USUS. Hydrophobia? Mania; asthma convulsivum (BUTTER).

### LICHEN COCCIFERUS. Ad radices arborum in sylvis pineis.

CL. & O. *præced.*

OF. *Muscus pyxidatus; herba ignis.*

QUAL. Sapor Substypticus.

VIRT. Subadstringens.

USUS Pertussis?

### LICHEN ISLANDICUS.

CL. & O. *præced.*

*Perennis; alpina; in locis siccis, petrosis, nemorosis.*

OF. *Muscus Islandicus. G. Lichen d'Islande. H. Liquen Islandico.*

QUAL. præstans: amara, subadstringens, mucilaginoso.

N. B. Amarities coctione et siccitate multum minuitur.

VIRT. Nutriens; eccoprotica.

USUS Tabes; hæmoptysis; tussis.

DOSIS. Unc. ℥ ad ℥ j ℥; aquæ vel lactis decoct. ad ℥ j.

### LICHEN PLICATUS.

OF. *Musci arborei seu quercini herba.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS Hæmorrhagiæ.

### LIHEN PULMONARIUS.

OF. *Herba pulmonariæ arboreæ. G. Lichen Pulmonaire. H. Pulmonaria arborea.*

QUAL. Sapor amarus, salsus.

VIRT.

USUS Tussis; icterus.

### LICHEN ROCCELLA.

CL. & O. præced. *Insular. archipel et Canariens.*

OF. *Roccellæ herba. G. Orseille. H. Orchilla.*

QUAL. Subsalsa, subacris; tinctoria rubra.

VIRT.

USUS Tinctorius.

PRÆP. Pigmentum vulgo *Lacmus* dictum.

### LIGNUM ALOES. *Vide Aloëxylum.*

OF. *Lignum agallochi. s. Apalathi. s. Calambac.*

## LIGUSTICUM LEVISTICUM. Radix;

Semen; herba.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Perennis; alpina.*OF. *Ligusticum; levisticum.* G. *Liveches;*  
*semences d'ache.* H. *Levistico.*QUAL. Odor teter; sapor aromaticus, acris,  
calidus, angelicam archangelicam æmu-  
lans. *Semina* urinam nigro colore in-  
ficiunt.VIRT. Stimulans; carminativa; menagoga;  
lactifera.

USUS.

LILIUM CANDIDUM. Radix; petala re-  
centia.CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Perennis; hortensis.*OF. *Radix & flores lilii albi.* G. *Lys.* H.  
*Azucena.*QUAL. *Petalorum recentium:* Odor fra-  
grans. *Radicis:* sapor mucilaginosus.

VIRT.

USUS.

## LINNÆA BOREALIS.

Herba.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.**Perennis; Europ.*  
*septentr.*QUAL. *Floris:* Odor fragrans. *Herbæ:*  
Sapor amaricans, substypticus.

VIRT. subadstringens; Diuretica.

USUS. *infusi* in lacte vel aqua: Arthrody-  
nia rheumatica; psora.

## LINUM CATHARTICUM.

Herba.

CL. *Pentand.* O. *Pentag.**Annua.*OF. *Linum catharticum.* G. *Lin purgatif.*  
H. *Lino purgante.*QUAL. Sapor subsalsus, amaricans, nau-  
seosus.

VIRT. Cathartica.

USUS. Hydrops; nephritis.

DOS. Drach. ij. herbæ siccatae ad ℥j aquæ  
pro infuso.

## LINUM USITATISSIMUM.

Semen.

CL. & O. *præced.**Annua.*OF. *Semen lini.* G. *Grains de lin.* H. *Lino*  
*comun.*

QUAL. Mucilaginosa; oleosa.

VIRT. Involvens; emolians.

USUS *decocti vel infusi*: Dysuria; nephri-  
tis; blennorrhagia; *forma enematis*:  
tenesmus. *Farinæ* forma cataplasmatidis:  
cynanche; plegmone.PRÆP. Oleum fixum expressione frigida  
paratum.

DOS. Seminum unc. ℥-j ad ℥ ij aquæ.

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA. Bal-  
samum.CL. *Monæc.* O. *Polyand.**Arborea; Virgin.*  
*Mexic.*OF. *Storax; styrax liquida.* G. *Liquidam-*  
*bar, Copalme.* H. *Liquidambar.*QUAL. Liquido-tenax; coloris grisei; odor  
fragrans; sapor acris, aromaticus.

VIRT. Stimulans; calefaciens.

USUS *externus*: Paralysis; psora.

# LITHOSPERMUM OFFICINALE. Semen.

CL. *Pentand. O. Monog.*

*Perennis.*

OF. *Lithospermum; milium solis. G. Gre-mil; herbe aux perles. H. Mijo del sol.*

QUAL. Insipida; inodora.

VIRT. ?

USUS.

# LOBELIA SYPHILITICA.

Radix.

CL. *Syng. O. Monog.*

*Perennis; Virginica.*

OF. *Lobelia. G. Cardinale bleu. Lobelie antivenerienne. H. Lobelia.*

QUAL. Lactescens; acris; nauseosa.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica.

USUS *decotti*: Syphilis?

DOS.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$  ad aquæ  $\mathfrak{f}\mathfrak{ss}$  xij. coquendo ad  $\mathfrak{f}\mathfrak{ss}$  viij.

# LOBELIA LONGIFLORA.

———— TUPA.

} Radix.

QUAL. Aciores præcedenti.

# LONICERA DIERVILLA.

Stipites.

CL. *Pentand. O. Monog.*

*Fruticosa; Canadensis.*

OF. *Diervilla.*

QUAL. Odor et sapor nauseosus.

VIRT.

USUS *Canadensium*: Syphilis; blennorrhagia; dysuria.

# LONICERA PERICLYMENUM. Herba;

stipites et flores.

OF. *Caprifolium. H. Madre selva.*

QUAL. Odor et sapor ingratus.

VIRT. ?

USUS.

LONICERA SYMPHORICARPOS. Stipites.

*Fruticosa; Carolinæ.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Subadstringens.

USUS Intermittentes?

LORIODENDRON TULIPIFERA. Cortex.

CL. *Polyand. O. Polyg.* *Arborea; Amer. septentr.*

OF. *Cortex loriodendri.*

QUAL.

VIRT.

USUS In America frequens, loco *Cinchonæ* officinalis: intermittentes.

LUPINUS ALBUS.

Semen.

CL. *Diadelph. O. Decand.* *Annua; hortensis.*

OF. *Semen lupini. G. Lupin. H. Altramuz.*

QUAL. Farinacea; amara.

VIRT. Cosmetica?

USUS Vermes.

LYCOPERDON BOVISTA.

CL. *Cryptog. O. Fungi.*

OF. *Bovista; crepitus lupi. G. Vesse de Loup. H. Pede de Lobo.*

QUAL. Præstans: Styptica.

VIRT. Adstringens; obstipans.

USUS Hæmorrhagiæ; hæmorrhoids; ulcera; intertrigo.

## LYCOPERDON TUBER.

G. *Truffe*. H. *Criadillas de tierra*.

QUAL. Odor hircinus.

VIRT. Aphrodisiaca?

USUS Culinaris : anaphrodisia.

## LYCOPodium CLAVATUM.

Pollen.

CL. *Cryptog.* O. *Musci*.*In Sylvis.*OF. *Semen lycopodii ; muscus clavatus.*G. *Licopode*. H. *Licopodio en maza*.

QUAL.

VIRT. Exsiccans.

USUS Excoriatura : ad inspergendas pillulas, bolos.

## LYCOPodium SELAGO.

OF. *Muscus erectus*. H. *Selago*.

VIRT. Drastico-cathartica ; menagoga ; phthiriaca.

USUS Hydrops ; pediculi.

## LYSIMACHIA NUMMULARIA. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis ; in locis humidis, umbrosis, nemorosis.*OF. *Herba nummulariæ*. G. *Numulaire*.H. *Yerba de la moneda ; Numularia*.

QUAL. Subacida, subacris.

VIRT. Subadstringens.

USUS Leucorrhœa.

## LYTHRUM SALICARIA.

Folia ; radix.

CL. *Dodecand.* O. *Monog.**Perennis ; in locis aquaticis.*OF. *Salicaria*. S. *Lysimachia purpurea*.G. *Salicaire*. H. *Salicaria*;



QUAL. Præstans: Substyptica.

VIRT. Adstringens.

USUS Diarrhœa; dysenteria atonica; leucorrhœa; hæmoptysis.

## M.

MALVA ALCEA.

Flores.

CL. *Monadelph. O. Polyand.* In *Alpibus ad Sylvas.*

MALVA ROTUNDIFOLIA. } Herba; ra-  
 ——— SYLVESTRIS. } dix.

*Annua; ad muros et edifica.*

OF. *Malva vulgaris.* s. *Alcea.* G. *Mauve.*  
 H. *Malva.*

QUAL. Præstans: Fatua; mucilaginosa.

VIRT. Involvens; demulcens; laxans.

USUS Phlegmone; stranguria; tussis.

MARANTA GALANGA.

Radix.

CL. *Monand. O. Monog.* *Perennis; Ind. orient.*

OF. *Galanga major & minor.* G. *Galan-*  
*ga* H. *Galanga.*

QUAL. Præstans: In principio resinoso magis quam in oleo volatili residens; odor fragrans; sapor amaricans, acris, aromaticus, zingibere magis pungens.

VIRT. Stimulans; calefaciens; stomachica; menagoga. *Recent. errhina.*

USUS Dyspepsia; paralysis linguæ; colica flatulenta, et lochialis; vomitus navigantium? Singultus; vertigo; *extern.*  
*herpes.*

DOSIS Gr. x-xv.

PRÆP. Tinctura.

MARRUBIUM VULGARE. Succus recens;  
herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; ad vias  
et deserta.*

OF. *Marrubium album.* G. *Marrube blanc.*  
H. *Marrubio.*

QUAL. Præstans: odor graveolens; sapor  
subamarus, subsalsus, ingratus.

VIRT. Expectorans; menagoga; anthel-  
minthica.

usus Asthma pituitosum; icterus; chloro-  
sis; physconia abdominal.; ptyalismus  
ex hydragyro?

MATRICARIA CHAMOMILLA. Flores.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Annua.*

OF. *Chamomilla vulgaris.* s. *Nostras.* s.  
*Chamemœlum vulgare.* G. *Camomille.*

QUAL. In oleo volatili et principio extrac-  
tivo amaro residens; odor fragrans; in-  
gratus; sapor amarus.

VIRT. Leviter stimulans; antispasmodica.

usus Dyspepsia; vomitus gravidarum? car-  
dialgia; Dysenteria; colica spasmodica;  
febres; intermittentes; hysteria; dysu-  
ria? Forma balnei, enematis, cataplas-  
matis, infusi, pulveris.

DOS. *pulveris:* Drach. ℥-j. In infuso drach.  
ij-iiij ad ℥ j aquæ.

PRÆP. Aqua; oleum volatile; syrupus.

MATRICARIA PARTHENIUM. Herba.  
Flores.

CL. & O. *præced.* Perennis; in locis incultis.

OF. *Matricaria.* & *Matricaire.* H. *Matricaria.*

QUAL. Odor nidorosus, halituosus; sapor amarus.

VIRT. Antispasmodica; stomachica; menagoga; lactifuga.

USUS. *externus* forma balnei, enematis, cataplasmatis. *Internus*: colica; hystertia; dyspepsia.

MELALEUCA LEUCADENDRON. Oleum volatile ex foliis destillatione obtentum.

*Arborea; insul. Sumatra et*

CL. *Polyadelph.* O. *Polyand.* nov *Caledoniae.*

NATIVIS *cajoput dictum ex cajo arbor, et puti alba; id est, arbor epidermide alba notatus.*

OF. *Oleum cajeput.* & *L'huile de cajeput.*

QUAL. Odor intense fragrans, aromaticus.

VIRT. Stimulans; antispasmodica; carminativa; menagoga; insecta fugans.

USUS *intern.* Cardialgia sputatoria; colica flatulenta; spasmi; paralysis. *Extern.*

Anaphrodisia? Varix ani; odontalgia; paralysis linguæ.

DOS. Gutt. iij-x. Sæpius de die cum saccharo.

## MELISSA OFFICINALIS.

Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnops.**Perennis; Canariensis;  
hortensis.*OF. *Melissa citrata. s. Hortensis. g. Melisse; citronelle-melisse. h. Torongil cidrado.*

QUAL. In oleo volatili residens; fragrans odore citri; sapor aromaticus.

VIRT. Leviter stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga.

USUS *infusi*: Hysteria; palpitatio; chlorosis; amenorrhœa.

PRÆP. Infusum; aqua; alcohol; oleum volatile.

## MELISSA CALAMINTHA

Herba.

CL. & O. *præced.**Europ. austr.*OF. *Calamintha montana. g. Calament des montagnes. h. Calaminta montana.*

QUAL. Odor debilior præcedent. sapor leviter aromaticus.

VIRT. Stomachica; expectorans; resolvens.

USUS Asthma.

## MELITTIS MELISSOPHYLLUM.

Folia.

CL. & O. *præced.**Perennis.*OF. *Melissophyllum. g. Mélisse batarde.*

QUAL. Odor fragrans, gratus; sapor subamarus.

USUS *infusi*: Amenorrhœa; nephritis?

**MENISPERMUM COCCULUS.** Fructus,  
 seu nux.  
 CL. *Diœc. O. Dodecand.* *Sarmentosa; Ind. orient.*

OF. *Cocculus indicus; semen cocculi. G. Coques du Levant. H. Coca de Levante.*

QUAL. Venenata; sapor summe amarus, urens.

VIRT. Narcotica; phthiriaca.

USUS Ad necandos pisces, pediculos.

**MENTHA AURICULARIS.** Herba.  
 CL. *Didyn. O. Gymnosp.* *Ind. orient.*

QUAL. Fragrans; amara.

VIRT. Resolvens.

USUS Cophosis; tumores.

**MENTHA CERVINA.** Herba.  
 CL. & O. *præced.* *Europ austr.*

N. B. Floribus verticillatis, bracteis palmatis, foliis linearibus, staminibus corolla longioribus.

H. *Pouliot de cerf.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, gratior pulegio.

**MENTHA CRISPA.** Folia; herba.  
 CL. & O. *præced.* *Perennis; hortensis.*

OF. *Mentha crispa. G. Menthe crèpue. H. Menta rizada.*

QUAL. In oleo volatili residens: Odor fragrans; sapor aromatico-amaricans.

VIRT. Stimulans; carminativa; menagoga;  
antaphrodisiaca; resolvens.

USUS Cephalalgia; hysteria; anorexia; vomitus; colica; pertussis; satyriasis. *Externus*: Dolor artuum à spasmo; coagulum lactis in mammis; ecchinoma; tumores frigidi.

DOS. *Infusi*: Unc. j. ad ℥ j aquæ.

PRÆP. Oleum volatile; alcohol; aqua conserva; syrupus.

### MENTHA PIPERITA.

Herba.

CL. & O. *præced.* Perennis; Angliæ; hortensis.

OF. *Mentha piperitis*. G. *Menthe poivrée*.

H. *Yerbabuena de sabor de pimienta*.

QUAL. Eximia: In oleo volatili camphorino residens: Odor fragrans; sapor acris, aromaticus cum sensu frigoris.

VIRT. eadem ac præcedentis, sed fortior.

USUS Idem ac præcedentis.

PRÆP. Oleum volatile; alcohol; aqua.

### MENTHA PULEGIUM.

Herba.

CL. & O. *præced.* Perennis; Europ. austr.

OF. *Pulegium*. G. *Menthe pouliot*. H. *Poleo*.

QUAL. In oleo volatili residenes; eadem ac menthæ crispæ sed acrior.

VIRT. eadem ac menthæ crispæ.

USUS Spasmi durante menstruatione; tussis; raucedo.

### MENTHA SATIVA.

G. *Menthe*. H. *Yerbabuena*.

**MENTHA SYLVESTRIS.** Herba.  
 OF. *Menthastrum*; *mentha longifolia*. G.  
*Menthe sauvage*. H. *Mastranzo*.

**MENTHA VIRIDIS.** Herba.  
 N. B. Spicis oblongis; foliis lanceolatis,  
 nudis, serratis, sessilibus; staminibus  
 corolla longioribus.  
 OF. *Mentha spicata*. G. *Baume verte*.  
 QUAL. Eadem ac menthæ crispæ sed gratior.

**MENYANTHES TRIFOLIATA.** Folia.  
 CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; in locis  
 humidis paludosis.*

OF. *Trifolium fibrinum*. s. *Aquaticum*. s.  
*Palustre*. s. *paludosum*. G. *Trefle de  
 marais*. H. *Trifolio fibrino*.

QUAL. In principio extractivo amaro resi-  
 dens; sapor intense amarus, substypticus.

VIRT. Adstringens; roborans; anthelmin-  
 thica; diuretica; deobstruens.

USUS *infusi*, *vel extracti*: Dyspepsia;  
 chlorosis; leucophlegmatia; phisconia  
 abdomin.; icterus; asthma; arthrody-  
 nia; podagra atonica; intermittentes;  
 scorbutus; lepra; herpes; ulcus ma-  
 lignum.

DOSIS *infusi*: Unc. j ad libram j aquæ.

PRÆP. Extractum: Dosis drach. ij.

**MERCURIALIS ANNUA.** Herba.  
 CL. *Diœc.* O. *Enneand.*



OF. *Mercurialis*. G. *Mercuriale*. H. *Mercurial*.

QUAL. Suspecta.

VIRT. Cathartica; hypnotica; repellens; cosmetica.

usus Decocti pro clysmatibus; syphilis?

MESEMBRYANTHEMUM CRISTAL-  
LINUM. Herba.

CL. *Icosand*. O. *Pentag*. Annuæ.

H. *Mesembrianthemum*, *escarchada*.

QUAL. Sapor blande salinus, refrigerans.

usus succi: Dolor spasmodicus vesicæ urinariæ; dysuria; ischuria; calculus; pertussis.

dos. Unc. j-jss ad ℥ j aquæ in decocto.

MESPILUS GERMANICUS. Fructus.

CL. *Icosand*. O. *Pentag*. Arborea.

OF. *Mespilus*. G. *Nesles*. H. *Nispero*.

QUAL. Styptico-farinosa.

VIRT. Dulcis; subadstringens.

usus.

MIMOSA CATECHU. Succus extractivus,  
seu gummi-resinosus, decoctione ligni  
et inspissatione obtentus.

CL. *Polyg*. O. *Monœc*. Arborea; Ind. orient. provincie Bahar.

OF. *Catechu*. s. *Terra Japonica*. G. *Cachou*. H. *Catecu*.

QUAL. In principio extractivo resinoso adstringente residens; sapor subamarus, postea dulcescens, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS *pulveris vel tincturæ*: Diarrhœa; dysenteria atonica; hæmorrhœa. *Externus*: Ulcus laxum; relaxatio uvulæ et gingivarum; defluxio acris catarrhalis.

DOS. *pulv.* gr. x-xxx-drachm. j.

PRÆP. Tinctura, in aqua et alcohole fere æque solubilis.

MIMOSA NILOTICA.	} Gummi; et succus fructus immaturi expressus et inspissatus.
———— SENEGAL.	

OF. *Gummi arabicum*: succus acaciæ veræ seu *Ægyptiacæ inspissatus*. G. *Gomme arabique*. H. *Acacia de Egypto*. *Goma arabiga*.

QUAL. *Gummi*: Mucilaginosa; dulcis; nutriens. *Succi inspissati in aqua solubilis*: Styptica.

VIRT. *Gummi*: Involvens. *Succi*: Roborans; adstringens.

USUS *gummi internus* in solutione aquosa: Dysuria; dysenteria; paraphonia catarrhalis; ophthalmia.

MOMORDICA ELATERIUM. Radix; fructus recens; succus ejusdem extractivo-resinosus inspissatus.

CL. *Monœc.* O. *Syng.* *Europ. austr.*; annua; *hortensis, agrestis.*

OF. *Elaterium*. s. *Cucumis asininus*. G.

*Momordique sans vrilles; concombresauvage.* H. *Elaterio.*

QUAL. Utriusque: Sapor intense amarus, acris, nauseosus.

VIRT. emetica; drastico-cathartica; menagoga; diuretica.

USUS Obstipatio; hydrops; amenorrhœa; scrophula?

DOS. Radicis gr. xv-xxx.

PRÆP. Succus inspissatus, vulgo *Elaterium* dictus, dosi gr. i-iv.

### MONARDA FISTULOSA.

Folia.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Perennis; Canadensis.*

OF. *Herba monardæ.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus. amaricans.

VIRT. Nervina; stomachica; deobstruens.

USUS *infusi*: Febres intermittentes.

### MORUS NIGRA. Fructus recens; folia; cortex.

CL. *Monæc.* O. *Tetrand.* *Arborea; Europ. austr. hortensis.*

OF. *Fructus mori recentis.* G. *Murier noir.* H. *Moral negro.*

QUAL. *Fructus*: Sapor dulcis, subacidus. *Foliorum*: Stypticus.

VIRT. Refrigerans. *Folior*: Adstringens.

USUS Febres. *Corticis*: Tænia.

PRÆP. Rob; syrupus.

## MYRYCA GALE.

folia.

CL. *Dioec.* O. *Tetrand.**Fruticosa; paludosa;  
Europ. austr.*OF. *Myrtus Brabantica.* G. *Piment royal.*H. *Arrayan Brabantino.*QUAL. Luteo-tinctoria; odor nidorosus;  
sapor amarus.

VIRT. Narcotica.

USUS Psora; pediculi.

## MYRYSTICA AROMATICA. (SWARTZ).

Nux seu fructus; nucleus; integumentum  
nuclei reticulare vulgo *Macis* dictum.CL. *Monœc.* O. *Monand.**Arborea; Insul.  
Bandæ.*

Myristica moschata. (THUNBERG).

Myristica officinalis. (LINN.).

OF. *Nux moschata: macis.* G. *Noix muscade: mace.* H. *Nuez moscada, macias.*QUAL. *Utriusque:* In oleo volatili simul  
ac fixo aromatico residens: Odor fra-  
grans; sapor grate amaricans, aromati-  
cus stypticus.VIRT. Stimulans; stomachica; carminativa;  
obstipans; *majori dosi:* hypnotica; se-  
dativa.USUS Dyspepsia; flatulentia; colica; diar-  
rhœa; stranguria.

DOS. Gran. IV-XX.

PRÆP. Nux condita; oleum volatile et  
oleum fixum fragrans.

MYROXYLON PERUIFERUM. Balsamum.

CL. *Decand. O. Monog.* Arborea; Amer. merid.

OF. *Balsamum Peruvianum.* G. *Baume du Perou.* H. *Bálsamo del Perú.*

QUAL. Præstans: odor suaveolens; sapor acris.

USUS Dyspepsia; spasmi; amenorrhœa; blennorrhœa; morbi viscerum pituitosi; tabes; ulcera. *Extern.* Arthrodynia rheumatica.

DOSES. Gran. vi-xxx. Sæpius de die cum vitello ovi aut saccharo.

MYRTUS CARIOPHYLLATA. Cortex.

CL. *Icosand. O. Monog.* Arborea; Ind. orient. et occident.

OF. *Cassia caryophyllata.* G. *Cannelle giroflée.* H. *Canela de clavo.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, pungens.

VIRT. Stomachica.

USUS.

MYRTUS COMMUNIS. Folia; Baccæ.

CL. & O. *præced.* Arborea; Europ. austr.

OF. *Myrtus.* G. *Myrte ordinaire.* H. *Arayan.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, substypticus.

VIRT. Calefaciens; adstringens.

USUS Profluvia.

MYRTUS PIMENTA. Baccæ.CL. & O. *præced.* *Arborea; Ind. occident.*OF. *Piper Jamaicense; fructus pimenti*  
(*FALSO semen amomi veri*). G. *Poivre*  
*de Jamaïque.* H. *Pimienta de tabasco.*

QUAL. Odor fragrans, gratus; sapor aromaticus.

VIRT. Calefaciens; stomachica; stimulans.

USUS.

## N.

NEPETA CATARIA. Herba.CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; in muris antiquis.*OF. *Cataria; nepeta.* G. *L'herbe aux chats.*  
H. *Yerba gatera.*

QUAL. Odor hircinus, felibus gratus; sapor nauseosus, amarus.

VIRT. Nervina; menagoga; anthelminthica.

USUS Histeria; chlorosis.

## NERIUM ANTIDYSENTERICUM. Cortex.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Ind. orient.*OF. *Cortex conessi; cortex antidysentericus, seu profluvii.* H. *Coneso.*QUAL. Lactescens; sapor amarus. *Recentis: Acris; virosa.*

VIRT. Anthelminthica.

USUS Intermittentes pertinaces; sub finem dysenteriae; diarrhoea; odontalgia.

NICOTIANA TABACUM. Folia siccata.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua.*

OF. *Herba tabaci; nicotiana.* G. *Tabac.*

H. *Tabaco.*

QUAL. Heroica: venenata; in principio narcotico acri residens; odor nauseosus; sapor acris, nauseosus.

VIRT. Diuretica; emetica; drastico-cathartica; stimulans; errhina; phthiriaca; deobstruens; sialogoga; narcotica.

usus *internus* tincturæ, vini, aut extracti: Hydrops; morbi pectoris pituitosi; scirrhus; icterus. *Externus* fumi (melius infusi) forma enematis; Obstipatio; ileus; hernia incarcerationata. Forma lotionis; psora; ozæna; phimosis.—Pulvis tabaci cum aqua vel alcohole diluto in pastam redactus, carpo interno applicatus: Intermittentes.

N. B. Idem præcordiis appositus vomitum ciet.

DOS. *Folior-siccat.* drach. semis-j ad unc. iv aquæ infusæ per horam. *Vini vel tincturæ:* Gutt. xl-c omni bihorio in hydrope.

PRÆP. Extractum; tinctura; vinum *Ph. Edimb.*

NIGELLA SATIVA.

Semen.

CL. *Polyand.* O. *Tetragyn.*

*Annua; insul. archipel.*

OF. *Semen nigellæ. s. Melanthii.* G. *Nielle romaine.* H. *Arañuela, agenüz.*



QUAL. Venenata: in oleo volatili, simul-  
que fixo residens: odor fragrans; sapor  
acris, aromaticus.

VIRT. Stimulans; lactifera; errhina; sia-  
lagoga, menagoga; anthelminthica.

USUS.

NYMPHÆA ALBA.

Radix; flores.

CL. *Polyand. O. Monog.*

*Perennis; in locis pa-  
ludosis, aquosis.*

OF. *Nymphæa. G. Nenuphar blanc. H. Ninfæa.*

QUAL. *Florum*: Fragrans. *Radicis*: In oleo  
acri residens, exsiccatione avolans.

VIRT. *Florum*: antaphrodisiaca? Refrige-  
rans; hypnotica. *Radicis*: Vesicans.

NYMPHÆA LUTEA.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

## O.

OCYUM BASILICUM. Herba; semen.

CL. *Didyn. O. Gymnosp.* *annua; hortensis:*

OF. *Herba Basilici. G. Basilic. H. Albahaca.*

QUAL. *Herbæ*: Odor fragrans; sapor aro-  
maticus. *Seminis*: Mucilaginosi.

VIRT. Nervina.

USUS Vomitus; rheumata.

OENANTHE CROCATA.

Herba.

CL. *Pentand. O. Digyn.*

*Perennis; Europ.*

QUAL. Mucilaginosi.

VIRT. Emoliens.

USUS.

**OLEA EUROPÆA.** Oleum fixum, expressione fructus paratum.

CL. *Diand. O. Monog.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Oleum olivarum. G. Huile d'olives.*

H. *Aceite comun; olivo.*

QUAL. Oleosa.

VIRT. Emoliens; involvens.

USUS *intern. & extern.:* Dysenteria; tenesmus; tussis; stranguria; nephritis; enteritis; morsura.

N. B. Oleum calidum, toti corporis superficie frictione adplicatum donec sudor profluat, curare æque ac arcere pestem, nuper didicimus.

**ONONIS ARVENSIS**

———— SPINOSA.

} Radix; herba.

CL. *Diadelph. O. Decand.*

*Perennis; ad vias, et in locis sterilibus.*

VAR. A. flor. Purpur. B. Flor. alb.

OF. *Anonis. s. Ononis. G. Arrête-bœuf; bugrane. H. Uña Gata, ó Gatuña, ó Detiene buey.*

QUAL. Sapor subacris, ingratus.

VIRT. Diuretica.

USUS Testiculi tumor durus; hydrocele; icterus; ischuria?

DOS. Pulveris drach. j; in decocto unc. semis ad libram j aquæ.

ONOPORDIUM ACANTHIUM. Herba  
recens; succus expressus.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.* *Perennis.*

OF. *Carduus tomentosus; acanthium. G. Pédane. H. Toba.*

VIRT. Specifica anticancrosa?

USUS *succi recentis* externe adplicati: Carcinoma; præcipue ulcera faciei cancrosa.

ONOSMA ECHIOIDES. Radix.

CL. *Pentand. O. Monog.*

N. B. Substituatur anchusæ tinctoriæ.

OF. *Anchusa lutea.*

QUAL.

VIRT. Menagoga?

USUS.

OPHIORRHIZA MUNGOS. Radix.

CL. *Pentand. O. Monog.* *Perennis; Ind. orient.*

OF. *Radix serpentium. s. Mungos.*

QUAL. In extractivo amaro residens; sapor subsalsus, intense amarus.

VIRT.

USUS Morsura; hydrophobia? Mania?

OPHIOXYLUM SERPENTINUM Lignum.

CL. *Polyg. O. Monœc.* *Arboresc. In l. orient.*

OF. *Lignum serpentum. s. Serpentinum.*

QUAL. Sapor amarus.

VIRT.

USUS *infusi*: Quartana; morsura.

DOS. Drach. semis ad libram j aquæ.

## ORCHIS BIFOLIA.

Radix.

CL. *Gynand.* O. *Diand.**Perennis.*OF. *Satyrion.* G. *Satyrion.* H. *Satirion;*  
*testiculo de Perro.*QUAL. et VIRT. *Sequentium.*

## ORCHIS MASCULA.

———— MILITARIS.

———— MORIO, etc.

Radix.

CL. & O. *præced.**Perennis; in Sylvis.*OF. *Radix salep.* G. H. *Salep.*

QUAL. Mucilaginosa. N. B. Odor quarundam specierum hircinus.

VIRT. Nutriens; involvens; aphrodisiaca?  
usus Anaphrodisia? Dysenteria; tabes; ulcera interna.

DOS. Drach. ij pulveris ad libram j aquæ in decocto.

## ORIGANUM CRETICUM.

Spicæ.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.**Perennis; Europ. austr.*OF. *Origanum creticum.* G. *Origan.*

QUAL. In oleo volatili acri residens: odor fragrans, gratus; sapor acris, aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans; menagoga; resolvens.

USUS. Odontalgia: In balneis.

PRÆP. Oleum volatile.

## ORIGANUM DICTAMNUS.

Folia.

CL. & O. *præced.* *Perennis; suffruticosa; Archipel.*

OF. *Dictamnus Creticus.* G. *Dictame de Candie.* H. *Dictamo crético.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans debilis; sapor aromaticus, calidus.

VIRT. Stimulans; nervina; menagoga; resolvers.

USUS.

PRÆP. Oleum volatile.

## ORIGANUM MAJORANA.

Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua; hertensis, Europ. austr.*

OF. *Majorana.* G. *Marjolaine.* H. *Almoradux. Mejorana.*

QUAL. In oleo volatili copioso residens: odor fragrans, gratus; sapor aromaticus.

VIRT. Stimulans; nervina; stomachica; menagoga; errhina; resolvers.

USUS Anosmia; coryza.

PRÆP. Oleum volatile.

## ORIGANUM SYRIACUM.

Herba.

QUAL. Aromatica.

VIRT. Stimulans.

USUS.

## ORIGANUM VULGARE.

Herba.

CL. & O. *Præced.* *Perennis; in locis montanis, nemorosis, siccis.*

OF. *Origanum vulgare.* G. *Origan.* H. *Orégano.*

QUAL. In oleo volatili copioso residens: odor fragrans, gratus; sapor aromaticus, amaricans, subacris: tinctoria.

VIRT. Stimulans; nervina; resolvens.

USUS Tussis; tabes pulmonalis pituitosa;  
chlorosis; œdema: In balneis frequens.

N. B. Theæ succedaneum.

PRÆP. Oleum volatile.

## ORYZA SATIVA.

Semen.

CL. *Hexandr. O. Digyn.*

*Annua.*

OF. *Grana. oryzæ. G. Riz. H. Arroz.*

QUAL. Mucilaginoso; farinosa; dulcis.

VIRT. Nutriens; involvens.

USUS *Cibarius*: Diarrhœa; dysenteria.

## OSMUNDA REGALIS.

CL. *Cryptog. O. Filices.*

H. *Helecho florido.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

## OXALIS ACETOSELLA. Herba recens; Folia.

CL. *Decand. O. Pentag.* *Perennis; Europ.*

OF. *Acetosella. s. Lujula. G. Oseille des  
bucherons. H. Accederilla; aleluya.*

QUAL. In acido peculiari residens; sapor  
intense acidus, gratus.

VIRT. Refrigerans.

USUS Febres. *Externus fol. recent. con-  
tusor.* forma cataplasmatibus: ulcera glandularum scrophulosa.

PRÆP. Oxalas acidulus potassæ vulgo sal acetosellæ. (G. Oxalate acidule de potasse:)  
Acidum oxalicum; conserva; syrupus.

## OXALIS CERNUA.

QUAL. et VIRT. Præced.

## OXALIS CORNICULATA.

CL. &amp; O. præced.

Europ. austr.

QUAL. et VIRT. præcedentis.

## P.

## PÆONIA ANOMALA.

Radix.

CL. *Polyand. O. Digyn.**Perennis; alpina.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Intermittentes.

PÆONIA OFFICINALIS. Radix; flores;  
semen.

CL. &amp; O. præced.

OF. *Pæonia. G. Pivoine. H. Peonia.*QUAL. *Radicis recentis*: Odor teter, foetidus. *Siccatae*: sapor farinaceus, substypticus.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; subadstringens.

USUS. Epilepsia; intermittentes. (PALLAS).

N. B. Succus radicis recentis pæoniæ foliis bifidis expressus majori dosi in epilepsia tentari meretur.

## PANAX QUINQUEFOLIUM. Radix.

CL. *Polyg. O. Dioec.**Perennis; Tartariæ; amer. septentr.*



OF. *Radix ginseng*. G. *Genseng*. H. *Ginsen*.  
 QUAL. Sapor gratus, leniter aromaticus.  
 VIRT. Leniter stimulans. — Aphrodisiaca?  
 USUS Anaphrodisia? asthenia? marasmus?  
 DOS. Scrup. j-drachm j.

# PANICUM DACTYLUM.

Radix.

CL. *Diand*. O. *Digyn*.

*Europ. austr.*

OF. *Gramen*. G. *Chiendent*. H. *Gramma*.

QUAL.

VIRT.

USUS Substituitur radici tritici repentis in Italia.

# PANICUM ITALICUM.

Semen.

CL. & O. *præced.*

*Annua.*

OF. *Milii semen*. G. *Millet*. H. *Mijo*.

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens; involvens.

USUS.

# PAPAVER RHÆAS.

Flores.

CL. *Polyand*. O. *Polyg. superfl.*

*Annua.*

OF. *Papaver rhæas*, seu erraticum. G.

*Pavot coquelicot*. H. *Amapola*.

QUAL. Subamara.

VIRT. Subnarcotica.

USUS.

PRÆP. Syrupus lacte ruber.

PAPAVER SOMNIFERUM. Capsulæ seminales : Succus gummi-resinosus incisione vel expressione capsularum

seminalium immaturarum obtentus,  
vulgo *Opium* dictus.

*Annua; Ægypt. et  
Asiæ meridion.; Eu-  
rop. hortensis.*

CL. & O. præced.

OF. *Capita papaveris albi: Opium. G.*  
*Pavot somnifere: Opium. H. Adormi-  
dera blanca y negra.*

QUAL. Heroica: in principio narcotico cum  
gummi-resinoso volatili juncto residens;  
odor teter, virosus; sapor nauseosus,  
acris, amarus.

VIRT. Narcotica; sudorifica; obstipans;  
*majori dosi* stimulans; cardiaca.

USUS *internus*: Dolor ex irritatione aut  
spasmo; dolor phlegmasiarum post eva-  
cuationes debitas; intermittentes ante  
paroxysmum vel finito stadio frigoris;  
dysenteria atonica; diarrhœa; cholera;  
tussis ex acri tenui; lochia dolorifica et  
hæmorrhagiæ ab irritatione locali aut  
spasmo; menstruatio dolorifica; poda-  
gra atonica (magna dosi); rheumatismus  
post v. s. necessarias; asthma; hyste-  
ria; nephralgia; cardialgia; colica pic-  
tonum; tetanus; convulsio; blennor-  
rhagia; tumor epididymidis vel testiculi  
syphilitica; ulcera syphilitica rebellia; ul-  
cera phagedænica; gangræna senilis. *Ex-  
ternus* forma enematis, fots, linimenti.

DOSIS. Gr. i-xv de die.

PRÆP. Solutio opii in vino vel alcohole di-  
luto; extractum aquosum; syrupus; de-  
coctum capsularum; linimenta varia.

*N. B.* Semina nulla qualitate, nisi oleosa demulcente, gaudent.

**PARIETARIA OFFICINALIS.** Herba; radix.

*CL. Polyg. O. Monœc.* *Perennis.*

*OF. Parietaria. G. Pariétaire, H. Parietaria.*

*QUAL.* Aquoso-insipida.

*VIRT.* Refrigerans; diuretica,

*USUS* Stranguria; tabes?

**PARIS QUADRIFOLIA.** Herba; baccæ.

*CL. Octand. O. Tetrag.* *Perennis.*

*OF. Herba Paris.*

*QUAL.* Odor teter; sapor dulcescens.

*VIRT.* Antispasmodica; narcotica.

*USUS* Convulsio; mania; bubo; ophthalmia.

**PARNASSIA PALUSTRIS.** Herba; flores.

*CL. Pentand. O. Tetrag.* *Perennis.*

*OF. Hepatica alba.*

*QUAL.* Amaricans.

*VIRT.* Substringens,

*USUS.*

**PASTINACA OPOPANAX.** Succus gummi-  
resinosus concretus, incisione plantæ  
et radicis, obtentus.

*CL. Pentand. O. Digyn.* *Perennis; Europ. austr.*

*OF. Gummi opopanax. G. Opopanax. H. Opoponaco.*

*QUAL.* In oleo volatili et principio resino-

so residens; odor graveolens; sapor acris, amaricans.

VIRT. Nervina; eccoprotica; carminativa; menagoga.

USUS Tussis; asthma pituitosum.

# PASTINACA SATIVA.

Semen.

CL. & O. *præced.*

*Biennis.*

OF. *Pastinaca*. G. *Panais*. H. *Zanahoria*.

QUAL.

VIRT?

USUS Intermittentes?

DOS. *pulveris*: Drach. j-Unc. semis.

PEDICULARIS PALUSTRIS. } Herba re-  
Aliæque SPECIES. } cens.

CL. *Digyn*. O. *Gymnops*.

QUAL. *Ingrata*.

VIRT.?

USUS *Fistula*; *ulcus callosum*.

PENÆA SARCOCOLLA. } Gummi-resina.  
—— MUCRONATA. }

CL. *Tetrand*. O. *Monog*. *Fruticosa*; *Æthiopica*.

N.B. *Gummi sarcocollæ offic. ex his plantis provenire creditur*. G. *Sarcocolle*.

H. *Sarcocola*.

QUAL. *Inodora*; sapor amaricans, acris, nauseosus.

VIRT. *Stimulans*; *cathartica*.

USUS.

## PENTAPETES MUHUCUNDA? Flores.

CL. *Monadelp. O. Dodec.* Ind. orient.*Muhucunda* BENGALIS.

QUAL. Mucilaginosa.

VIRT.

USUS *infusi flor. recent.* Blennorrhagia.*Pulv. flor. siccata naribus attracti: Cephalæa nervosa.*

## PETIVERA ALLIACEA.

Herba.

CL. *Hexand. O. Trigyn.* Fruticosa; Ind. occident.OF. *Scorodoniæ herba.*QUAL. et VIRT. *allium æmulans.*

USUS Intermittentes.

## PEUCEDANUM OFFICINALE. Radix.

CL. *Pentand. O. Digyn.* Perennis.OF. *Peucedanum. c. Queue de pourceau.*

QUAL. Lactescens; odor nauseosus; sapor dulcescens.

VIRT. Diuretica? Expectorans?

USUS Ulcera; odontalgia.

## PEZIZA AURICULA.

CL. *Cryptog. O. Fungi.*OF. *Auricula Judæ; fungus sambuci. c.**Oreille de Judas. u. Agarico de Sauc.*

QUAL.

VIRT. Adstringens.

USUS *externus* forma gargarismatis: Angina? Collyrii: Ophthalmia.

PHALARIS CANARIENSIS. Semen.

CL. *Diand.* O. *Monog.*

OF. *Semen canariense.* G. *Quene de Renard.* H. *Alpiste.*

QUAL. Farinácea,

VIRT.

USUS,

PHASEOLUS VULGARIS. Semen.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.*

G. *Petits Pois.* H. *Guisantes.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens; cosmetica?

USUS.

PHELLANDRIUM AQUATICUM Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Biennis; in locis pululosis.*

OF. *Phellandrium.* s. *Fœniculum aquaticum.* G. *Phellandrie.* H. *Mil-en-rama aquatico.*

QUAL. Odor et sapor aromaticus, acris.

VIRT. Stimulans; narcotica?

USUS *pulv. vel decocti*: Dyspepsia; intermittentes; hypochondriasis? Ulcera scrophulosa, atonica; tabes pulmonalis pituitosa.

Dos. Pulveris unc. semis j cum lacte omni mane; pro decocto unc. j ad libram unam aquæ vel aquæ calcis.

PHŒNIX DACTYLIFERA. Fructus.

*Palma; Asiæ et Africæ.*

OF. *Dactyli*. G. *Dattes*. H. *Datiles*, *palma*.  
 QUAL Sapor dulcis, mucilaginosus.  
 VIRT. Nutriens; expectorans.  
 USUS Tussis; raucedo; stranguria.

PHYLLANTHUS EMBLICA. Fructus  
 siccatus cum nuce.

CL. *Monœc*. O. *Triand*. *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Myrobalaniemblicæ*. G. *Myrabolans*.

H. *Mirabolanos émblicos*.

QUAL. Sapor acidulus, austerus, sub-  
 acris.

VIRT. adstringens. *Infusi*: Cathartica.

USUS Stomacace; dysenteria.

PHYSALIS ALKEKENGI. Baccæ; semina.

CL. *Pentand*, O. *Monog*.

OF. *Solanum vesicarium*; baccæ alkekengi. G. *Coqueret*; alkekenge. H. *Vegiga de perro*, *Alkekenjos*.

QUAL. *fructus*: Sapor grate acidulus. *Corticis fructus*: Sapor intense amarus.

VIRT. *fructus*: Diuretica; eccoprotica.

USUS Nephritis; Dysuria; hydrops.

PHYTOLACCA DECANDRA. Succus fo-  
 liorum expressus. *Perennis; Virginicæ;*

CL. *Decand*. O. *Decagyn*. *passim hortensis*.

OF. *Phitolacca*. G. *Phytolaque*; *raisin d'Amérique*. H. *Yerba carmin*, *sitolacca*.

QUAL. *Tenellæ*: Aquosa. *Adultæ*: Acris.

VIRT. Corrodens; anticanerosa?



usus Succī guttatim instillati: Ulcera can-  
croſa.

PIMPENELLA ANISUM. Semen.

CL. *Pentand. O. Digyn.* *Annua; Ægyptiaca.*

OF. *Semen anisi. G. Anis. H. Anis Mata-  
lahuga.*

QUAL. In oleo volatili non acri residens;  
sapor dulcescens, aromaticus; odor vi-  
rosus, fragrans.

VIRT. Stimulans; carminativa; lactifera;  
resolvens.

usus pulveris: Flatulentia. Olei: Rheu-  
matismus.

DOSIS pulveris: Scrup. j-drach. semis. In  
infuso: Unc. semis ad libram j aquæ.

PRÆP. Oleum volatile, Gutt. x-drach. ij  
pro dosi.

PIMPINELLA MAGNA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis,*

OF. *Pimpinella nigra. G. Grand bouca-  
ge. H. Pimpinela negra ó mayor.*

QUAL. In oleo volatili cæruleo residens;  
odor et sapor aromaticus.

PIMPINELLA SAXIFRAGA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis,*

N. B. VARIETAS. A. Alba. B. Nigra.

OF. *Pimpinella alba. s. Nostras. G. Petit  
boucage; saxifrage.*

QUAL. Præstans: in principio resinoso acri re-  
sidens: Odor hircinus; sapor acris, calidus.

VIRT. Stimulans; diuretica; menagoga; resolvens.

USUS pulveris et tincturæ: Angina serosa; hysteria.

PRÆP. Tinctura.

PINUS ABIES. Summitates; resina granulata incisione arboris obtenta.

CL. *Monæc.* O. *Monadelp.* *Arborea.*

OF. *Abies*: resina alba: *pix Burgundica*: *Colophonium*. G. *Sapin*. H. *Pinabete*, *abeto*.

QUAL. *Summitatum seu foliorum teneriorum acerosorum*: Resinosa; sapor acescens, resinusus. — *Resinæ*: Sapor gratus, amaricans; odor fragrans.

VIRT. Stimulans; diuretica; diaphoretica.

USUS *decocti summitatum*: Morbi cutis. *Resinæ fusæ cum sebo externus*: Lepra ichthyosis CULLEN.

PRÆP. Resina fusa per linteum colata, vulgo *pix Burgundica*; resina addito aceto cocta ad siccitatem usque, vulgo *colophonium*.

PINUS BALSAMEA.

—— CANADENSIS.

Resina liquida, incisione aut perforatione arboris obtenda.

CL. & O. *præced.*

*Arborea; Amer. septentr.*

OF. *Balsamum Canadense*. G. *Sapin Baume du Canada*; *Sapin Spruce*.

QUAL. Resinosa; odor fragrans, gratus; sapor subaromaticus, leviter pungens, amaricans.

VIRT. Stimulans ; diuretica ; diaphoretica.

USUS Blennorrhœa ; morbi cutis ; acce herpeticum in corpore vagum ; morbi viscerum pituitosi.

DOSES. Gutt. XL-LX.

PINUS CEMBRA

Resina liquida.

CL. & O. præced.

Arborea ; alpina.

OF. *Balsamus carpathicus ; balsamus Libani.* G. *Pin cembro.* H. *Pino uñal.*

QUAL. Resinosa.

VIRT. Diuretica ; stimulans.

USUS Blennorrhœa ; ulcera.

PINUS LARIX.

Resina liquida.

CL. & O. præced.

Arborea ; alpina.

OF. *Terebinthina Veneta seu larigna.* G. *Terebinthine: Melez.* H. *Alerce ó Pino Alerce.*

QUAL. Resinosa.

VIRT. Diuretica ; stimulans ; urinam violaceo odore imbuens.

USUS Idem ac præced.

PINUS MUNGHOS. (SCOPOLI.) Oleum destillatione obtentum.

CL. & O. præced. Arborea ; German. Hungar. alpina.

OF. *Oleum templinum.*

PINUS PINEA.

Nuclei.

CL. & O. præced.

Arborea ; Europ. austr.

OF. *Pinei.* G. *Pignon doux.* H. *Pino comun.*

QUAL. Dulcis; oleosa.

VIRT. Nutriens.

USUS Tabes; stranguria.

**PINUS PICEA.** Resina liquida; incisione arboris obtenta.

CL. & O. præced.

*Arborea.*

OF. *Terebenthina Argentoratensis: resina alba. G. Sapin pesse, poix, epicia.*

**PINUS SYLVESTRIS.** Turiones; resina alba liquida, perforatione aut incisione arboris obtenta.

CL. & O. præced.

*Arborea.*

OF. *Terebinthina communis: Pix alba. G. Pin ordinaire; Terebenthine: résine blanche; galipot. H. Pino.*

QUAL. Resinosa; acris; amara.

VIRT. Stimulans; diuretica; diaphoretica; depilatoria.

USUS *internus*: Arthrodynia; blennorrhœa; asthma pituitosum; scorbutus. *Decocti turionum vel resinæ liquidæ: Morbi cutis; herpes. Externus resinæ liquidæ forma enematis: Obstipatio. Forma unguenti vel emplastri: Ulcera atonica.*

DOS. *Turionum*: Unc. semis-ij ad libras ij aquæ vel seri lactis coct. de die sumendum. *Resinæ liquidæ*: Unc. semis-ij vitello ovi subacta cum aqua mixta pro enemate. *Intern.* Gran. v-x vitello ovi vel saccharo subacta.

PRÆP. Resina alba liquida calore ignis exsiccata vulgo *colophonium*. Resina nigra destillatione per descensum obtenta, fumo inquinata, liquida vulgo *pix nigra liquida*; resina solida vulgo *pix navalis*. c. Goudron; poix.—Oleum volatile terebinthinæ; aqua picea.

## PIPER CUBEBA.

Fructus siccatus.

CL. *Diandr. O. Trigyn.* *Sarmentosa; Ind. orient.*OF. *Cubebæ. c. Cubebes. II. Cubebas.*

QUAL. Acris; aromatica; fervida.

VIRT. Stimulans; calefaciens; carminativa; sialagoga.

USUS Vertigo; morosis?

## PIPER LONGUM.

Fructus.

CL. & O. *præced.* *Sarmentosa; Ind. orient.*OF. *Piper longum. c. Poivre long. II. Pimienta larga.*

QUAL. et VIRT. Sequentis.

## PIPER NIGRUM.

Fructus.

CL. & O. *præced.* *Sarmentosa; Ind. orient.*

N. B. Piper album est fructus maturus cortice privatus.

OF. *Piper nigrum, album. c. Poivre. II. Pimienta negra.*

QUAL. In principio resinoso residens; acris; aromatica; fervida.

VIRT. Stimulans; calefaciens; stomachica; errhina; phthyriaca.

USUS *internus*: Intermittentes; dyspepsia;

singultus. *Externus*: Uvulae relaxatio; pediculi.

**PISTACIA CHIO.** (TOURNEFORT). Resina liquida.

CL. *Dicæc.* O. *Pentandr.* *Arborea; Ins. Chio.*

N. B. Sub hoc nomine in horto botanico Parisino existit arbor à Tournefort ex insula Chio allata, ex qua incolae hujus insulae terebinthinam e Chio veram depromunt. Hæc arbor longe minor est pistacia terebintho, foliola pauciora et folia undulata, glauca habet. Terebinthinam e Chio in commercio vulgo obviam ex hac et pistacia terebintho promiscue depromi probabile est.

**PISTACIA LENTICUS.** Resina alba, incisione arboris exsudans, concreta.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Mastiche*; gummi *mastiche.* G. *Mastic.* H. *Lentisco*, *Almaciga.*

QUAL. Resinosa; aromatica.

VIAT.

USUS Masticatorius; item suffimigia.

**PISTACIA TEREBINTHUS.** Resina liquida.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Asiae, Afric. et Europ. austr.*

OF. *Terebinthina de Chio seu Cyprina.* G. *Terebinthe.* H. *Pistacho*, *Trementina.*

QUAL. Resinosa; odor fragrans; sapor gra-

tus, amarus, subacris; urinam violaceo odore imbuens.

VIRT. Stimulans; diuretica; eccoprotica; resolvens.

USUS Tussis; tabes; ulcus; blennorrhœa.

# PISTACIA VERA.

Nuces.

CL. & O. præced. *Arborea; Asiæ et Europ. austr.*

OF. *Pistaciæ. G. Pistachier. H. Alhociga.*

QUAL. Oleosa.

VIRT. Nutriens.

USUS.

# PISUM SATIVUM.

Semen.

H. *Arbeja.*

CL. *Diadelph. O. Decand.*

*Hortensis.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens.

USUS.

# PLANTAGO MAJOR.

Herba;

————— MEDIA.

radix;

————— LANCEOLATA.

semen.

CL. *Tetrand. O. Monog.*

*In viis passim.*

OF. *Plantago. G. Plantain. H. Llanten.*

QUAL. Insipida; substyptica.

VIRT. Adstringens.

USUS Tertiana; ulcus.

# PLANTAGO PSYLLIUM.

Semen.

CL. & O. præced.

*Annua; Europ. austr.; in Campis arenosis.*



OF. *Semen psyllii*. G. *Herbe aux puces*.

H. *Zaragatona*.

QUAL. Mucilaginoso.

VIRT. Involvens.

USUS Raucedo; ophthalmia.

## PLUMBAGO EUROPÆA.

Radix.

CL. *Pentand*. O. *Monog*. Perennis; Europ. austr.

OF. *Dentellaria*; *dentaria*. G. *Dentellaire*. H. *Velesa*.

QUAL. In principio acris residens; sapor acris, urens.

VIRT. Caustica.

USUS Odontalgia.

## PLUMERIA ALBA.

Radix.

CL. *Pentand*. O. *Monog*. Arborea; Ind. occident.

QUAL. Lactescens.

VIRT.

USUS decocti; syphilis?

## POLYGALA AMARA.

Radix; folia.

CL. *Diadelph*. O. *Octand*. Subperennis; in montibus nemorosis.

OF. *Polygala amara*. G. *Poligala*. H. *Polygala amarga*.

QUAL. Radicis: subdulcis, amaricans. Foliorum: Sapor intense amarus.

VIRT. Foliorum & radicis: Stomachica.

USUS Radicis: Morbi pectoris atonici; pertussis; tabes pulmonalis.

DOS. Pulveris radicis: Drach. semis. bis terve de die. Decocti radic. unc. ij ad

libras ij aquæ reductæ ad libram-unam  
de die sumend.

POLYGALA SENEGA. Radix; cortex  
radicis.

CL. & O. *præced.* Perennis; Firgin. Pennsylv.

OF. *Senega; seneka; polygala Virginia-*  
*na. G. Senéka. H. Poligala de virginia,*  
*Senega.*

QUAL. Heroica: In principio resinoso resi-  
dens; sapor acido-acris; subaromaticus;  
ad finem intense amarus, urens.

VIRT. Subemetica; cathartica; sudorifica;  
diuretica; expectorans; sialagoga; deobs-  
truens.

USUS Hydrops, arthrodynia; arthritis; mor-  
bi pulmonum atonici, pituitosi. Morsu-  
ra serpentum? Tabes; pleuritis?

DOSIS *pulveris*: Gran. x-xxx.- *In decoc-*  
*to*: Scrup. j-drach. semis ad libram-j  
aquæ sumend. unc. semis-j omni hora,  
donec alvum movere incipiat.

PRÆP. Decoctum; infusum vinosum; tinc-  
tura.

POLYGALA VULGARIS. Radix.

G. *Poligala. H. Poligala vulgar.*

CL. & O. *præced.*

*Su' perennis.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

POLYGONUM AVICULARE. Herba.

CL. & O. *præced.*

*Annua.*

OF. *Centumnodium*; *sanguinaria*; *herba sanguinalis*. H. *Sanguinaria mayor*.

QUAL. Substyptica.

VIRT.

USUS.

POLYGONUM BISTORTA. Radix.

CL. *Octand*. O. *Trigyn*. Perennis; in pratis humidis.

OF. *Bistorta*. G. *Bistorte*. H. *Bistorta*.

QUAL. In copioso principio adstringente residens; sapor stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS Cum gentiana forma pulveris, decocti, infusi: Intermittentes; profluvia; leucorrhœa.

DOS. Drach. iij de die.

POLYGONUM FAGOPYRUM. Semen.

H. *Trigo sarraceno*.

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens.

USUS.

POLYGONUM HYDROPIPER. Herba.

CL. & O. præced. Annuæ; in fossis humidis.

OF. *Hydropiper*; *persicaria*. G. *Poivre d'eau*. H. *Pimienta de agua*.

QUAL. Lutea; acris; urens.

VIRT. Diuretica; corrodens; rubefaciens.

USUS.

## POLYGONUM PERSICARIA.

OF. *Persicaria*. G. *Persicaire*. H. *Persicaria*.

QUAL.

VIRT.

USUS.

## POLYPODIUM FILIX MAS. Radix.

CL. *Cryptog.* O. *Filices*. In umbrosis; nemorosis.N. B. Planta 6 ad 7 pedum altitudinis:  
Frondebis bipinnatis; pinnis obtusis  
crenulatis; stipite paleaceo.OF. *Filix mas*. G. *Fougère mâle*. H. *Helecho  
macho*.QUAL. Sapor ingratus, mucilaginoso-dul-  
cis, stypticus, sub finem amaricans.VIRT. Anthelminthica. Lactifera? Mena-  
goga?

USUS Tænia; lumbrici; rhachitis?

DOSIS pulveris: Gran. xxx-drach. j infan-  
tibus: drach. ij-iiij adultis, subjuncto  
cathartico.

## POLYPODIUM FRAGRANS. Herba.

QUAL. Odor fragrans: sapor aromaticus.

VIRT. Stimulans.

USUS.

## POLYPODIUM VULGARE. Radix mollis.

CL. &amp; O. præced. Perennis; in rimis petrarum;

OF. *Polypodium*. G. *Polypode ordinaire*; *polypode de chêne des anciens*. H.  
*Polypodio*.

QUAL. Sapor dulcis, subnauseosus, tandem amarus.

VIRT. Expectorans; eccoprotica.

USUS,

POLYTRICHUM COMMUNE. Herba.

CL. *Cryptog.* O. *Musci.*

OF. *Adiantum aureum.* H. *Politrigo.*

QUAL,

VIRT.

USUS,

POPULUS BALSAMIFERA. Resina.

An balsamum?

CL. *Dicœc.* O. *Octand.* Amer, septentr.

N. B. JACQUIN tacamahacam ex Fagara octandra derivat.

OF. *Gummi tacamahaca.* G. *Baume to-*  
*cot, tacamaque.* H. *Tacamaca.*

QUAL. Præstans: odor ambrosiacus.

VIRT.

USUS Cophosis; vomitus; hysteria.

POPULUS NIGRA. Gemmæ.

G. *Peuplier ordinaire*; H. *Chopo.*

QUAL,

VIRT. Obtundens; emolians; soporifera.

USUS Diarrhœa; ambustura?

PORTULACA OLERACEA. Semen.

CL. *Dodecand.* O. *Monog.*

G. *Pourpurier.* H. *Verdolagas.*

QUAL. Aquosa.

VIRT. Refrigerans; lac coagulans.

USUS Stranguria?

POTENTILLA ANSERINA. Radix; herba.

CL. *Icosand.* O. *Polygyn.* *In fossis et pratis humidis.*

OF. *Folia argentinæ. s. Anserinæ. h. Plateada.*

QUAL. Insipida.

VIRT. ?

USUS.

POTENTILLA REPTANS. Radix; herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis in pratis humidis.*

OF. *Quinquefolium; pentaphillum. g. Quintfeuille. h. Potentila, Pentafileon o Cinco-en-rama.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS Diarrhœa; sub finem dysentericiæ.

POTERIUM SANGUISORBA. Herba.

CL. *Monand.* O. *Polyand.* *Perennis; alpina.*

OF. *Pimpinella italica rubra. g. Pimpinelle. h. Pimpinela.*

QUAL. Odor subfragans; sapor stypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS.

PRIMULA VERIS. Radix; herba; corollæ.

VARIET. A. *Officinalis.*

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; in pratis.*

OF. *Flores paralyseos. g. Primèvère. n. Yerba de la primavera.*

QUAL. *Plantæ recentis* : Odor fragrans.  
*Radicis* : Sapor amaricans.

VIRT. Nervina? Narcotica? *Radicis* : Er-  
 rhina.

USUS.

PRUNELLA VULGARIS.

Herba.

CL. *Didyn. O. Gymnosp. Prennis; in pratib.*

OF. *Consolida minor. n. Prunela.*

QUAL.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

PRUNUS AVIUM.

Fructus; gummi.

CL. *Icosand. O. Monog.*

*Arborea.*

OF. *Cerasorum nigrorum fructus. g. Me-  
 risier.*

QUAL. *nuclei* : Sapor et odor laurocerasum  
 æmulans. *Fructus* : Sapor acidus.

VIRT.

USUS.

PRÆP. Aqua; alcohol, vulgo kirschwasser.  
 (Italorum marascino).

PRUNUS CERASUS.

Fructus; nuclei;

gummi.

CL. & O. præced.

*Arborea.*

OF. *Cerasorum rubrorum fructus. g. Ce-  
 risier. n. Cerezo.*

QUAL. *fructus* : Sapor acidulo-dulcis.

VIRT. Refrigerans.



usus *nucleorum*: Ad aquam stillatitiam parandam. *Gummi*: Idem ac gummi *Mimosæ niloticæ*.

PRUNUS DOMESTICA. Fructus; pulpa.  
CL. & O. *præced.* *Arborea.*

OF. *Pruna damascena*. s. *Gallica*. g. *Prunes de damas*. h. *Ciruelas damascenas*.

QUAL. Sapor mucilaginoso-dulcis, acidulus.

VIRT. Eccoprotica.

usus Febres; obstipatio.

PRUNUS LAURO-CERASUS Folia.

CL. & O. *præced.* *Hortensis; arborea.*

OF. *Lauro-cerasus*. g. *Laurier-cerise*. h. *Lauro real*.

QUAL. Venenata: in oleo volatili et principio narcotico residens; sapor amarus.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; deobstruens.

usus *aquæ*: Scirrhus; cancer? Obstructio hepatis? dysuria; Syphilis? Phthisis.

PRÆP. Aqua stillatitia. *Dosi* gutt. XXX-XL.

PRUNUS PADUS. Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea.*

QUAL. *corticis*: Sapor amarus, substypticus.

VIRT.

usus *decocti vel extracti*: Intermittentes; syphilis?

dos. In decocto unc. j ad libram j aquæ, omni mane sumend.

**PRUNUS SPINOSA.** Baccæ; flores; succus baccarum inspissatus.

CL. & O. præced.

*Fruticosa.*

OF. *Prunus silvestris*; *acacia nostras*. s. *germanica*: succus *acaciæ inspissatus*.

G. *Prunellier*. H. *Endrino*.

QUAL. *Baccarum*: Sapor stypticus, acidulus.

*Florum*: Odor fragrans; sapor amaricans.

VIRT. *Baccarum*: Antiseptica; roborans; adstringens. *Florum*: Eccoprotica.

USUS *fructus*: Febres biliosæ, putridæ; diarrhœa.

PRÆP. Aqua florum; succus baccarum inspissatus.

**PSYCHOTRIA EMETICA.** Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; Mexicana.*

Nota. Incertum est, an ad idem genus pertineat radix *ipecacuanhæ fuscae* ex *Brasilia* allata.

OF. *Ipecacuanha vulgaris*. s. *Vera*. s. *Cinerea*. s. *Grisea*. G. *Ipecacuanha*. H. *Hipecacuana* ó *Bejuquillo*.

QUAL. In principio resinoso residens: odor nauseosus; sapor amaricans; leviter pungens.

VIRT. Emetica.

USUS Asthma spasmodicum; spasmi; ad præveniendam febrem puerperalem mox initio gr.  $\frac{1}{4}$  -  $\frac{1}{3}$  omni quadrihorio (*Doucet*) Menorrhagia; Hæmoptysis; dysenteria; diarrhœa; pertussis.

DOS. *pulveris* gran j-iiij. *scopo emetico*:  
gran. xv-xx.

PREP. Pulvis sudorificus Doveri; vinum  
ipecacuanhæ; trochisci.

## PTERIS AQUILINA.

Radix.

CL. *Cryptog. O. Filic.**Perennis.*OF. *Filix fœmina.* H. *Helecho hembra.*

QUAL.

VIRT. Anthelminthica: Quibusdam eadem  
æstimatur ac Polypod. filicis maris.

DOSIS *pulveris*: Drach. semis-j mane et  
vespere cum melle.

## PTEROCARPUS DRACO.

Resina.

CL. *Diadelph. O. Decand.* *Arborea; Americ. me-*  
*ridion. et Ind. orient.*

N. B. Resina promiscue ex hac planta et  
ex dracæna dracone et calamo rotang  
desumitur.

OF. *Sanguis draconis.* G. *Sang dragon.*  
H. *Sangre de drago.*

QUAL. Rubra; inodora; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS Profluvia; diarrhœa; hæmorrhagiæ.

## PTEROCARPUS SANTALINUS. Lignum.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Santalum rubrum.* G. *Santale rouge.*  
H. *Sandalo rubio.*

QUAL. Saturate rubra; tinctoria.

VIRT.

USUS.

## PULMONARIA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; in silvys.*OF. *Pulmonaria maculosa.* G. *Pulmonaire.* H. *Pulmonaria oficinal.*

QUAL. Sapor subsalsus, mucilaginosus, amaricans.

VIRT.

USUS.

## PUNICA GRANATUM. Floris petala; cortex fructus; semen.

CL. *Icosand.* O. *Monog.* *Arborea; Europ. austr.*OF. *Flores balaustiorum: Cortex Granatorum.* S. *Psydi.* S. *malicorii.* G. *Legrenadier.* H. *Granado.*QUAL. *rubra:* Sapor stypticus.

VIRT. Adstringens; diuretica; anthelmintica.

USUS *decocti vel infusi aquosi seu vinosi florum aut corticis externus* forma fottus, injectionis, gargarismatis: Prolapsus; laxitas uvulæ; blennorrhœa.—*Internus: Diarrhœa.*DOSIS *flor. vel corticis:* Unc. j ad libram j aquæ vel vini rubri.

## PYROLA ROTUNDIFOLIA. Herba.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Perennis.*OF. *Pyrola.* G. *Pyrole.* H. *Pyrola.*

QUAL. Sapor stypticus, amaricans.

VIRT. Adstringens.

USUS.

## PYRUS COMMUNIS.

Fructus.

CL. *Icosand.* O. *Pentag.**Arborea.*OF. *Pyrus.* G. *Poire.* H. *Peral.*

QUAL. Sapor dulcis, substypticus.

VIRT. Nutriens.

USUS.

## PYRUS CYDONIA. Fructus recens; semen; cortex.

CL. & O. *præced.**Arborea.*OF. *Cydonia.* G. *Coins.* H. *Membrillero.*QUAL. *fructus*: Odor gratus; sapor acidostypticus: *Seminis*: Mucilaginosus.VIRT. Adstringens; refrigerans. *Semin.* involvens. *Cort.* menagoga?

USUS.

PRÆP. Rob ex succo expresso cum saccharo inspissatum; mucilago seminum.

## PYRUS MALUS.

Fructus.

CL. & O. *præced.**Arborea.*OF. *Poma borstorfensia.* G. *Pomme.* H. *Manzano.*

QUAL. Sapor acido-dulcis.

VIRT. Eccoprotica; refrigerans.

USUS *forma cataplasmatidis*: Ophthalmia; ulcera putrida. *Decocti*: Febres.N. B. Succus ex pomis communibus, immaturis, (Anglis *crabs* dictis) expressus, in Anglia sub nomine *verjus* venditur.

## Q.

## QUASSIA AMARA.

Lignum.

CL. *Decand. O. Monog.**Arborea; Cayen.  
Surinam.*OF. *Quassia. g. Quassia. h. Quasia.*

QUAL. Eximia: Inodora; sapor intense et pure amarus.

VIRT. Stomachica; antacida; antiseptica.

USUS decocti (melius infusi) trititando cum aqua vel vino: Dyspepsia; intermittentes arthritidis: leucorrhœa.

DOS. Drach. ij unc. semis infus. in libra j aquæ vel vini, cochleatim sumend.-

Pulv. gr. x.

PRÆP. Extractum.

## QUASSIA SIMARUBA.

Cortex.

CL. & O. *præced.**Arborea; Ind. occident.*OF. *Simaruba. g. Simarouba. h. Simaruba.*N. B. Quidam corticem simarrhubæ ex *Bursera gummifera* derivant.

QUAL. Inodora; sapor pure amarus.

VIRT. Stomachica; subadstringens; diuretica.

USUS Dyspepsia; diarrhœa; dysenteria atonica; intermittentes.

DOS. *pulveris*: Drach. semis.-j. *Decocti* drach. ij-unc. semis ad libram j  $\beta$  aquæ,

ad colat. libra j.—Unc. semis-j sumenda  
omni bihorio vel trihorio.

**QUERCUS CERRIS.** Excrescentiæ a punctura insecti (*cynips cuercus* dicti) ejusque nidum constituentes, *vulgo Gallæ.*

CL. *Monæc.* O. *Polyand.*

OF. *Gallæ turcicæ.* G. *Noix de Galles.*

H. *Agallas de Levante.*

QUAL. Præstans: Styptica.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS Pulveris, decocti, unguenti; Varix ani; prolapsus; blennorrhœa.

**QUERCUS ROBUR.** Fructus seu glandes; cortex; folia; cupola glandis.

CL. & O. *præced.*

*Arborea.*

OF. *Quercus.* G. *Chêne ordinaire.* H. *El Roble.*

QUAL. Sapor stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; obstipans.

USUS *decocti glandium assatarum:* Tabes mesenterica infantum? Morbi cutis?—*Externus foliorum, corticis & cupolæ glandis decoct. in vino rubro vel aqua* forma fots, injectionis, gargarismatis; Prolapsus vaginæ, recti; relaxatio uvulæ; cynanche atonica; hæmorrhœæ; leucorrhœa; blennorrhœa. *Internus* in pulvere, infuso vinoso, vel decocto aquoso, præcipue cum amaris; intermittentes; blennorrhœa; diarrhœa.

dosis: Unc. j ad libram j vini rubri vel



aquæ, cochleatim sumend.—*Pulveris*  
*cupolæ glandis*: Drach. semis.

PRÆP. Unguentum ex unc. vij axungię  
 porcine cum drachm j pulveris galla-  
 rum.—Tinctura et infusum aquosum  
 præcipue pro examine aquarum mine-  
 raliū; acidum gallicum.

## QUERCUS SUBER.

Cortex.

CL. & O. præced.

*Arborea; Europ. austr.*

OF. *Cortex suberis*. G. *Liège*. H. *Alcor-  
 noque*.

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS *Corticis* combusti mixti cum oleo  
 fixo: Hæmorrhoids.

## R.

## RADIX BENGALE.

Obscura.

An eadem ac cassumuniar?

## RADIX CALAGUALÆ.

———— CALAGUELLÆ.

} Obscura.

OF. H. *Calaguala*.

QUAL.

VIRT. Diuretica; deobstruens.

USUS.

## RADIX CASSUMUNIAR.

Obscura.

OF. *Radix cassumuniar*. s. *Casumar*. s.  
*Bengale*. s. *Risagon*.

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus,  
amaricans, camphoratus.

VIRT. Stomachica; nervina; antispasmodica.

USUS.

RADIX CHYNLEN.

Obscura.

*Chinens.*

QUAL. Sapor intense amarus.

VIRT. Stomachica.

USUS Dyspepsia; colica flatulenta.

RADIX COLUMBO.

Obscura.

*Zeylon.*

SYN. *Radix Calombæ. s. Colombæ. s. Calumbæ. g. n. Colombo.*

QUAL. Intense amara.

VIRT. Stomachica.

USUS Dyspepsia; diarrhœa; dysenteria.

*Externus: Ulcera.*

DOSIS. Gr. xx-xxx.

RADIX IKAN.

Obscura.

*Chinens.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

RADIX LOPEZ.

Obscura.

*Afric. Ind. orient.*

OF. *Lopeziana radix. n. Lopeziana.*

QUAL.

VIRT.

USUS Alvi profluvia chronica.

## RADIX MATALISTA.

Obscura.  
*Americ.*

QUAL.

VIRT. Cathartica.

USUS.

RADIX SERPENTARIÆ. *Vide Aristolo-*  
*chia.**N. B.* Ubi ad manus non est, eidem substitui posse radicem achilleæ millefolii nuper didicimus.

## RADIX TIMAC.

Obscura.  
*Ind. occident.*

QUAL.

VIRT. Diuretica?

USUS Hydrops.

## RANUNCULUS ABORTIVUS.

Folia.

CL. *Polyand. O. Polyg.*

QUAL. Acris; vesicans.

VIRT.

USUS Syphilis?

## RANUNCULUS ACRIS.

_____	ALPINUS.	Folia,
_____	ARVENSIS.	
_____	BULBOSUS.	
_____	FLAMMULA.	
_____	ILLYRICUS.	seu
_____	LINGUA.	
_____	SCELERATUS.	caulis
_____	THORA.	
		recens.

CL. & O. *præced.**In locis umbrosis.*

QUAL. Venenata: Acris; corrodens.

VIRT.

USUS Foliorum ranunc. acris et ranunc. scelerati, et bulbi ranunc, bulbosi *externus*: Arthrodynia rheumatica. *Carpo adplicata* forma pultis quibusdam horis ante paroxysmum et ibi relictæ per 8 aut 12 horas: Intermittentes rebelles.

PRÆP. Aqua destillata ex ranunculo flammula, et ran. lingua parata, emeticum præstantissimum præbet.

## RANUNCULUS FICARIA. Radix recens.

CL. & O. *præced.**Perennis.*OF. *Chelidonium minus.*

QUAL. Subinsipida.

VIRT. Cosmetica; diuretica.

USUS.?

RAPHANUS SATIVUS. Radix recens;

*succus.*

CL. *Tetradyn.* O. *Siliq.* *Hortensis.*

OF. *Raphanus.* G. *Radis.* H. *Rábanos.*

QUAL. In principio acri residens.

VIRT. Stimulans; diuretica; resolvens; rubefaciens.

USUS *succi expressi*: scorbutus; asthma;  
raucedo; ischuria.

RHAMNUS CATHARTICUS. Baccæ;

*succus inspissatus.*

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Arborea.*

OF. *Spina cervina.* G. *Nerprum.* H. *Ram-*  
*no catártico, ó espiná cervina.*

QUAL. Sapor nauseosus, amarus; odor in-

gratus.

VIRT. Cathartica; diuretica.

USUS *decocti*: Hydrops; cachexiæ; syphilis?

DOS. Drach. ij baccarum ad libram j aquæ.

PRÆP. Syrupus ex succo expresso et saccharo.

RHAMNUS FRANGULA. Cortex interior.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa; in locis humidis,*  
*umbrosis, nemorosis.*

OF. *Frangula.* G. *Aune noir; bourdaine.*  
H. *Arraclan.*

QUAL. Sapor amarus, stypticus.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; an-

thelminthica.

USUS Hydrops; psora; vermes; varix ani.

DOS. Drach. semis-ij.

**RHAMNUS ZIZYPHUS.** Baccæ.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Jujubæ.* G. *Jujubier.* H. *Azufayfas.*

QUAL. Mucilaginoso-dulcis.

VIRT. Lubricans; expectorans.

USUS Tussis; stranguria.

PRÆP. Syrupus.

**RHAMNUS JUJUBA.** Baccæ.

CL. & O. *Præced.* *Ind. orient.*

G. *Jujubier cotonneux.*

QUAL. et VIRT. *præced.*

**RHEUM PALMATUM.** Radix.

CL. *Enneand.* O. *Trigyn.* *Perennis; Asie septent.; passim hortensis.*

OF. *Rhabarbarum verum.* s. *Sibericum.*

s. *Turcicum.* G. *Rhubarbe.* H. *Rui-*  
*barbo.*

QUAL. Lutea: In principio mucilaginoso-resinoso et salino peculiari (*oxalas calcis*) præcipue residens. Odor radicis recentis nauseosus; sapor acris, amarus, substypticus, nauseosus.

N. B. Sal rhei, ex acido oxalico et calce constans, male pro selenite habitus fuit.

VIRT. Cathartica; roborans; antacida; stomachica; anthelminthica.

USUS Diarrhœa; colica; dysenteria sub finem; rhachitis; obstructio viscerum abdom.

DOSIS *pulv.* Gran. x-drach. j. *Infus.* drach. j ad unc. vj-viii. aquæ.

QUAL. Odor teter: Sapor acidulo-styp-  
ticus.

VIRT. *foliorum*: Diuretica; sudorifica.

USUS *infusi*: Rheumatismus; cynanche  
mucosa; dysenteria; morsura.

PRÆP. Roob fructus, et syrupus.

RIBES RUBRUM. Baccæ recentes; succus.

CL. & O. *præced.*

*Fruticosa.*

OF. *Ribes rubrum*. G. *Groseilles rouges*.

H. *Agracejo*.

QUAL. Sapor intense acidus.

VIRT. Refrigerans.

USUS Febres; scorbutus.

PRÆP. Roob; syrupus.

RICINUS COMMUNIS. Oleum ex semine  
decorticato expressum.

CL. *Monæc.* O. *Monadelp.*

*Biennis; Ind. &  
utriusque.*

OF. *Cataputia major*; *ricinus major*:

*Oleum ricini*. s. *Oleum palmæ christi*.

s. *Oleum de kerua*. G. *Huile de ricin*.

H. *Aceite de Riccino*. *Tartagos*.

QUAL. *seminum*: Oleosa. *Corticis semi-*  
*num*: Acris; venenata.

VIRT. *olei fixi seminum decorticat*: Leni-  
ter motum peristalticum ciens, cathar-  
tica; anthelminthica.

USUS *olei*: Obstipatio; dysenteria; ileus;  
nephritis; colica plumbea; tænia.

DOSIS. Unc. semis-ij in haustu alcoholis  
diluti cum saccharo.



## ROSA ALBA.

Petala.

CL. *Icosand. O. Polygyn.* *Fruticosa; hortensis.*G. *Rose blanche.* H. *Rosa blanca.*

QUAL. et VIRT. Rosæ gallicæ.

## ROSA CANINA. Fructus a semine liberatus.

CL. & O. *præced.**Fruticosa.*OF. *Rosa sylvestris: Fructus cynosbati.*G. *Eglantier de chien; cynorrhodon.*H. *Escaramujo.*

QUAL. Odor fragrans; sapor dulci-stypticus.

VIRT. Eccoprotica.

USUS.

PRÆP. Roob; conserva; decoctum.

## ROSA CENTIFOLIA.

——— DAMASCENA.

} Petala.

CL. & O. *præced.**Fruticosa.*G. *Rose cultivé, Rose de Damas.* H. *Rosa de Alejandria.*

QUAL. et VIRT. Sequentis.

PRÆP. Aqua; alcohol; oleum volatile.

## ROSA GALLICA.

Petala.

CL. & O. *præced.**Fruticosa.*OF. *Flores rosarum rubrarum.* G. *Fleurs des roses.* H. *Rosa rubra o Castellana.*

QUAL. Odor fragrans; sapor substypticus.

VIRT. Leviter adstringens.

USUS præcipue cosmeticus: Profluvia.

PRÆP. Infusum aquosum *vulgo* tinctura; conserva; mel; syrupus.

N. B. Fungi rosarum sunt excrescentiæ a punctura insecti, *Cyneps rosæ* dicti, ortæ.

ROSMARINUS OFFICINALIS. Folia; summitates florentes.

CL. *Diand. O. Monog.* *Hortensis; fruticosa.*

OF. *Rosmarinus Hispanicus. s. Hortensis: flores anthos. G. Romarin. H. Romero.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor aromaticus, calidus.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga; stomachica. *Externe: Resolvens.*

USUS *infusi*: Dyspepsia; chlorosis; histeria; tertiana; asthenia nervosa.

PRÆP. Aqua; alcohol; oleum volatile.

RUBIA TINCTORUM. Radix.

CL. *Tetrand. O. Monog.* *Perennis.*

OF. *Rubia tinctorum. G. Garance. H. Rubia de tintoreros, Granza.*

QUAL. Præstans: In extractivo adstringente residens; rubra; styptico-amara.

VIRT. Adstringens; roborans; diuretica; urinam et ossa tingens.

USUS *decocti*: Pneumonitis notha; morbi pulmonum et hepatis pituitosi; rhachitis; physconia abdomin.; icterus; amenorrhœa.

dos. Unc. j ad libram iij aquæ coctæ ad libram ij Sumend. unc. iij ter quaterve de die.

RUBUS ARCTICUS. Baccæ; seu fructus recens.

CL. *Icosand. O. Polygam. Fruticosa; Perennis; Norlandicæ.*

OF. *Baccæ Norlandicæ. G. Tramboisier arctique.*

QUAL. Odor fragrans; sapor acidulus.

USUS Synochus; febres biliosæ.

RUBUS CHAMÆMORUS. Fructus recens.

OF. *Chamæmori baccæ. G. Ronce. H. Zarza, pequeño moral.*

QUAL. Inodora; aquosa.

VIRT. Refrigerans.

USUS.

RUBUS IDÆUS. Fructus recens.

CL. & O. *Præced. Suffruticosa; Perennis.*

OF. *Fructus rubi idæi. G. Framboises. H. Sangüesa.*

QUAL. Sapor acidulo-dulcis, odor gratus; fragrans.

VIRT. Refrigerans.

USUS Febres; scorbutus.

PRÆP. Aqua; succus; roob; acetum.

RUMEX ACETOSA. Herba recens; radix; semen.

CL. *Hexandr. O. Trigyn. Perennis.*

OF. *Acetosa vulgaris*. s. *Nostras*. g. *Oseille ordinaire*. h. *Acedera*.

QUAL. *Herbæ recentis*: Sapor acidus. *Radiciſ & ſeminum* Acido-austerus, amarus.

VIRT. Antiseptica.

USUS *herbæ recentis vel succi*: Scorbutus ; morbi cutis. *Herbæ contusæ* forma cataplasmatidis : ulcera serophulosa.

RUMEX ACUTUS. Radix; herba; semen.  
CL. & O. præced. *Perennis; in locis humidis.*

OF. *Lapathum acutum*; *oxylapathum*. g. *Patience aiguë*. h. *Lapato*.

QUAL. Styptica ; nauseosa ; sapor amaricans , acidulus.

VIRT. Adstringens.

USUS *decocti radiciſ*: Psora , aliique morbi cutis , *Extern.* Ulcera laxa.

RUMEX ALPINUS. Radix.

CL. & O. præced. *Perennis; alpina Europ. austr.*

OF. *Rhabarbarum monachorum*. g. *Ruibarbe des moines*. h. *Ruibarbo de monges*.

QUAL. Sapor amaro-austerus.

VIRT. Adstringens.

USUS Ulcera.

RUMEX CRISPUS. Radix.

CL. & O. præced. *Perennis.*

QUAL.

VIRT.

USUS,

RUMEX HYDROLAPATHUM (*Hort. Kew*)  
Radix.

CL. & O. *præced.*

*Perennis.*

OF. *Lapathum aquaticum; hydrolapathum.* G. *Patience aquatique.*

QUAL. Sapor amarus, acris, stypticus.

VIRT. Adstringens; resolvens.

USUS *decocti*: Morbi cutis; stomacace?

*Extern.* forma lotionis: Ulcera.

DOSIS: Drach. ij-unc. semis ad libram j aquæ.

RUMEX PATIENTIA.

OF. *Patientiæ herba.* G. *Patience.* H. *Yerba de la paciencia.*

RUMEX SANGUINEUS.

Radix.

CL. & O. *præced.*

*Biennis.*

OF. *Lapathum sanguineum.*

QUAL. Sapor austerus.

VIRT. Adstringens.

USUS Dysenteria; ulcera.

RUMEX SCUTATUS.

Herba.

CL. & O. *præced.*

*Biennis; Europ. austr.*

OF. *Acetosa rotundifolia.* G. *Oseille ronde.*

QUAL. Sapor grate acidus.

VIRT. Refrigerans.

USUS.

RUSCUS ACULEATUS.

Radix.

CL. *Diæc.* O. *Syng.*

*Fruticosa; alpina.*

OF. *Ruscus*; *bruscus*. G. *Petit houx*, *tragon*. *Houx trelon*. H. *Brusco*.

QUAL. Sapor subdulcis, dein amarus, fere ut solani dulcamaræ.

VIRT. Roborans; diuretica; resolvens.

USUS *decocti*: Physconia abdom.; morbi cutis; icterus; hydrops.

RUSCUS HYPOGLOSSUM. Herba.

CL. & O. *præced.* Fruticosa; Europ. austr.

OF. *Uvularia*. G. *Herbe aux langues*, *Laurier Alexandrin*.

QUAL.

VIRT. Adstringens.

USUS Laxitas uvulæ.

RUTA GRAVEOLENS. Herba; semen.

N. B. Colligenda antequam flores emittit.

CL. *Decand.* O. *Monog.* Suffruticosa, Perennis; alpina; hortensis.

OF. *Ruta hortensis*. G. *Ruë sauvage*. H. *Ruda*.

QUAL. Heroica: In oleo volatili residens; odor teter; sapor nauseosus, acris, amaricans.

VIRT. Sudorifica; carminativa; antiseptica; antispasmodica; menagoga; anthelmintica; phthiriaca; resolvens; rubefaciens.

USUS *internus*: infusi, aut decocti aquosi vel vinosi: Hysteria cum amenorrhœa; spasmi; cephalalgia; singultus; epilepsia; flatulentia. *Externus* decocti vino-

si cum melle rosaceo : Ocæna et exulceratio gingivarum putrida cum carie alveolarum dentium (PLENK). Forma fots aut cataplasomatis: Gangræna, ulcera putrida.—Halitus hominis sani qui rutam masticavit, oculo aperto admissus caligini seu debilitati visus e lectura assidua profuit. Eodem scopo vapor decocti per infundibulum oculo admissus servire potest.

PRÆP. *ex herba*: Acetum; oleum volatile; aqua; conserva; extractum ope alcoholis paratum.

## S.

SAGUS SEU PALMA FARINARIA  
(RUMPHII). Farina medullæ.  
*Palma; Ind. orient.*

LINNÆUS grana sagu ex Filice : *Cicas circinalis* dicto derivat.

OF. *Sagu seu sago grana. G. Sagou. H. Sagu.*

N. B. Grana trituratione medullæ cum aqua et exsiccatione parantur.

QUAL. Farinacea; mucilaginoso.

VIRT Nutritiva.

VSUS Cum succo citri et aliquando cortice flavo citri, cinnamomo et saccharo: Dysenteria; tabes.



SACCHARUM OFFICINARUM. Succus  
plantæ expressus, inspissatus et crys-  
tallisatus.

CL. *Triand. O. Digyn.* *Perennis; Egypt.; Ind.*  
*orient. et occident.*

OF. *Saccharum album; canthum.* G. *Sucre.*  
H. *Azucar.*

QUAL. in principio acido et mucilaginoso re-  
sidens; Sapor gratus, salino-dulcis.

VIRT. Demulcens; antiseptica, nutriens.

USUS Raucedo; tussis. *Extern.* pulvis oculo inflatus: Macula corneæ.

PRÆP. Syrupus simplex; alcohol dilutum  
*Rhum* dictum; acidum oxalicum. - Sac-  
charum est ingrediens universale con-  
servarum et syruporum.

SALIX ALBA.

——— CAPREA.

——— FRAGILIS.

——— PENTANDRA.

——— VITULINA.

} Cortex ramulo-  
rum.

CL. *Dicæc. O. Diand.*

*Arboræ.*

OF. *Salix.* G. *Saule.* H. *Sauce.*

QUAL. sapor amaro-stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; stomachica.

USUS *salicis albæ* præcipue ut succeda-  
neum cinchonæ: Intermittentes, ali-  
que morbi in quibus cinchona officina-  
lis adhibetur.

dos *pulveris*: Gran. xx-drach. j. - Unc.

semis j ad libram j  $\beta$  aquæ coctæ ad libram j.

PRÆP. Extractum.

SALVIA HORMINUM.

Semen.

CL. & O. præced.

*Perennis; hortensis.*

VARIET. A. *Coma violacea.* B. *Rubra.*

OF. *Semen hormini.* G. *Hormin.* H. *Simente de Golondrinas.*

QUAL. Odor fragrans; sapor amaricans, mucilaginosus.

VIRT.

USUS Ophthalmia.

SALVIA OFFICINALIS.

Folia; Herba.

CL. *Diand.* O. *Monog.*

*Perennis; hortensis.*

OF. *Salvia.* G. *Sauge.* H. *Salvia.*

QUAL. In oleo volatili et extractivo adstringente residens; odor fortis, fragrans; sapor amaricans, substypticus.

VIRT. Nervina; stomachica; menagoga. *Extern.: Resolvens.*

USUS *infusi vinosi*: Tumor mammarum ex lacte post ablactationem (VAN SWIETEN); leucorrhœa. — *Infusi aquosi* forma gargarismatis: Cynanche mucosa; relaxatio gingivarum.

SALVIA SCLAREA.

Herba.

CL. & O. præced.

*Biennis; Europ. austr.*

OF. *Sclarea; gallitrichum.* G. *Orvalle.* H. *Amaro.*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT. Fortior præced. nervina; errhina.  
 USUS Leucorrhœa; colica; hysteria.

SALSOLA KALI.

———— SATIVA.

———— SODA.

} Herba.

CL. *Pentand. O. Digyn.* *Europ. maritime austr.*

G. *Soude kali.* H. *Barrilla.*

PRÆP. Soda.

SAMBUCUS EBULUS. Baccæ recentes;  
 cortex interior; folia; flores; semen;  
 radix.

*Fruticosa.*

CL. *Pentand. O. Trigyn.*

OF. *Ebulus.* G. *Hieble*; *sureau nain.* H.  
*Yezgo*, *carnes fiambres.*

QUAL. Odor teter; foetidus; sapor acris,  
 nauseosus, amarus.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; eme-  
 tica; narcotica.

USUS *decocti* cort. et foliorum: Hydrops;  
 psora; leucorrhœa.

DOSIS foliorum vel corticis drach. j-ij. *Suc-*  
*ci baccarum* unc. semis-j.

PRÆP. Roob baccarum.

SAMBUCUS NIGRA. Cortex interior;

Turiones; flores; baccæ recentes.

OF. *Sambucus.* G. *Sureau ordinaire.* H.  
*Sauco.*

QUAL. et VIRT. *corticis et turionum*: Ea-  
 dem ac prioris. *Baccarum*: Sapor gra-  
 te acidulus.

VIRT. *florum*: Diaphoretica. *Extern.* res-  
solvens.

USUS *infusi corticis vel turionum*: Hydrops;  
erysipelas.

DOSIS *florum, corticis vel turionum*: Drach.

ij-unc. semis ad libr. j aquæ pro infuso.

PRÆP. Roob ex baccis recentibus: Febres.

SANGUISORBA OFFICINALIS. Radix.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Perennis; in pratis  
humidis.*

OF. *Pimpinella Italica*; *sanguisorba*. G.  
*Pimprenelle noire*. H. *Pimpinella*.

QUAL. Sapor stypticus.

VIRT. Adstringens; roborans.

USUS *Hæmorrhagiæ*; *sub finem dysentericiæ*.

SANICULA EUROPÆA. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; in pratis.*

OF. *Saniculæ herba*. G. *Sanicle*. H. *San-  
nicula*.

QUAL. Subinsipida; inodora.

VIRT. Resolvens?

USUS.

SANTALUM ALBUM. Lignum.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient.*

Idem ac *Sirium myrtifolium* Linn. esse  
videtur (DRIANDER).

OF. *Santalum citrinum*. s. *album*. G. *San-  
tal*. H. *Sândalo blanco*.

QUAL. Ligni citrini: In oleo volatili et  
principio resinoso residens; odor fra-

grans , subambrosiacus ; sapor amaricans.

VIRT. Stimulans ; sudorifica.  
usus Rheumata.

SANTOLINA CHAMÆCYPARISSUS. Herba; folia.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.* *Fruticosa Europ. austr.*

OF. *Abrotanum montanum* ; *abrotanum fœmina* ; *santolina. c. Aurone femelle. h. Abrotano hembra.*

QUAL. Odor nidorosus ; sapor grate aromaticus , amarus.

VIRT. Roborans ; carminativa ; anthelmintica.

usus Leucorrhœa ; vermes.

SAPINDUS SAPONARIA. Fructus,

CL. *Octand. O. Trigyn.* *Arborea; Brasil. et Jamaic.*

OF. *Nuculæ saponariæ.*

QUAL. Spumescens , saponacea ; sapor intense amarus.

VIRT. Stomachica ; deobstruens.

usus *extracti vel tincturæ* : Chlorosis. (Lewis).

SAPONARIA OFFICINALIS. Radix; folia.

CL. *Decand. O. Digyn.* *Perennis; hortensis; in pratis humidis, profundis.*

OF. *Saponaria. c. Saponaire. h. Jabonera.*

QUAL. *radicis recentis* : Trita spumes-  
cens ; saponacea ; sapor leviter acris,  
amaricans.

VIRT. Diuretica ; anthelminthica.

USUS *decocti* : Morbi cutanei ; blennorrhæ-  
gia ; icterus ; syphilis ? Ulcus phagedæ-  
nicum ? Leucorrhœa.

### SATUREJA CAPITATA.

Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.*

*Suffruticosa ; Cretæ  
et Archipel.*

OF. *Thymus Creticus.* G. *Thym de Crête.*

H. *Tomillo cabezudo.*

QUAL. et VIRT. *Thymi* sed fortior.

USUS.

### SATUREJA HORTENSIS.

Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua ; hortensis ; Europ. austr.*

OF. *Satureja.* G. *Sarriete.* H. *Ajedrea.*

QUAL. Odor fragrans ; sapor aromaticus.

VIRT. Nervina ; stimulans ; menagoga ; sto-  
machica ; aphrodisiaca ?

USUS Anorexia ; anaphrodisia.

### SAXIFRAGA CRASSIFOLIA.

Radix.

CL. *Decand.* O. *Digyn.*

*Perennis ; alpina.*

QUAL.

VIRT. Eximie antiseptica. (PALLAS).

USUS.

### SAXIFRAGA GRANULATA.

Radix ; se-

men.

CL. & O. *præced.*

*Perennis ; alpina.*

OF. *Saxifraga alba*. G. *Saxifrage blanche*. H. *Saxifraga*.

QUAL. Acris ; pungens.

VIRT. Diuretica.

USUS.

SCABIOSA ARVENSIS. Herba ; flores.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Scabiosa*. G. *Scabieuse ordinaire*. H. *Escabiosa*.

QUAL. Sapor leviter amarus.

VIRT. ?

USUS Morbi cutis ; psora?

SCABIOSA SUCCISA.

Radix.

CL. & O. *præced.*

*Perennis in pratis humidis ; nemorosis.*

OF. *Succisa ; morsus diaboli*. G. *Succise , Mors du Diable*. H. *Mordisco de Diablo*.

QUAL. Sapor dulco-amaricans.

VIRT.

USUS,

SCANDIX CEREFOLIUM. Herba recens.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua ; hortensis.*

OF. *Chærefolium ; cerefolium ; chærophyllum*. G. *Cerfeuil*. H. *Perifollo*.

QUAL. Leniter odorifera ; aromatica.

VIRT. Diuretica ; deobstruens ; lactifera.

USUS Hæmoptysis ? tabes ? hæmorrhoids ?  
physconia abdominalis.



SCILLA MARITIMA. Radix recens; vel  
siccata.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Perennis; Europ. austr.*  
*ad littora maris arenosa.*

OF. *Radix squillæ alba & rubra.* G. *Scille;* *squille.* H. *Cebolla albarrana.*

QUAL. Heroica: In principio acri volatili  
residens; sapor intense amarus, nau-  
seosus, acris.

VIRT. Diuretica; expectorans; emetica;  
cathartica.

usus Hydrops; icterus; pneumonia notha;  
asthma pituitosum (cum opio, aut aro-  
mate, aut hydragyro). *Extern.* Ven-  
tri adfric. Hydrops.

DOSIS. *radicis recentis:* Gran. v-xx. *Sic-  
catæ:* Gr. ij-vj—In infuso drach. ij ad  
libr. j vini.

PRÆP. Infusum vinosum; acetum; oxy-  
mel scilliticum.

SCORZONERA HISPANICA. Radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Biennis; hortensis.*

OF. *Scorzonera.* G. *Scorsonere.* H. *Es-  
corzonera.*

QUAL. Oleracea; mucilaginoso.

VIRT.?

usus.

SCORZONERA HUMILIS. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in pratis apricis.*

OF. *Radix scorzonerae.*

N. B. Pharmacopolæ huic scorzoneram  
Hispanicam sæpe substituunt.

QUAL. Amaricans; lactescens.

VIRT.

USUS.

SCROPHULARIA AQUATICA. Folia.

CL. *Didyn*, O. *Angiosp.* *Perennis; in aquosis, paludosis; Europ. austr.*

OF. *Scrophularia aquatica*. G. *Grande scrofulaire*. H. *Escrofularia*.

QUAL. Odor debilis foetidus; sapor amarus.

VIRT. Stomachica; carminativa.

USUS Sennæ addita in infuso saporem ejus  
nauseosum corrigit.

SCROPHULARIA NODOSA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in fossis et*

OF. *Scrophularia foetida*. *humidis umbrosis.*

QUAL. Præstans: Odor teter, foetidus, sic-  
cando avolans; sapor amaricans, nau-  
seosus.

VIRT. Carminativa; anthelminthica; su-  
dorifica.

USUS Scrophula; varix ani; psora; cy-  
nanche.

SCUTELLARIA GALERICULATA Herba.

CL. *Didyn*. O. *Angiosp.* *Perennis; ad stagna*

OF. *Herba tertianaria*. *et fossas.*

QUAL. Odor alliaceus; sapor amarus.

VIRT.

USUS.

SECALE CEREALE. Seminis farina; fermentum panis.

CL. *Triand.* O. *Digyn.*

*Annua.*

OF. *Secale.* G. *Seigle.* H. *Centeno.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens. *Fermenti*: Leniter irritans.

USUS fermenti panis pro sinapismis.

SEDUM ACRE. Herba recens; succus expressus.

CL. *Decand.* O. *Pentag.* *Perennis, sempervirens.*

OF. *Sedum minus.* G. *Vermiculaire brûlante.* H. *Uvas de gato, siempreviva menor.*

QUAL. In principio acri residens; subcorrosiva.

VIRT. Diuretica; emetica.

USUS *herbæ recentis contusæ*: Cancer; ulcus phagedænicum.

SEDUM TELEPHIUM. Radix; herba.

CL. & O. *præced.*

*Perennis.*

OF. *Telephium*; *crassula major.* G. *Orpin, reprise.* H. *Cangilona.*

QUAL. Sapor mucilaginosus, subacidus.

VIRT.

USUS Varix ani; paronychia; scorbutus.

SEMECARPUS ANACARDIUM. Fructus.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Anacardium orientale.* s. *Anacar-*

*dium verum officinarum. g. Noix à  
marquer. h. Anacardios.*

QUAL. *nucis*: Oleosa. *Succi inter corti-  
cem fructus externum & internum*: acris,  
ad notanda lintea characteribus nigro-  
fuscis utilis.

VIRT. *Nuclei*: Nutriens: *Putaminis* caus-  
tica.

USUS Succus acris cum oleo et saccharo in  
syphilitide adhibetur in India orientali;  
item in morosi et oblibione.

### SEMEN ADIOWAEN. (BENGALIS).

*Obscura.*

*An Ammi Copticum?*

*Ind. orient.*

QUAL. Odor suaveolens; sapor gratus, aro-  
maticus, quasi ex satireja et mentha  
piperita compositus.

VIRT. Excitans; stimulans; carminativa.

USUS Asthenia nervosa; dyspepsia; flatu-  
lentia; cardialgia.

### SEMEN AJAVÆ.

*Obscura.*

*Ind. orient.*

USUS Arthritis vaga, atonica.

### SEMPERVIVUM TECTORUM. Succus herbæ recentis.

CL. *Dodecand. O. Dodecag.* *Perennis.*

OF. *Sedum. s. Sempervivum majus. g.  
Soubarbe. n. Siempreviva mayor.*

QUAL. *succi*: Sapor acido-austerus; acrius-  
culus.

VIRT. Refrigerans; adstringens.

USUS Febres; combustura; aphtha; clavus.

# SENECIO VULGARIS.

Herba.

CL. *Syngen. O. Polyg. superfl.*

*Annua.*

OF. *Herba senecionis. G. Seneçon. H. Senecio, Yerba cana.*

QUAL. Sapor salsus; oleraceus.

VIRT. Anthelminthica.

USUS forma cataplasmatibus scopo emolliendi et resolvendi. *Internus succi*: Vermes equorum (Anglis *Botts* dicti); lumbrici.

# SERRATULA AMARA.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.*

QUAL.

VIRT.

USUS *decocti*: Intermittentes; syphilis?

# SESAMUM ORIENTALE.

Semen.

CL. *Didyn. O. Angiosp.*

*Annua.*

OF. *Semen sesami. G. Grains de sesame.*

*H. Sesamo, alegria, ajonjolí.*

QUAL. Oleosa.

VIRT. Emolliens.

USUS Dolores; pruritus; marasmus; phlegmone.

# SESELI TORTUOSUM.

Semen.

CL. *Pentand. O. Digyn. Perennis; Europ. austr.*

OF. *Seseli Massiliense. G. Seseli de Marseille. H. Comino de Marsella.*

QUAL. Sapor acris; odor aromaticus.

**SIGESBECKIA ORIENTALIS.** Herba.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.*

QUAL. Odor ambrosiacus; sapor amarus.

VIRT.

USUS Stranguria; calculus? Podagra? Leucorrhœa?

**SINAPIS ALBA.** Semen; farina seminis.

CL. *Tetradyn. O. Siliqu.* *Annua.*

OF. *Semen erucæ. s. Sinapios albæ. G. Sèneve blanc.*

QUAL. In principio acri cum oleo volatili et fixo residens.

VIRT. Rubefaciens; stimulans.

USUS *externus* in sinapismis. *Internus* idem ac sequentis.

**SINAPIS NIGRA.** Semen; farina seminis.

CL. & O. *præced.* *Annua; in campis sub tritico; hortensis.*

OF. *Semen sinapeos nigræ. G. Sènevé noir; grains de moutarde H. Mostaza.*

QUAL. Eadem sed præstantior et acrior priori.

VIRT. Stimulans; subemetica; diuretica; cathartica. *Externe*: Rubefaciens; vesicans.

USUS *internus*: Dyspœsia; asthma pituitosum; obstipatio; scorbutus; hydrops; intermittentes; paralysis. *Externus*: Herpes; arthrodynia rheumatica.

## SIRIUM MYRTIFOLIUM.

*Vide Santalum album.*DOSIS *seminum integrorum* : Drach. ij-  
unc. semis.PRÆP. Serum Sinapinum : Farina pro si-  
napismis.

## SISON AMOMUM.

Semen.

CL. *Pentand. O. Digyn.*OF. *Amomum vulgare*. H. *Ameos*.QUAL. Sapor grate aromaticus , amari-  
cans.

VIRT. Stimulans ; carminativa.

USUS Flatulentia ; sterilitas ?

SISYMBRIUM NASTURTIIUM. Herba  
recens ; succus expressus.CL. *Tetradyn. O. Siliqu.* *In rivis et locis  
humidis.*OF. *Nasturtium aquaticum*. G. *Cresson  
de fontaine*. H. *Berros*.QUAL. In principio acri residens ; sapor  
acris , amaricans ; trita odorem pungen-  
tem spargens.

VIRT. Diuretica ; antiscorbutica.

USUS Scorbutus ; obstipatio.

PRÆP. Succus , dosi unc. ij ; conserva.

## SISYMBRIUM SOPHIA.

Semen.

CL. & O. *præced.**Annua ; in sabulosis.*OF. *Semen sophiæ*. H. *Yerba de los ciru-  
janos*.



QUAL. In principio acri residens; acris; fervida.

VIRT. Anthelminthica.

USUS.

## SISYMBRIUM TENUIFOLIUM.

CL. & O. *præced.*

*Biennis.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac Sisymb. nasturtii,

## SIUM NINSI.

Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

*Perennis; Japonica.*

OF. *Radix ninsi; ninzin; ninsing.* H. *Ninsi.*

QUAL. Sapor subdulcis, amaricans, suavis, subaromaticus.

VIRT. Cardiaca; impinguans.

USUS Anaphrodisia? asthenia; marasmus?

## SIUM NODIFLORUM.

Succus herbæ.

QUAL.

VIRT.

USUS Morbi cutis (WITHERING).

DOSIS succi: Unc. j-iv. omni mane.

## SMILAX CHINA.

Radix.

CL. *Diœc.* O. *Hexand.* *Perennis; Chinæ, Persiæ.*

OF. *Radix Chinæ orientalis.* G. *Squinea; esquine.* H. *China.*

QUAL. Inodora; sapor mucilaginosus.

VIRT.

USUS Syphilis; podagra?

DOSIS. Unc. j ad libram j aquæ.

SMILAX SARSAPARILLA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Sarmentosa ; Perennis.*  
*Peruv. Mexic. Brasil.*

OF. *Radix sassaparillæ. G. Salsepareille. H. Zarzaparrilla.*

QUAL. *Præstans : Sapor mucilaginosus, amaricans.*

VIRT. *Diuretica ; diaphoretica ; alterans.*

USUS *Syphilis ; cachexiæ ; arthritidis.*

DOS. *pulveris : Drach. j-ij. — In decocto*  
*unc. j ad libr. ij aquæ coctæ ad libr. j.*

SOLANUM DULCAMARA. Stipites repentes.

CL. *Pentand. O. Monog.* *Sarmentosa ; in locis*  
*humidis, umbrosis.*

OF. *Dulcamara. G. Doulce-amère ; morelle grimpante. H. Dulca-amara.*

QUAL. *recentis : Heroica : odor teter, virosus ; sapor amaro-dulcis, nauseosus.*

VIRT. *Diuretica ; alterans ; resolvens.*

USUS *decocti : Arthrodynia ; morbi cutis ; amenorrhœa ; icterus ; syphilis ; dislochia ; contusura.*

DOSIS *stipitum recent. contusorum : Unc. semis-ij ad libram iij aquæ coctæ ad libras ij. Quotidie sumatur libr. j-ij cum vel sine lacte.*

SOLANUM NIGRUM. Herba.

CL. & O. *præced.* *Anna.*

OF. *Solanum vulgare. G. Morelle à fruit*

*noir.* H. *Solano negro* ; *yerba mora*.  
 QUAL. Venenata : in principio narcotico, re-  
 sidens ; odor teter ; virosus.

VIRT. Narcotica ; diuretica ; resolvens.

USUS Idem ac papaveris somniferi. *Extern.*  
 Proctalgia ; phlegmone ; paronychia ;  
 scirrhus ; ulcus.

DOS. *pulveris* : Gran. j-vj.

SOLDANELLA ALPINA.

Folia.

CL. *Pentand.* O. *Monog.*

*Perennis.*

SOLIDAGO VIRGA AUREA.

Herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.*

*Perennis ; alpi-  
 na in montibus  
 nemorosis.*

OF. *Virga aurea* ; *consolida Saracenica*.

G. *Verge d'or.* H. *Vara de oro.*

QUAL. Sapor amaricans.

VIRT. Diuretica.

USUS Ulcus ; calculus.

SONCHUS OLERACEUS.

Herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.*

*Annua ; hortensis.*

OF. *Sonchus.* G. *Laitron doux.* H. *Cer-  
 raja.*

SOPHORA HEPTAPHYLLA. Radix: se-  
 men.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Fruticosa ; Ind. orient.*

OF. *Anticholerica.*

QUAL. *utriusque* : Sapor intense amarus.

VIRT.

USUS Cholera ; colica ; dysuria.

**SORBUS AUCUPARIA.** *Baccæ.*

*CL. Icosand. O. Trigyn. Arborea.*

*G. Sorbier des oise leurs, Cochine. H. Serval de Cazador.*

*QUAL. Succi: Sapor acido amarus.*

*VIRT.*

*USUS forma roob: Hydrops; calculus renalis; stranguria rebelis?*

**SORBUS DOMESTICA.** *Fructus seu baccæ.*

*CL. & O. præced. Arborea.*

*OF. Sorbus. G. Sorbier domestique, Cormier. H. Serval.*

*QUAL. Sapor acido-acerbus.*

*VIRT. Adstringens.*

*USUS.*

**SPARTIUM SCOPARIUM.** *Herba; summitates; semen.*

*CL. Diadelph. O. Decand. Fruticosa; in arenosis, umbrosis.*

*N. B. A quibusdam Genista tinctoria huic plantæ substituitur.*

*OF. Genista. G. Génêt à palais.*

*QUAL. Sapor amarus, nauseosus.*

*VIRT. Diuretica; cathartica.*

*USUS. Hydrops.*

*DOSIS summitatum recentium: Unc. semis ad unc. xvj aquæ coctæ ad unc. viij. Sumatur unc. semis omni bihorio, donec alvum et urinam moveat, et repetatur quotidie seu alternis diebus. (CULLEN).*

*PRÆP. Extractum; infusum, et decoctum.*

**SPIGELIA ANTHELMIA.** Herba et radix.  
 CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua; Ind. occident.*  
 G. *Spigèlie anthelmintique.*  
 QUAL. Tetra; foetida.  
 VIRT. Narcotica; anthelminthica.  
 USUS Lumbrici.

**SPIGELIA MARILANDICA.** Herba.  
 CL. & O. *Præced.* *Perennis; Amer. septentr.*  
 OF. *Spigelia.*  
 QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.  
 USUS *pulveris, vel infusi aut decocti:*  
 Lumbrici.  
 DOS. *pulveris:* Gran x.—*In infuso:* Drach.  
 ij ad libram j aquæ.—*In decocto:* Unc.  
 semis ad libram j aquæ.

**SPILANHUS ACMELLA.** Herba; semen.  
 CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.*  
 OF. *Acmella.*  
 QUAL. Amara; sapore odoreque *Sigesbeckiæ.*  
 VIRT. Diuretica; menagoga.  
 USUS Hydrops; ischuria; calculus; leucorrhœa.

**SPINACIA OLERACEA.** Folia.  
 CL. *Diæc.* O. *Pentand.* *Annua.*  
 G. *Epinard.* n. *Espinaca.*  
 QUAL. Aquosa; oleracea.  
 VIRT. Eccoprotica.  
 USUS.

SPIRÆA FILIPENDULA. Radix, herba.  
 CL. *Icosand. O. Pentag.* *Perennis; in locis hu-*  
*midis, paludosis:*

OF. *Filipendula; saxifraga rubra. G.*  
*Filipendule. H. Filipendula.*

QUAL.

VIRT. Adstringens.

USUS Leucorrhœa; hernia.

SPIRÆA ULMARIA. Radix; folia.  
 CL. & O. *præced.* *Perennis; in pratis.*

OF. *Ulmaria; barba caprina. G. Reine*  
*des près, Ulmaire. H. Ulmaria.*

QUAL. Odor fragrans; sapor stypticus.

VIRT. Adstringens; sudorifica.

USUS Dysenteria; hernia?

STACHIS ANNUA.

———— RECTA.

CL. *Didyn. O. Gymnosp.*

} Herba.

*In collibus petro-*  
*sis, siccis.*

OF. *Herba sideritidis. H. Estaquis recta,*  
*ó Yerba de la Feridura.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS.

STACHIS SYLVATICA.

Herba.

OF. *Galiopsis. G. Sthachys.*

QUAL. Tetra; foetida.

VIRT. Narcotica.

USUS.

## STATICE LIMONIUM.

Radix.

CL. *Pentand.* O. *Pentag.**Ad litora maris.*OF. *Behen rubrum.* G. *Behen rouge.* H.*Behen rojo.*QUAL. *Styptica.*VIRT. *Adstringens.*USUS *Asthenia; hæmorrhagiæ.*

## STILLINGIA SYLVATICA.

CL. *Monœc.* O. *Monadelp.*

VIRT.

USUS *Syphilis?*STRYCHNOS COLUBRINA. Radix; li-  
gnum radicis.*N. B.* An eadem arbor ac *strychnos nux vomica?*CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient.*OF. *Lignum colubrini vulgaris.* G. *Bois de Couleuvre.* H. *Leño Colubrino.*QUAL. *Suspecta: Sapor intense amarus, acris.*VIRT. *Emetica; sudorifica; anthelminthica; fatuans.*VIRT. *Intermittentes; vermes.—Morsura serpentum?*STRYCHNOS NUX VOMICA. Fructus  
seu nuces; lignum.CL. & O. *præced.**Arborea; Ind. orient.*OF. *Nux vomica.* G. *Noix vomique.* H. *Mata can, Nuez vomica.*



QUAL. Venenata : Sapor intense amarus;  
odor virosus.

VIRT. Emetica ; menagoga ; anthelminthica.

usus Intermittentes ; dysenteria ; cardialgia ; amenorrhœa ; tænia.

DOSIS *pulveris* : Gran. v-xv. In tænia scrup. j.

## STRYCHNOS VOLUBILIS. (PALLAS). Semen.

CL. & O. *Præced.*

*Arborea. Ind. orient.*

Ignatia amara (LINN. JUN.)

OF. *Faba Ignatii. G. Vomiquier ; febe S. Ignace. H. Habas de san Ignacio.*

QUAL. Venenata ; Sapor intense amarus.

VIRT. Narcotica ; diuretica ; sudorifica ; anthelminthica.

usus Intermittentes rebelles ; amenorrhœa ; vermes ; asthma ; eclampsia.

DOSIS. *pulveris, vel in infuso* : Gran. v-xx.

N. B. Ejus antidotum est acetum.

## STYRAX BENZOIN. (DRIANDER.) Bal- samum concretum.

CL. *Decand. O. Monog.* *Arborea ; Java, Sumatrae.*

OF. *Gummi benzoës ; assa dulcis. G. Benjoin. H. Benjui.*

N. B. Purior albicans incisione exsudans mollis ; vilior colorata durior est.

QUAL. In acido peculiari et principio resinoso residens ; sapor acris, pungens ; odor fragrans ; ambrosiacus.

VIRT. Stimulans; nervina; expectorans.

USUS *acidi*: Morbi pectoris pituitosi. *Extern.* Rubedo faciei. Item ad suffimigia et ad parandum acidum Benzoicum.

DOSIS *salis acidi*: Gran. xv-drach. semis.

PRÆP. Acidum Benzoicum vulgo flores Benzoës; tinctura.

STYRAX OFFICINALIS. Balsamun con-

cretum.  
CL. & O. *præced.* *Arborea; Syriæ.*

OF. *Storax*; *gummi storacis*; *styrax calamita*. G. *Storax*. H. *Estoraque*.

QUAL. Sapor acris; odor fragrans; ambrosiacus.

VIRT. Stimulans; nervina.

USUS Idem ac præced. *Externe*: Ad suffimigia; et emplastra.

SWIETENIA MAHOGANI. Cortex ligni.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. occident.*

OF. *Cortex ligni mahogani*. G. *Ecorce du bois d'acajou*. H. *Anacardo*.

QUAL. Sapor amaro-stypticus.

VIRT. Roborans, cinchonæ æmula.

USUS Sæpe cortici cinchonæ officinalis substituitur.

SYMPHYTUM OFFICINALE. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; in pratis humilis et cinæteris.*

OF. *Symphytum*; *consolida major*. G. *Consoude*. H. *Sinfito mayor*, *suelta consuelta*.

QUAL. Principio mucilaginoso scatens.

VIRT. Involvens; emolliens.

USUS *decocti*: Stranguria; dysenteria; nephritis; hæmoptisis; hæmaturia.

## T.

TAMARINDUS INDICA. Fructus; pulpa  
fructus.

CL. *Triand.* O. *Monog.*

*Arborea.*

OF. *Fructus tamarindi.* G. *Tamarins.* H.  
*Tamarindos.*

QUAL. In acido et extractivo saccharino-  
mucilaginoso residens; sapor acidus.

VIRT. Eccoprotica; refrigerans.

USUS *decocti vel seri lactis*: Febres in-  
flammatiæ et biliosæ; icterus; dy-  
senteria.

DOSIS *in decocto*: Unc. ij ad libram j aquæ  
vel *seri lactis*.

PRÆP. Pulpa unc. j ij pro dosi. Serum lac-  
tis tamarindinatum.

TAMARIX GALLICA. Cortex radicis;  
folia.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Arborea; Europ. austr.*

G. *Tamarisc.* H. *Taray.*

QUAL. Sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS.

TANACETUM BALSAMITA. Herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg superfl.* *Europ. austr.*

OF. *Balsamita*; *costus hortorum*; *mentha Romana seu Saracenica*; *tanacetum hortense*. G. *Baume ou herbe du coq*. H. *Yerba de santa Maria*.

QUAL. Præstans: Odor nidorosus, halituosus; sapor amarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans: stomachica; menagoga.

USUS.

**TANACETUM VULGARE.** Herba; flores;

CL. & O. *præced.* semen. *Perennis.*

OF. *Tanacetum*. G. *Tanaisie*. H. *Tanaceto*.

QUAL. Præstans: In oleo volatili cum principio amaro juncto residens: Odor nidorosus, halituosus; sapor amarus, aromaticus. Luteo-tinctoria.

VIRT. Stimulans; carminativa. *Extracti*: Pure amara, stomachica.—*Seminum*: Anthelminthica? sudorifica.

USUS *infusi vinosi vel aquosi, aut extracti*: Dyspepsia; intermittentes; chlorosis; leucophlegmatia; hydrops; hysteria.—*Infusi florum vel seminum* forma enematis: Lumbrici.

*dosis herbæ*: Unc. j ad libram aquæ vel vini.—*Seminum pulv.* Gran. xx. Pro infuso drach. ij-ij ad libram semis aquæ vel lactis.

PRÆP. Extractum.

TEUCRIUM CHAMÆDRYS. Herba.

CL. *Didyn. O. Gymnosp.* *Perennis; in montanis siccis.*

OF. *Chamædrys. G. Germandrée officinale, petit chêne. H. Camedrijos.*

QUAL. Præstans: Odor aromaticus; fragrans; sapor aromaticus, amarus.

VIRT. Stimulans; stomachica; sudorifica; menagoga.

USUS *infusi*: Intermittentes; arthritis; chlorosis.

TEUCRIUM CHAMÆPITYS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua; hortensis.*

OF. *Chamæpitys; Jua arthritica. G. Petite ivette. H. Pinillo oloroso.*

QUAL. Præstans: Odor resinosus; sapor aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga; discutiens.

USUS *infusi*: Arthrodynia; arthritis.

DOS. Drach. ij-iiij ad libram j aquæ.

TEUCRIUM CRETICUM. Herba; summitates.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa.*

OF. *Polium creticum. G. Polium de Crète.*

QUAL. Sapor amaricans, aromaticus.

VIRT. Stomachica.

USUS Icterus.

TEUCRIUM MARUM. Herba; summi-  
tates.

CL. & O. *præced.* *Suffruticosa; hortensis.*

OF. *Marum verum seu Syriacum.* G. *Maron.* H. *Maro de Cortuso ó verdadero.*

QUAL. Heroica: In oleo volatili camphorino residens; odor fragrans, camphoratus; sapor acris, amarus.

VIRT. Nervina; antispasmodica; cardiaca; errhina; discutiens.

USUS *pulv. vel infusi*: Spasmi; hysteria; cachexiæ; oblivio; morbi soporosi; anosmia; asthma.

DOSIS *pulveris*: Gran. xx-xxx. In infuso aquoso vel vinoso drach. ij-iiij ad libram j.

TEUCRIUM POLIUM. Herba; summi-  
tates.

CL. & O. *præced.* *Suffruticosa; Europ. austr.*

OF. *Polium montanum.* G. *Thin blanc des montagnes.* H. *Zamarrilla.*

QUAL. Aromatica.

VIRT. Stimulans.

USUS.

TEUCRIUM SCORDIUM. Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in pratis humidis; hortensis.*

OF. *Scordium.* G. *Germandrée aquatique.* H. *Escordio.*

QUAL. Præstans: Odor alliaceus; sapor aromatico-amarus; acris.

VIRT. Antiseptica; stomachica; sudorifica;  
anthelminthica; discutiens.

USUS *externus infusi vinosi vel acetosi*;  
Ecchymoma; gangræna; ulcus.

# THALICTRUM FLAVUM.

Radix.

CL. *Polyand. O. Polyg.*

*Perennis; in pratis  
humidis.*

OF. *Thalictrum. G. Pigamon, talitron.*

QUAL. Sapor dulco-amarus.

VIRT. Eccoprotica,

USUS.

# THEA BOHEA.

Folia.

CL. *Polyand. O. Monog. Fruticosa; Chinensis.*

OF. *Thea. G. Thé. H. Te negro.*

QUAL. Odor gratus; sapor substypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS Somnolentia. Nocet debilibus.

N. B. Plures usum infusi hujus speciei  
quotidianum ferunt, dum sequentem  
ferre nequeunt.

# THEA VIRIDIS.

Folia.

G. *Thé vert. H. Te verde.*

QUAL. Odor fragrans, gratus; sapor sub-  
stypticus.

VIRT.

USUS.



**THEOBROMA CACAO.** Nucleus seu fructus, et oleum concretum vulgo Butyrum dictum.

CL. *Polyadelph. O. Pentand.* *Arborea; Amer. meridion.*

OF. *Fructus cacao: butyrum cacao. G. Cacao. H. Cacao.*

QUAL. Oleosa; ægre rancescens.

VIRT. Demulcens; involvens; nutriens.

USUS Tabes; asthenia; varix ani.

PRÆP. Oleum fixum, concretum, butyraceum;—ex fructu tosto Choccolate.

**THLASPI ARVENSE.** Semen.

CL. *Tetradyn. O. Silicul.* *Annua; in campis sub tritico æstivo.*

OF. *Thlaspi. G. Monnoyere. H. Tlaspi.*

QUAL. In principio acris residens; odor alliaceus; sapor dulco-subacris.

VIRT. ?

USUS Arthrodynia rheumatica.

**THLASPI BURSA PASTORIS.** Herba;

CL. & O. *præced.* *Annua; in viis et campis.*

OF. *Bursa pastoris. G. Bourse des bergers. H. Bolsa de pastor.*

QUAL. Aquosa.

VIRT. ?

USUS.

**THUYA OCCIDENTALIS.** Folia; lignum.  
 CL. *Monœc.* O. *Monadelph.* *Arborea; Europ. et*  
*Asiæ septentr.*

OF. *Arbor vitæ.*

QUAL. Resinosa.

VIRT. Expectorans; sudorifica.

USUS *decocti*: Hydrops; rheumatismus;  
 tussis; intermittentes.

**THYMUS SERPILLUM.**

Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.*

*Perennis; in col-  
 libus siccis.*

OF. *Serpyllum* G. *Serpolet.* H. *Serpol.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fra-  
 grans, aromaticus; sapor substypticus.

VIRT. Stimulans; nervina; stomachica;  
 resolvens.

USUS Cephalalgia crapulæ. Præcipuus ad  
 balnea uterina.

PRÆP. Oleum volatile.

**THYMUS VULGARIS.**

Herba.

CL. & O. *præced.* *Suffruticosa; annua; hortensis,*

*Europ. austr.*

OF. *Thymus vulgaris.* G. *Thym.* H. *To-  
 millo.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fra-  
 grans, aromaticus.

VIRT. Nervina; stomachica; menagoga;  
 carminativa; resolvens.

USUS Leucoplegmatia; coryza; epiphora.

## TILIA EUROPÆA.

Flores.

CL. *Polyand.* O. *Monog.**Arborea.*OF. *Tilia.* G. *Tilleul.* H. *Tilo.*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT. Antispasmodica.

USUS *infusi, aquæ*: Spasmi.PRÆP. *Aqua.*TOLUIFERA BALSAMUM. Balsamum  
incisione arboris obtentum.CL. *Decand.* O. *Monog.* *Amer. Merid.*OF. *Balsamum toltitanum.* s. *De tolu.* s. *De carthagena.* G. *Baume de tolu.* H. *Balsamo toltitano.*

QUAL. In principio resinoso, acido benzoico juncto, residens; odor ambrosiacus; sapor gratus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS *Blennorrhœa*; morbi viscerum pituitosi; *tabes pituitosa*; *ulcera*; *vulnera.*PRÆP. *Tinctura*; *syrupus balsamicus.*

## TORDILIUM OFFICINALE. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua; Europ. austri.*OF. *Seseli creticum.* G. *Séseli de Crête.* H. *Seseli.*

QUAL. Subaromatica.

VIRT. *Carminativa*; *diuretica.*USUS *in febribus intermittens.*

## TORMENTILLA ERECTA. Radix.

CL. *Icosand.* O. *Pentag.* *Perennis. in nemorosis.*

OF. *Tormentilla*. G. *Tormentille*. H. *Tormentila*.

QUAL. Præstans: Styptica; rubra.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS Menorrhœa; diarrhœa. *Cum gentiana*: Intermittentes.

TRAGOPOGON PRATENSE. Radix.

CL. *Syngen.* O. *Polyg. æqual.*

OF. *Tragopogum*; *barba hirci*. G. *Barbe-de-bouc*. H. *Barba Cabruna*.

QUAL. Lactescens; amaricans.

VIRT. ?

USUS Tussis; stranguria.

TRAPA NATANS. Fructus.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *In aquis stagnantibus.*

OF. *Nuces aquaticæ*; *tribuli aquatici*.  
H. *Nueces ó abrojo de agua*.

QUAL. Farinosa; dulcis.

VIRT. Nutriens; obstipans.

USUS.

TRIFOLIILUM MELILOTUS OFFICINALIS

Flores herba.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Biennus; hortensis,*  
*in Campis.*

OF. *Melilotus albus & citrinus*. G. *Melilot*.  
H. *Meliloto*.

QUAL. In oleo volatili residens; odor gravis, fragrans; sapor acris, amaricans, mucilaginosus.

VIRT. Emolliens; resolvens.

USUS *forma cataplasmatidis*: Tumores.

PRÆP. Emplastrum.

TRIFOLIUM REPENS.

Flores.

CL. & O. *præced.*

*Perennis.*

OF. *Trifolium album*. G. *Trefle*. H. *Trebol*  
*rastrero*.

QUAL. Odor suaveolens.

VIRT. ?

USUS Arthritis?

TRIGONELLA FÆNUM GRÆCUM.

—————MONSPELLIENSIS. Se-  
men, ejusque farina.

CL. *Diadelph*. O. *Decand.* *Annua; hortensis.*

OF. *Fænum græcum*. G. *Fénugrec*.

H. *Alholbas*.

QUAL. Farinacea; mucilaginoso; odor fra-  
grans; sapor amaricans.

VIRT. Emolliens; lubricans.

USUS Dysenteria; diarrhoea; ophthalmia.

*Externus* farinæ: ad cataplasmata.

TRITICUM ÆSTIVUM. } Semen; farina;

—————HYBERNUM. } amylium; fur-  
fures.

CL. *Triand.* O. *Trigyn.* *Annua.*

OF. *Triticum*. G. *Farine du froment*: ami-  
*don*: son. H. *Trigo*.

QUAL. Farinacea; mucilaginoso; insipida.

VIRT. Emolliens; nutriend; acescens.

USUS farinæ: Ad cataplasmata. *Amyli* in  
enemate: Dysenteria; tenesmus; stran-

guria. *Decocti furfurum*: Tussis ab acri;  
*externus* in balneis.

DOSIS *Amyli*: Drach. j ß ad unc. xij aquæ  
 coctæ ad unc. vj pro enemate.

PRÆP. Amylum; farina; furfures.

# TRITICUM REPENS.

Radix.

CL. & O. *præced.*

*Perennis.*

OF. *Radix graminis*. G. *Chiendent des*  
*boutiques*. H. *Trigo rastrero*.

QUAL. Dulcescens; inodora.

VIRT. Diurectica; deobstruens.

USUS *Decocti vel extracti*: Physconia ab-  
 domin.; intermittentes; icterus.

DOSIS: Unc. ij-iiij ad libram ij aquæ coctæ  
 ad libram j.

PRÆP. Extractum.

# TROPÆOLUM MAJUS.

Herba.

CL. *Octand.* O. *Monog.*

*Annua; hortensis.*

OF. *Herba nasturtii Indici*. H. *Llagas de*  
*san Francisco*.

QUAL. Acris.

VIRT. Diuretica.

USUS Scorbutus.

# TUSSILAGO FARFARA. Radix; herba; flores; folia; succus foliorum.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; in argillo-*  
*sis et campis humidis.*

OF. *Tussilago*. G. *Tussilage*; *pas d'âne*.  
 H. *Tussilago*, *pie de Asno*.

QUAL. *totius plantæ*: Sapor amaricans,  
 murcilaginosus.

VIRT. Expectorans.

USUS *succi foliorum tempore veris expressi*: Scrophula. (CULLEN). *Decocti vel succi*: Morbi pectoris; tussis catarrhalis; tabes.

DOSIS: Unc. j ad libram j aquæ. — *Succi* unc. ij iij de die.

TUSSILAGO PETASITES.

Radix.

CL. & O. *præced.*

*Perennis; in pratis humidis.*

OF. *Radix petasitidis*. G. *Pétasite*. H. *Sombrerera*.

QUAL. Sapor amarus, subacris.

VIRT. Expectorans; diaphoretica.

USUS *decocti*: Morbi pectoris.

## U.

ULMUS CAMPESTRIS. Cortex interior  
ramulorum et arboris junioris.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

*Arborea.*

OF. *Ulmus*. G. *Orme*. H. *Alamo*.

QUAL. Sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; diuretica; alterans.

USUS *decocti*: Lepra aliique cutis morbi; ulcera phagedænica; arthritis; hydrops.

DOSIS Unc. j-ij ad libram ij aquæ coctæ ad libram j.

URTICA DIOICA.

Radix; herba; suc-

cus expressus.

CL. *Monæc.* O. *Tetrand.*

*Perennis.*



OF. *Urtica major*. G. *Grande ortie*. II.  
*Ortiga*.

QUAL. *Urens tactu*; insipida.

VIRT. *Succi*: Alterans?

USUS *urticationis externus*: Paralysis; as-  
thenia. *Internus succi*: Hæmoptysis;  
hæmorrhoids; phthisis? Icterus.

DOSIS *succi*: Unc. j-ij.

### URTICA PILULIFERA.

Semen.

CL. & O. *præced*.

*Annua*; *Europ. austr.*

OF. *Urtica Romana*. G. *Ortie Romaine*.

QUAL. *herbæ*: *Urens tactu*; insipida.—*Se-*  
*minum*: Oleosa.

VIRT. Diuretica.

USUS Rubeola? nephritis? hæmorrhagia?

### URTICA URENS.

Semen.

CL. & O. *præced*.

*Annua*.

G. *Ortie grièche*.

VIRT. *Decocti*: Anthelminthica?

### UVARIA ZEYLANICA.

Lignum.

CL. *Polyand*. O. *Poligyn*.

G. *Bois d'ébène*.

QUAL.

VIRT.

USUS.

## V.

**VACCINIUM MYRTILLUS.** Baccæ re-  
centes.

CL. *Octand. O. Monog.* *Suffruticosa.*

OF. *Baccæ myrtillorum. G. Airelle anguleuse; myrtilles. H. Arandano.*

QUAL. Sapor acido-stypticus.

VIRT. Subadstringens; antiseptica.

USUS Febres biliosæ, putridæ; diarrhœa; scorbutus.

PRÆP. Syrupus; Roob.

**VACCINIUM OXYCOCCOS.** Baccæ re-  
centes; succus expressus.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa; Perennis.*

OF. *Baccæ oxycoccos. G. Airelle canneberge. H. Oxicaco.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac *præced.*

PRÆP. Syrupus.

**VACCINIUM VITIS IDÆA.** Bacce re-  
centes.

CL. & O. *præced.* *Suffruticosa.*

OF. *Baccæ vitis idææ. G. Airelle ponctuée. H. Vid idea.*

QUAL. Acida.

VIRT. Refrigerans.

USUS Febres acutæ.

PRÆP. Roob.

## VALERIANA CELTICA.

Radix.

CL. *Triand.* O. *Monog.**Perennis; alpina, in  
montibus altioribus  
Europ. austr.*OF. *Nardus celtica: spica celtica; spica  
Indica. G. Nardceltique. H. Espica  
Celtica.*QUAL. Odor fragrans, aromaticus; sapor  
acris, salino-amaricans, aromaticus.VIRT. Antispasmodica; diuretica; anthel-  
minthica.

USUS præcipuus in Turcia ad balnea.

## VALERIANA OFFICINALIS.

Radix.

CL. & O. *præced.**Perennis in pratis hu-  
midis; et Sylvis.*OF. *Valeriana sylvestris seu minor. G.  
Valeriane. H. Valeriana.*QUAL. Præstans: In oleo volatili residens;  
odor hircinus; sapor amaricans, aroma-  
ticus: Felibus grata.VIRT. Eximie antispasmodica; narcotica;  
anthelminthica; menagoga; diuretica.USUS *pulv. vel infusi*: Epilepsia; hyste-  
ria; convulsio; hypochondriasis; hemi-  
crania; amaurosis incipiens; amenor-  
rhœa; vermes; hæmoptysis; ulcus.DOSIS *pulveris cum pauxillo macis*: Gran.  
xx-xxx ter quaterve de die. In infuso  
aquoso unc. semis-ij ad libram j aquæ.

PRÆP. Tinctura; dosi unc. semis-j.

N. B. Primo vere antequam folia expli-  
cata sunt colligenda, cavendum ne ex

locis nimis humidis aut tempore anni  
improprio colligatur et ne cum radicē  
valerianæ dioicæ inertī confundatur.

## VALERIANA PHU.

Radix.

CL. & O. *præced.**Perennis; Eur.-p. austr.*OF. *Phu; valeriana major seu hortensis.*G. *Valeriane sauvage.* H. *Valeriana Fu.*QUAL. et VIRT. *præcedent.* sed debilior.

## VERATRUM ALBUM.

Radix.

CL. *Polyg.* O. *Monæc.**Perennis; alpina.*

N. B. Tempore verno colligenda.

OF. *Helleborus albus.* G. *Hellébore blanc; veratre.* H. *Veratro blanco; vede gambre blanco.*

QUAL. Venenata: Odor nauseosus, ingratus; sapor salino acris, amaricans.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica; menagoga; errhina; phthiriaca.

USUS *internus pulveris ablato cortice externo*: Hydrops; epilepsia; morbi cutis rebelles; mania; melancholia; dyspepsia; quartana. *Externus forma pulveris, decocti vel unguenti*: Psora; tinea. Scopo errhino: Apoplexia; cophosis.DOSIS *pulveris*: Gran. iij-xx. In infuso aquoso vel vinoso, aut alcohole diluto Gr. xx-drach. iij ad libram j.—*Extracti*: Gr. ij.—Radiciſ drach. j in unc. xx: aceti infusa, initio dosi cochlearis unius

omni secunda aut tertia hora; dein bis, tandem semel de die, maniam violentam sustulit intra tres septimanas.

*N. B.* Antidotum veratri est infusum coffeæ.

VERATRUM NIGRUM. Radix.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præcedent.

VERATRUM SABADILLA? (RETGIUS).

Semen cum capsulis.

CL. & O. *præced.* *Mexicana.*

OF. *Semen sabadillæ; Cevadilla. g. Cevadille. h. Cevadilla.*

QUAL. Venenata: sapor amarus, acris, urens.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; emetica; anthelminthica; phthiriaca.

usus Vermes.

DOSIS Infanti duorum ad quatuor annos gr.

ij.—A quatuor ad octo annos gr. v. Ab octo ad duodecim annos gr. x.—Et ultra pro constitutione et ætate gr. xij-xv cum melle, subjungendo catharticum omni quinto die (SCHMUCKER).

VERBASCUM NIGRUM. Radix.

CL. *Pentand. O. Monog.* *Percnais.*

OF. *Verbascum.*

QUAL. Mucilaginoso; insipida.

VIRT. Emolliens.

usus Paronychia.

**VERBASCUM THAPSUS.** Folia; flores.

CL. & O. *præced.* Biennis; in locis desertis, petrosis.

OF. *Verbascum.* G. *Molene*; *bouillon blanc.* H. *Gordolobo.*

QUAL. Mucilaginosa; fatuo-amaricans.

VIRT. Emolliens; involvens.

USUS Tussis; proctalgia; varix ani.

DOSIS *infusi*: Unc. j ad libram j aquæ.

**VERBENA OFFICINALIS.**

Herba.

CL. *Diand.* O. *Monog.*

*Annua.*

OF. *Verbena.* G. *Verveine.* H. *Verbena.*

QUAL. Subinsipida; inodora.

VIRT. leviter adstringens.

USUS Ophthalmia infantum?

**VERONICA BECCABUNGA.** Herbarecens.

CL. *Diand.* O. *Monog.*

*Perennis.*

OF. *Beccabunga.* G. *Véronique cressonnée.* H. *Becabunga.*

QUAL. Subinsipida, inodora,

VIRT.?

USUS. Scorbutus?

**VERONICA OFFICINALIS.**

Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in locis siccis, nemorosis.*

OF. *Veronica.* G. *Véronique.* H. *Veronica.*

QUAL. Sapor amaricans, substypticus.

VIRT. Subadstringens; expectorans.

USUS *infusi*: Tussis; tabes; morbi pectoris pituitosi; cachexiæ.

## VICIA FABA.

Flores; semen.

CL. *Diadelph. O. Decand.**liortensis.*OF. *Faba. G. Fève. H. Habas.*QUAL. *florum recent.* Odor fragrans.—*Seminis: Farinacea.*VIRT. *florum: Cosmetica.*USUS *farinæ seminum: Pro cataplasmatibus emollientibus.*

## VINCA MINOR.

Herba; folia.

CL. *Pentand. O. Monog.**Perennis.*OF. *Vinea pervinca. H. Yerba doncella.*

QUAL. Sapor amaricans.

VIRT. Scrotum corrugans. Eundem effectum peculiarem præstant *alchemilla vulgaris; anthemis pyrethrum, hederæ helix*, fotu externe adplicata.USUS *infusi: Morbi pectoris. Forma gargarismatis: Cynanche.*

## VIOLA CANINA.

Radix.

CL. *Syng. O. Monog.**Perennis.*

VIRT. Emetica; cathartica.

DOSIS Scrup. j-drach. semis.

## VIOLA IPECACUANHA?

Radix

CL. & O. *præced.**Brasiliensis.*OF. *Ipecacuanha alba. G. Ipecacuanha blanche ou amylicé.*QUAL. et VIRT. Eadem ac *psycotriæ emeticæ* sed minus certa.



**VIOLA ODORATA.** Flores recentes; radix; semen.

CL. & O. *præced.*

*Perennis ; hortensis.*

OF. *Viola ; violaria.* G. *Violette odorante.* H. *Violeta.*

QUAL. *Florum ;* Fragrans.

VIRT. *Radicis & seminis :* Emetica ; diuretica.

USUS *florum :* Pro syrupo cæruleo parando.

DOS. *Radicis & seminis :* In pulvere drach. semis j. In decocto drach. ij-iiij ad libr. j aquæ.

PRÆP. Syrupus.

**VIOLA TRICOLOR.** Herba.

CL. & O. *præced.*

*Annua ; in campis et hortis.*

VAR. A. *Viol. tricolor arvensis.* B. *Viol. tricolor hortensis repens.*

OF. *Herba Trinitatis ; Jacea.* G. *Pensée* H. *Trinitaria ; pensamientos.*

QUAL.

VIRT. Diuretica ; cathartica.

USUS *pulv. vel decocti :* Crusta lactea ; achores infantum ; tinea.

DOSIS *pulveris :* Gr. viij-xxx. In decocto drach. j-ij herbæ recentis, vel drach. semis-j herbæ siccatae ad libr. j lactis.

**VISCUM ALBUM,** Rami lignosi cum foliis.

CL. *Diœc.* O. *Tetrand.*

*Fruticosa ; parasitica.*

OF. *Viscus quercinus*; *viscum quernum*.

G. *Guy de chêne*. H. *Visco blanco*.

QUAL. *recentis*: Odor nauseosus. *Siccatae*:  
Mucilaginosa,

VIRT. Inviscans; lubricans.

USUS Epilepsia; chorea; convulsio? Dysen-  
teria?

DOSIS *pulveris*: Drach, semis-j.

VITEX AGNUS CASTUS. Semen.

CL. *Didyn*. O. *Angiosp*. *Arborea*; *Europ. austr.*

OF. *Agnus castus*. H. *Agno casto*.

QUAL. Odor nidorosus; sapor aeris, calidus.

VIRT. ?

VITIS APYRENA. Baccæ siccatae.

N. B. *Varietas vitis viniferæ*.

OF. *Uvæ Corinthiacæ*; *pasullæ minores*.

G. *Raisins de Corinthe*. H. *Pasas de Co-  
rinto*.

QUAL. Sapor grate dulcis, saccharinus.

VITIS VINIFERA. Baccæ recentes et  
siccatae; folia.

CL. *Pentand*. O. *Monog*. *Fruticosa*.

OF. *Uvæ*; *uvæ passæ*; *passullæ majores*;  
*zibebæ*. G. *Vigne*: *raisins*; *raisins de  
Damas*. H. *Vid*.

QUAL. Sapor grate dulcis, acidulus. *Folio-  
rum*: Substypticus.

VIRT. *fructus*: Nutriens; antiseptica; ec-  
coprotica; deobstruens: *Foliorum*: Sub-  
adstringens.

usus Tussis; stranguria; icterus; physconia abdominalis; tabes.

FRÆP. Succus é baccis immaturis expressus, vulgo *Omphacium* ( *G. verjus* ).

Liquor ex uvis maturis expressione et fermentatione paratus, variæ qualitatis, vulgo *Vinum*.

*Vinum Rhenanum*: Acidulum.

*Vinum campaniæ*: Acido carbonico scattens.

*Vinum album regionum australium*: Alchhole foetum.

*Vinum rubrum*: Alchhole et principio adstringente abundans.

Liquor ex vino, fermentatione obtentus, acidus, vulgo *Acetum*.

Liquor ex vino, destillatione obtentus, *Alcohol*; vulgo *spiritus vini*.

Alcohol dilutum, vulgo spiritus vini tenuis. *c. Eau-de-vie. n. Aguardiente.*

Alcohol, vulgo spiritus vini rectificatus.

Alcohol concentratum, vulgo spiritus vini rectificatissimus.

## W.

WINTERA AROMATICA.

Cortex.

CL. *Polyand. O. Polyg.*

*Arborea; terræ*

*Magellanicæ.*

OF. *Cortex winteranus; cortex winteri; cortex magellanicus; winteriana aromatica; drymus granadensis; drymus winteri. n. Corteza winteranda.*

QUAL. In oleo volatili cum principio resinoso juncto residens; odor fragrans; sapor intense acris, pungens, aromaticus.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS Dysenteria; asthenia.

DOSIS *pulveris*: Gran. v-xv. In infuso vinoso drach. j-j  $\beta$  ad libram j. vini.

WINTERA CANELLA. (PALLAS).

N. B. CANELLA ALBA. (LINN.) Cortex interior.

CL. & O. *præced.* Arborea; Ind occident.

OF. *Canella alba*; *winterania canella*.

G. *Canelle blanche*. H. *Canela blanca*.

QUAL. Sapor acris, subamarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS *pulver. vel infusi vinosi*: Dyspepsia; asthenia.

DOSIS. *pulv.*: Gran. x. In infuso drach. j ij ad libr. j vini.

## X.

XANTHIUM STRUMARIUM. Folia recentia; semina.

Monæc. O. *Petand.* Annuæ; in humidis arenosis.

OF. *Xanthium*. H. *Xantio*.

QUAL. Luteo tinctoria; sapor amarus, subacris.

VIRT.

USUS *seminum & succi foliorum*: Scrophula; bronchocele; herpes; erysipelas.

DOSIS Unc. semis.

## Z.

ZOSTERA MARINA.                      Fibræ radicis.

CL. *Gynand. O. Polyand.*

OF. *Pila marina. G. Zatére marine.*

QUAL.

VIRT.

USUS *cinerum radicis ustæ* : Scrophula;  
bronchocele.

---



# M A T E R I A

## M E D I C A.



### II. Animalia, eorumque præparata.



ACCIPENSER STURIO, aliæque accipenserum SPECIES. Gelatina seu gluten ex vesica aerea præcipue, nec non ex intestinis depromptum, in varias figuras contortum, exsiccatum.

CL. *Pisces*. O. *Chondropterygii*.

OF. *Colla piscium*; *ichthyocolla*. G. *Colle de poissons*. *Sturgeon*. H. *Pequeño Sturion*.

QUAL. Gelatinosa.

VIRT. Demulcens; involvens; nutriens; aglutinans.

USUS *decocti internus*: Dysenteria; diarrhæa ab acri; tenesmus. *Externus forma enematis*.

N. B. Hoc glutem est præcipuum ingrediens emplastri adhæsivi anglici.

**APIS MELLIFERA.** Mel; Cera flava et alba.  
 CL. *Insecta* O. *Hymenoptera*.

OF. *Mel virginicum & depumatum*: Cera  
*flava & alba*. G. *Miel*: Cire. H. *Abeja*.

QUAL. *Mellis*: Saccharino-mucilaginoso,  
 acescens. *Ceræ*: Oleosa.

VIRT. *Mellis*: Deobstruens; diuretica; demulcens; antiseptica. *Ceræ*: Emolliens; involvens.

USUS *Ceræ flavæ solutæ externus forma enematis*: Diarrhœa ab acri; tenesmus; hæmorrhagia recti ab acri. — *Mellis*: Nephralgia; morbi pulmonum pituitosi; physconia abdominalis.

DOSIS *mellis intern.* Unc. iij-libr. semis ad libr. j de die.

PRÆP. *é melle*: Hydromel; mel virginicum et depumatum; oxymel simplex; oxymel scilliticum. — Mel cupratum (*vulgo mel æruginis*, s. unguentum *Ægyptiacum*). — Mel hydrargyratum, pro usu interno et externo. — Mel farina subactum, forma emplastri vel cataplasmatidis: Phlegmone; furunculus.

**BOS TAURUS DOMESTICUS.** Caro; bilis;  
 lac.

CL. *Mammalia* O. *Pecora*.

G. *Lait de vache*; petit-lait; beurre; fiel.  
 H. *Buey*.

VIRT. *Lactis*, *sacchari lactis*, *butyri*:  
 Nutriens; involvens; relaxans. *Seri lac-*



*tis & lactis ebutyrati*: Attenuans; antiseptica. *Bilis*: Stomachica.

USUS *præcipuus lactis, seri et sacchari lactis*: Tabes; hæmoptysis.

POSIS *Sacchari lactis* in pulvere cum vel sine nitrate potassæ drach. j ter quaterve de die; vel unc. semis in libr. ij aqua fervidæ soluta de die.

PRÆP. Jus carnium; gelatina; butyrum; saccharum lactis; serum lactis; lac ebutyratum; bilis inspissata.

# CANCER ASTAGUS

———GAMMARUS.

———MACRURUS.

———PAGURUS.

Lapides; chelæ;  
caro pro jure.

CL. *insecta. O. Aptera.*

OF. *Oculi & Chelæ cancrorum. G. Yeux d'écrevisses. H. Cangrejos de rio, Centolas y Langostas.*

QUAL. *Lapidum & chelarum*: Calcarea.

VIRT. *Chelarum & lapidum*: Antacida. *Carnis*: Nutriens.

USUS Pyrosis; diarrhœa; convulsio infantum ab acido.

# CAPRA DOMESTICA. (Fæmina). Lac.

CL. *Mammalia. O. Pecora.*

OF. *Lac caprinum. G. Chèvre. H. Cabra.*

QUAL. Nutriens.

## CARABUS CHRYSOCEPHALUS.

————— FERRUGINEUS. (FABRICIUS).

usus. Odontalgia.

N. B. Insectum inter digitos teratur, dein iisdem digitis dens et gingiva dolens tangatur; idque pro re nata ter quaterve repetatur.

CASTOR FIBER. Substantia unguinosa folliculi excretorii juxta anum, *vulgo* CASTOREUM dictum.

CL. *Mammalia*. O. *Glires*.

OF. *Castoreum Rossicum*. G. *Du Castor*.

H. *Castor*.

QUAL. Odor virosus, ingratus, penetrans; sapor acris, amaricans.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga; aphrodisiaca.

usus. *internus*: Spasmi; hysteria; convulsio; epilepsia; colica flatulenta; typhus; anaphrodisia. *Externus* forma enematis.

dosIS *pulveris*: Gran. x-xxx bis terve de die. In *enemate* drach. j.

PRÆP. Tinctura; unguentum.

## CERVUS ALCES.

————— DAMA.

————— ELAPHUS.

————— TARANDA

} Cornua; gelatina  
cornu cervi; se-  
vum.

CL. *Mammalia*. O. *Pecora*.

OF. *Cornucervi*. G. *Corne de cerf*. H. *Gran bestia*, *Gamo*, *Ciervo y Reno*.

QUAL. *gelatinæ*: Nutriens. *Cornu* est substantia ex phosphate calcis composita.

PRÆP. Rasura et gelatina cornu cervi; cornu cervi ustum seu calcinatum; oleum cornu cervi volatile *vulgo* spiritus cornu cervi. — Ammoniaca *vulgo* alcali volatile causticum. — Carbonas ammoniacæ *vulgo* sal cornu cervi volatile.

CHRYISIS IGNITA. (FABRICIUS).

Sphex ignita LINN.

CL. *Insecta*. O. *Hymenoptera*.

H. *Especie de Abispa*.

usus pulveris vel tincturæ internus ut cantharidum: Paralysis. (BEIREIS).

CHRYSOMELA POPULI.

————— SANGUINOLENTA.

VIRT. et usus Idem carabi.

COCCINELLA BISPUNCTATA.

————— SEPTEMPUNCTATA.

VIRT. et usus idem ac carabi.

COCCUS CACTI (COCCINELIFERI). Insectum siccatum.

CL. *Insecta* O. *Hemiptera*.

OF. *Coccionella*; *cochinella*. G. *Cochenille*.

H. *Cochinilla*.

QUAL. Rubro-tinctoria; acris; urens.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS potissimum tinctorius.

**COCCUS LACCA** (C. FIGUS INDICÆ ET RELIGIOSÆ). Substantia gummi-resinosa punctura insecti ex arbore exsudans, Nidumque insecti constituens.

OF. *Gummi lacca*. Lacca in granis: *Nidus cum vel sine insecto ramulis arboris adhærens*. Lacca in tabulis: *Nidus insecti igne liquatus & in tabulas effusus*.  
G. *Lacque*. H. *Laca*.

QUAL. Rubro-tinctoria; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS pulveris vel tincturæ: Laxitas gingivarum.

PRÆP. Tinctura.

**COCCUS (QUERCUS) ILICIS**. Nidus cum insecto siccatus.

OF. *Kermes*; *grana chermes*. G. *Kermès*.  
H. *Grana Kermes*.

QUAL. Rubro-tinctoria; odor et sapor gratus, aromaticus, substypticus.

VIRT. Stimulans; adstringens.

USUS Anaphrodisia; asthenia nervosa: Hodie potissimum tinctorius.

PRÆP. Succus chermes, id est, succus ex insectis vivis in cellula inclusis linteo expressus cum anatica portione sacchari mixtus aut conditus.

COLUBER VIPERA. } Caro pro jure;  
 ————— VERUS. } axungia.

CL. *Amphibia* O. *Serpentes*. *Ægypt. Europ.*

OF. *Vipera*. G. *Vipère*. H. *Vibora*. *Austr.*

USUS *decocti seu juris viperarum*: Morbi  
 cutis; scrophula. *Axungia*: Maculæ  
 corneæ.

CORALLINA OFFICINALIS. Nidus po-  
 lypti maris Atlantici et Mediterranei.

CL. *Vermes*. O. *Zoophytæ*.

OF. *Muscus corallinus*. s. *muscus marinus*  
*lapideus*. G. *Coralline officinale*. H.  
*Coralina*.

QUAL. Calcareæ.

VIRT. Antacida.

CURCULIO ANTIODONTALGICUS.

————— BACCHI.

————— JACEÆ.

G. *Calandre ou charanson*. H. *Gorgojos*.

VIRT. et usus Carabi.

CYNIPS (QUERCUS) CERRIS. Nidus in-  
 secti siccatus, id est, substantia ve-  
 getabilis punctura insecti ex foliis,  
 petiolis aut pedunculis arboris exsu-  
 dans, in nidum efformata, vulgo Galla.

OF. *Gallæ*; *Gallæ turcicæ*. G. *Noix de*  
*Galles*. H. *Agalla*.

QUAL. In principio adstringente residens;  
 styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS *internus & externus*: Blennorrhœa;  
hæmorrhœa; prolapsus; hernia.

PRÆP. Acidum gallicum. (G. *Acide gallique*).

EQUUS ASINUS. (Fæmina). Lac.

CL. *Mammalia*. O. *Bellucæ*.

OF. *Lac Asininum*. H. *Leche de Burra*.

QUAL.

VIRT. Nutriens.

USUS *Tabes*.

ESOX LUCIUS. Oleum ex hepate sponte  
destillans.

CL. *Pisces*. O. *Abdominales*.

OF. *Oleum lucii piscis*. G. *Brochet*. H. *Pez lucio*.

USUS *Maculæ corneæ*.

FORMICA RUFA. Acidum.

CL. *Insecta*. O. *Hymenoptera*.

OF. *Formicæ cum acervo*. G. *Fourmirouge*.

H. *Hormiga roja*.

QUAL. *Acidi*: Pungens.

VIRT. Irritans; stimulans.

USUS *Paralysis*; *anaphrodisia*.

PRÆP. Acidum. (G. *Acide formique*).

HELIX POMATIA. Caro.

CL. *Vermes*. O. *Testacea*.

G. *Le grand colimaçon des vignes*. H. *Caracoles*.

VIRT. Nutriens.

USUS Tabes.

## HIRUDO MEDICINALIS.

———— SANGUISUGA.

CL. *Vermes*. O. *Intestina*.OF. *Hirudo sanguisuga*. G. *Sangsue*. H.  
*Sanguijuelas*.USUS Phlegmone; apoplexia; ophthalmia;  
varix ani, alique morbi in quibus san-  
guinis evacuatio localis indicatur.

## ISIS NOBILIS.

Nidus calcareus.

CL. *Vermes*. O. *Zoophytæ*.OF. *Corallia rubra*. G. *Corail rouge*. H.  
*Coral rojo*.

QUAL. Calcareæ.

VIRT. Antacida; dentifrica.

USUS ad dentes mundandos.

## LACERTA AGILIS, aliæque SPECIES.

Caro.

CL. *Amphibia*. O. *Reptilia*.G. *Lezarde*. H. *Lagartija*.USUS Caro cruda, dempto capite, cauda  
et pedibus N.º j-iiij quotidie deglutita.  
Morbi cutis; ulcera syphilitica; cancer  
nasi, oris?

## LACERTA IGUANA.

Caro; ova.

G. *Iguane*. H. *Iguana*.*Ind. occident.*VIRT. An comesta virus syphiliticum in  
corpore latens activum reddunt?



## LACERTA SCINCUS.

Caro.  
*Afric.*G. *Scinque*. H. *Estinco marino*.

VIRT. Aphrodisiaca?

LIMAX MAXIMUS CINEREUS. Gluten in  
superficie corporis exsudans.CL. *Vermes*. O. *Mollusca*.G. *Limazon brune*. H. *Babosa grande*.usus glutinis seu mucī viscidī ad tumores  
glandularum duros resolvendos.LUMBRICUS TERRESTRIS. Succus ex-  
pressus; oleum,CL. *Vermes*. O. *Intestina*.G. *Vers de terre*. H. *Lombrices*.

QUAL. Alcalina.

VIRT. Stimulans,

usus Paralysis.

LYTTA VESICATORIA. (FABRICIUS).  
Insectum siccatum.

Meloë vesicatorius LINN.

CL. *Insecta*. O. *Coleoptera*. *Europ. austr. Men-  
se julio colligenda.*OF. *Cantharides*. G. *Cantharides*. H. *Can-  
táridas*.

QUAL. Acris; corrodens; vesicans.

VIRT. Irritans; stimulans; diuretica; de-  
ribans; lympham evacuan.usus *externus* forma emplastri præmissa  
evacuatione sanguinis: Phlegmasiæ;

odontalgia et aurium dolor rheumaticus; enuresis; paralysis vesicæ; arthrodynia rheumatica; herpes. Pulvis dentis carioso applicatus, vitando ne gingiva eodem tangatur, dolore n sæpe auferit. *Internus* forma pulveris vel tincturæ: Blennorrhœa; anaphrodisia; paralysis.

DOSIS *pulv.* gr. ij-iv. *Tincturæ* gr. x-xxx.  
PRÆP. Tinctura; emplastrum; unguentum.

MADREPORA OCULATA. Nidus cal.  
CL. *Vermes*. O. *Lithophyta*. careus.  
OF. *Corallia alba*. G. *Corail blanc*. H. *Corral blanco*.  
VIRT. Antacida,

MELOE MAJALIS.

———— PROSCARABÆUS.

CL. *Insecta*. O. *Coleoptera*.  
G. *Proscarabée et meloë de mai*. H. *Carralejas*,

QUAL. Acris.

VIRT. Irritans; stimulans.

USUS Hydrophobia?

MOSCHUS MOSCHIFERUS. (Mas).

Substantia unguinosa folliculi excretorii umbilicalis, vulgo MOSCHUS dicta.

CL. *Mammalia*. O. *Pecora*. *Asia septentrionalis*.  
OF. *Moschus*. G. *Musc*. H. *Almizcle*.

Vescens præcipue ranunculo et veratro; vere colligendus.

QUAL. Eximia: Odor ambrosiacus, intense fragrans.

VIRT. Excitans; nervina; antispasmodica; sudorifica; aphrodisiaca?

USUS Convulsio; subsultus tendinum; delirium; singultus; hysteria; epilepsia; typhus; febres et exanthemata atonica; podagra atonica, retropulsa.

DOSIS gran. v-x-xl.

PRÆP. Tinctura; julapium.

ONISCUS ASELLUS. Insectum; succus expressus.

CL. *Insecta*. O. *Aptera*.

OF. *Millepedes*; *millepedæ*; *aselli*. G. *Millepieds*; *cloportes*. H. *Cucarachas*.

QUAL. Alcalina; sapor nauseosus, acris, pungens.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS Morbi pectoris pituitosi; amaurosis; hydrops; physconia hepatis?

DOSIS N° L-C vapore alcoholis necatorum et pulverizatorum.

PRÆP. Infusum vinosum expressum, *dosi* scrup. j-drach. j ad unc. j.

OSTREA EDULIS. } Caro; Concha  
——— MAXIMA. } calcarea.

CL. *Vermes*. O. *Testacea*.

OF. *Conchæ seu testæ ostrearum*. G. *Huitres*. H. *Ostras*.

VIRT. *Vermis*: Nutriens; aphrodisiaca. *Conchæ*: Antacida.

USUS Diæta ex ostreis edulibus in morbis  
cutis rebellibus aliisque ex humorum  
acrimonia oriundis.

## OVIS ARIES.

Sevum.

CL. *Mammalia* O. *pecora*.

OF. *Sevum ovillum*. G. *Graise de mouton*.

H. *Carnero*,

PHASIANUS GALLUS. (*Gallina domes-  
tica*). Ova; Ovorum albumen et  
vitellus; testæ.

CL. *Aves*. O. *Gallinæ*.

OF. *Ova: testæ ovorum*. G. *Coq, et poule*.

H. *Gallina*, gallo.

QUAL. *Albuminis & vitelli*: Oleosa; mu-  
cilaginosa, gelatinosa. *Testæ*: Au-  
tacida,

VIRT. *Ovorum*: Nutriens; involvens; de-  
mulcens; aphrodisiaca.

USUS *Vitelli* per se aut cum saccharo, vel  
forma linctus aut emulsionis: Morbi  
ventriculi ex acido. N. B. Vitellus unus  
aut duo omni mane deglutiti: Icterus  
(WHITE).

PHYSETER MACROCEPHALUS: aliæque  
SPECIES. Adipocera, id est, sevum seu  
oleum concretum, in cavo peculiari  
supra cranium collectum, vulgo Sper-  
maceti dictum; ambra grisea.

CL. *Mammalia*. O. *Ceti*.

OF. *Spermaceti*: *Ambra grisea*. G. *Adi-*

*pocire de baleine: Ambre gris. n. Ballena. Esperma de Ballena, Ambar gris.*

QUAL. et VIRT. *Adipocerae* eadem ac sevi aut olei fixi, sed difficulter rancescens.

*Ambrae griseae: Stimulans; nervina; aphrodisiaca?*

USUS.

PRÆP. Tinctura ambrae griseae.

## RANA BUFO.

CL. *Amphibia. O. Reptilia.*

G. *Crapaud. n. Sapo, Escuerzo.*

USUS Bufo vivens, linteo tectus capite excepto, mammæ adplicatus suctione cancrum sanasse perhibetur.

## RANA ESCULENTA.

Caro.

CL. & O. *præced.*

G. *La grenouille commune n. Rana.*

VIRT. Nutriens.

USUS.

## SEPIA OFFICINALIS.

Concha.

CL. *Vermes. O. Mollusca.*

OF. *Os sepiæ. G. Os de seche. n. Jibia.*

QUAL. Calcareæ.

## SPONGIA OFFICINALIS. Nidus mollis.

CL. *Vermes. O. Zoophytæ. Incola maris mediterranei et rubri.*

OF. *Spongia. G. Epouge. n. Esponja.*

USUS externus pro deligandis ulceribus et

abscescibus. *Spongiæ ustæ* : Bronchocele.

PRÆP. *Spongia usta*, dosi Drach. semis.

SUS SCROFA.

Axungia; adeps.

CL. *Mammalia*. O. *Belluæ*.

OF. *Axungia porcina*; *adeps suillus*. G.

*Graisse de porc*; *axonge*; *saindoux*.

H. *Cerdo*. *Manteca de puerco*.

USUS Ad unguenta varia et ad cataplasmata emollientia.

TRICHECUS MANATUS.

Dens.

CL. *Mammalia*. O. *Bruta*.

G. *Lamantin*. H. *Manati* ó *Vaca marina*.

USUS Præstans pro dentibus artificialibus.

VIVERRA ZIBETHA. Substantia unguinosa folliculi excretorii juxta anum, vulgo CIBETHUM dicta.

CL. *Mammalia*. O. *Feræ*.

G. *Zibet* H. *Civeto*. *Gato' de algalia*.

QUAL. Odor ambrosiacus.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica.

USUS.







*Se hallará en Madrid en las librerías de Rodríguez y Matute calle de Carretas, y en Cáceres en la de Burgos.*

En las mismas se hallarán las obras siguientes.

*Tratado de Medicina y Cirujía legal y forense* de MR. PLENK, en latin, para uso de las universidades del reino, segun el plan de estudios aprobado por S. M.

*Noticia jurisdiccional* (dispuesta en forma de Diccionario) *topográfica y descriptiva de todos los Corregimientos y Alcaldías mayores de España*; con la explicacion de las atribuciones de los alcaldes y justicias pedáneas, ordinarias, y las que corresponden á los ayuntamientos. Un tomo en cuarto, á 22 reales en rústica y 26 en pasta.

*La agricultura, ó Tratado completo de las cosas del campo*, que escribió en latin el sábio español Lucio Junio Moderato Columela, traducido al castellano: dos tomos en cuarto á 32 reales cada ejemplar en rústica, y 40 en pasta.

*Demostracion de la existencia de Dios y de sus atributos*, que escribió en francés el ilustrísimo señor Francisco Saliñac de Fenelon, traducida. Un tomo en octavo á 12 reales en pasta.

*La moral de Jesucristo y de los Após-*

*toles*, ó el evangelio en castellano. Un tomo en octavo, á 12 reales en pasta.

Tratado de la *Imitacion de Cristo*, atribuido al V. Kempis; nuevamente traducido al castellano, de lindo tamaño y edicion, á 10 reales en pasta.

El mismo tratado en idioma latino de igual forma, á 8 reales en pasta.

*Los Mártires ó el triunfo de la Religion Cristiana*, que escribió en francés F. A. vizconde Chateaubriand, par de Francia, y exministro de Relaciones exteriores de S. M. Luis XVIII.

*Apéndices á las apologías del Altar y del Trono, ó Contestacion á las OBSERVACIONES hechas en el año 20 por el diputado á Córtes disfrazado bajo las iniciales C. VERN. contra aquella obra.* Ampliase con este motivo varias de sus materias mas útiles, especialmente la relativa á patentizar con nuestra historia y nuestros Concilios ó Córtes que en los Reyes de España ha residido siempre el poder absoluto de gobernar á la Nacion. Se extraetan los reparos puestos á dichas Apologías en la censura que dió sobre su impresion el ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y se satisface á ellos: contestándose igualmente á las impugnaciones que la misma obra sufrió en las CARTAS DE DON ROQUE LEAL. Un tomo en cuarto. Dale á luz el mismo autor de las Apologías.





A 0841234/00



UNIVERSIDAD DE SEVILLA



600701327

i 25531359

87

SWEDIAUR  
MATERIA  
MEDICA

1

25



colorchecker CLASSIC



calibrite